

Esercizi e calcoli con densità bidimensionali continue

Svolgere gli esercizi 2b.2, 2b.3, 2b.4, 2b.5, 2b.6, 2b.7, 2b.8, 2b.9, 2b.10, 2b.11, 2b.12, 2b.13

▷ **Esercizio 2b.2** Siano X, Y e Z tre v.a. indipendenti e uniformemente distribuite in $[0, 1]$. Trovare la densità della v.a. $W = X + Y + Z$.

▷ **Esercizio 2b.3** Un punto è scelto a caso nel piano con densità :

$$f(x, y) = \frac{1}{2\pi} e^{-(x^2+y^2)/2}$$

Sia $Z = \sqrt{X^2 + Y^2}$ la distanza del punto scelto dall'origine. i) Trovare la legge di Z ; ii) qual è la probabilità che il punto si trovi fuori del cerchio di centro $(0, 0)$ e raggio 1?

▷ **Esercizio 2b.4** Sia Y una v.a. con legge esponenziale di parametro X , ove X è una v.a. con legge Gamma di parametri α e λ . Qual è la legge di Y ? Esiste finita $E(Y)$? in caso affermativo, quanto vale? Qual è la densità condizionale di X dato $Y = y$? Quanto valgono, infine, $E(X|Y = y)$ e $Var(X|Y)$?

▷ **Esercizio 2b.5** Sia (X, Y) un vettore aleatorio di densità congiunta $f(x, y)$. Calcolare la densità della v.a. $Z = Y/X$.

▷ **Esercizio 2b.6** Sia (X, Y) un vettore aleatorio di densità congiunta $f(x, y)$. Calcolare la densità della v.a. $Z = XY$.

▷ **Esercizio 2b.7** Siano X e Y indipendenti di leggi $\Gamma(\alpha, \lambda)$ e $\Gamma(\beta, \mu)$, rispettivamente. Trovare la legge di $Z = \frac{X}{X+Y}$.

se $\lambda = \mu$ allora Z ha densità Beta (α, β)

▷ **Esercizio 2b.8** Siano $X, Y \sim N(0, 1)$ e indipendenti. Trovare la legge di $Z = \frac{X^2}{X^2+Y^2}$.

▷ **Esercizio 2b.9** Siano X e Y v.a. indipendenti ed esponenziali di parametro λ . Trovare la legge di $Z = \frac{X}{X+Y}$.

$X, Y \sim \text{Gamma}(1, \lambda)$, quindi $Z \sim \text{Beta}(1, 1)$; cioè Z è uniforme in $[0, 1]$

▷ **Esercizio 2b.10** Siano X, Y v.a. indipendenti e con distribuzione esponenziale di parametro λ . Trovare la legge di $Z = \frac{X^2}{X^2+Y^2}$.

▷ **Esercizio 2b.11** Siano $X \sim N(0, 1)$ e $Y = X + W$, dove $W \sim N(0, \sigma^2)$ ed è indipendente da X . Calcolare: i) la legge di Y e la legge congiunta di X e Y ; ii) $E(X|Y = y)$; iii) sia $\sigma^2 = 0.1$; se si osserva il valore $y = 11/20$, quanto vale $P(1/4 < X < 3/4 | Y = 11/20)$?

▷ **Esercizio 2b.12** Siano X, Y v.a. indipendenti e con distribuzione esponenziale di parametro λ . Trovare la densità di $Z = \frac{X-Y}{X+Y}$.

▷ **Esercizio 2b.13** Sia (X, Y) un vettore aleatorio di densità congiunta $f(x, y) = x + y$ per $0 < x < 1$; $0 < y < 1$. Calcolare la densità della v.a. $Z = Y/X$.

▷ **Esercizio 2b.2**

Ricordiamo la formula per la densità di $Z = X + Y$, con $X, Y \geq 0$:

$$f_{X+Y}(z) = \int_0^{+\infty} f(x, z-x) dx$$

dove $f(x, y)$ è la densità congiunta di X e Y . Se le v.a. X e Y sono indipendenti, si ottiene la formula di *convoluzione*:

$$f_{X+Y}(z) = \int_0^{+\infty} f_X(x) f_Y(z-x) dx$$

dove f_X e f_Y rappresentano, rispettivamente, la densità di X e quella di Y . Tornando all'enunciato dell'esercizio, siano X, Y e Z v.a. indipendenti e uniformemente distribuite in $[0, 1]$, e poniamo $W = U + Z$ con $U = X + Y$. Ovviamente W assume solo valori in $[0, 2]$, ovvero la sua densità ha per supporto tale intervallo. Dalla formula di convoluzione applicata a X e Y , segue che U ha densità *a triangolo*:

$$f_U(u) = \begin{cases} u & \text{se } u \in [0, 1] \\ 2-u & \text{se } u \in [1, 2] \end{cases}, \quad [0,3]$$

il cui grafico è riportato in Figura 2.




Figura 2: grafico della densità della somma di due v.a. indipendenti e uniformi in $[0, 1]$

occorrerebbe scrivere:
 $1_{[0,1]}(w-u)$;
 ma:
 $0 < w-u < 1 \implies$
 $-w < -u < 1-w$, cioè'
 $w > u > w-1$

Dalla formula di convoluzione applicata a U e Z si ottiene la densità di W :

$$f_W(w) = \int_0^{+\infty} f_U(u) f_Z(w-u) du = \int_0^2 f_U(u) \mathbf{1}_{[w-1,w]}(u) du$$

Occorre esaminare diversi casi:

- (i) se $w < 0$, allora l'integrale sopra è evidentemente nullo **poiche' $[w-1,w]$ non interseca $[0,2]$**
- (ii) se $w \in [0, 1]$, l' integrale sopra vale

$$\int_0^w u du = \frac{w^2}{2}$$



- (iii) se $w \in [1, 2]$, l'integrale sopra vale

$$\int_{w-1}^1 u du + \int_1^w (2-u) du = \dots = -w^2 + 3w - \frac{3}{2}$$



- (iv) se $w \in [2, 3]$, l'integrale sopra vale

$$\int_{w-1}^2 (2-u) du = \dots = \frac{9}{2} - 3w + \frac{1}{2}w^2$$



- (v) se $w > 3$, l'integrale sopra è nullo. **poiche' $[w-1,w]$ non interseca $[0,2]$**

Riassumendo, abbiamo ottenuto:

$$f_W(w) = \begin{cases} 0 & \text{se } w < 0 \\ \frac{w^2}{2} & \text{se } w \in [0, 1] \\ -w^2 + 3w - \frac{3}{2} & \text{se } w \in [1, 2] \\ \frac{1}{2}w^2 - 3w + \frac{9}{2} & \text{se } w \in [2, 3] \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Il grafico di $f_W(w)$ è riportato in Fig. 3.

▷ **Esercizio 2b.3**

La v.a. Z è non negativa.

- (i) Per $z \geq 0$, si ha:

$$P(Z \leq z) = P(\sqrt{X^2 + Y^2} \leq z) = \int \int_{\{x^2+y^2 \leq z^2\}} \frac{1}{2\pi} e^{-(x^2+y^2)/2} dx dy$$

$x = r \cos(\theta)$
 $y = r \sin(\theta)$
 $0 \leq \theta < 2\pi$
 $r^2 = x^2 + y^2$
 $\theta = \arctan(y/x)$

Passando a coordinate polari, l'integrale diventa:

$$\int_0^{2\pi} d\theta \int_0^z \rho d\rho \frac{1}{2\pi} e^{-\rho^2/2} = 1 - e^{-z^2/2}$$

-exp $(-r^2/2)$ calcolato tra
 0 e z
 $= 1 - \exp (-z^2/2)$




Figura 3: grafico della densità della somma di tre v.a. indipendenti e uniformi in $[0, 1]$

La densità di Z è allora:

$$f_Z(z) = \frac{d}{dz}P(Z \leq z) = \begin{cases} ze^{-z^2/2} & \text{se } z \geq 0 \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

(ii) La probabilità richiesta è $P(Z > 1) = 1 - P(Z \leq 1) = 1 - [1 - e^{-1/2}] = e^{-1/2}$.

▷ **Esercizio 2b.4**

Si ha:

$$f_{Y|X}(y|x) = \begin{cases} xe^{-xy} & \text{se } y \geq 0 \\ 0 & \text{se } y < 0 \end{cases}$$

La densità congiunta di (X, Y) è:

$$f(x, y) = f_X(x)f_{Y|X}(y|x) = \begin{cases} \frac{\lambda^\alpha}{\Gamma(\alpha)} x^\alpha e^{-(\lambda+y)x} & \text{se } x \geq 0, y \geq 0 \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Allora, la densità di Y è la seconda marginale di (X, Y) , ovvero:

$$f_Y(y) = \int_0^{+\infty} dx \frac{\lambda^\alpha}{\Gamma(\alpha)} x^\alpha e^{-(\lambda+y)x}.$$

Moltiplicando e dividendo per $\Gamma(\alpha+1)/(\lambda+y)^{\alpha+1}$, la formula sopra si riscrive:

$$\frac{\lambda^\alpha}{\Gamma(\alpha)} \frac{\Gamma(\alpha+1)}{(\lambda+y)^{\alpha+1}} \int_0^{+\infty} dx \frac{x^{(\alpha+1)-1}}{\Gamma(\alpha+1)} e^{-(\lambda+y)x} (\lambda+y)^{\alpha+1} =$$

L'integrale vale 1, poiché la funz. integranda è una densità Gamma ($\alpha+1$, $\lambda+y$)

1

$$= \frac{\lambda^\alpha}{\Gamma(\alpha)} \frac{\Gamma(\alpha+1)}{(\lambda+y)^{\alpha+1}}$$

poiché l'integrale vale 1, essendo la funzione integranda la densità di una v.a. con distribuzione $\Gamma(\alpha+1, \lambda+y)$. Dunque, siccome $\Gamma(\alpha+1) = \alpha\Gamma(\alpha)$, si ottiene per $y \geq 0$:

$$f_Y(y) = \frac{\alpha\lambda^\alpha}{(\lambda+y)^{\alpha+1}}$$

$E(Y)$ esiste finito se e solo se

$$\int_0^{+\infty} \frac{\alpha\lambda^\alpha y}{(\lambda+y)^{\alpha+1}} dy < +\infty$$

la f. integranda
~ $1/y^\alpha$,
per $y \rightarrow +\infty$

il che è vero se $\alpha > 1$.

Integrando per parti, si ottiene:

$$E(Y) = \alpha\lambda^\alpha \int_0^{+\infty} \frac{y}{(\lambda+y)^{\alpha+1}} dy = \dots = \frac{\lambda}{\alpha-1}.$$

Si ha inoltre, per $x \geq 0$:

$$f_{X|Y}(x|y) = \frac{f(x,y)}{f_Y(y)} = \frac{(\lambda+y)^{\alpha+1} x^\alpha e^{-(\lambda+y)x}}{\alpha\Gamma(\alpha)} = \frac{(\lambda+y)^{\alpha+1} x^\alpha e^{-(\lambda+y)x}}{\Gamma(\alpha+1)}$$

che è la densità di una legge $\Gamma(\alpha+1, \lambda+y)$. Ricordando la formula per la media e la varianza di una v.a. con distribuzione Gamma, si trova $E(X|Y) = \frac{\alpha+1}{\lambda+y}$ e $Var(X|Y) = \frac{\alpha+1}{(\lambda+y)^2}$

▷ Esercizio 2b.5

Se $X \neq 0$ e $Z = Y/X$, si ottiene:

$$P(Z \leq t) = \begin{cases} P(Y \leq tX) & \text{se } X > 0 \\ P(Y \geq tX) & \text{se } X < 0 \end{cases}$$

Allora, se $f(x, y)$ denota la densità congiunta di (X, Y) :

$$P(Z \leq t) = \int \int_E f(x, y) dx dy + \int \int_F f(x, y) dx dy$$

Dove E ed F sono gli insiemi indicati in figura 4.




Figura 4

Dunque:

$$P(Z \leq t) = \int_{-\infty}^0 dx \int_{tx}^{+\infty} f(x, y) dy + \int_0^{+\infty} dx \int_{-\infty}^{tx} f(x, y) dy.$$

Derivando tale espressione rispetto a t , si ottiene la densità di $Z = Y/X$

$$f_Z(t) = \int_{-\infty}^0 dx (-x f(x, tx)) + \int_0^{+\infty} dx (x f(x, tx)) = \int_{-\infty}^{+\infty} |x| f(x, tx) dx.$$

▷ **Esercizio 2b.6**

Denotiamo come al solito con $f(x, y)$ la densità congiunta di (X, Y) . Posto $Z = XY$, calcoliamo $P(Z \leq t)$; consideriamo i due casi.


(i) $t \geq 0$

$$P(XY \leq t) = \int \int_{E_1} f(x, y) dx dy + \int \int_{E_2} f(x, y) dx dy + \int \int_{Q_1 \cup Q_2} f(x, y) dx dy$$

ove E_1, E_2, Q_1 e Q_2 sono gli insiemi indicati in figura 5.

Allora:

$$P(XY \leq t) = \int_{-\infty}^0 dx \int_{t/x}^0 dy f(x, y) + \int_0^{+\infty} dx \int_0^{t/x} dy f(x, y)$$



$t > 0$
 $xy < t$
 $y < t/x$ se $x > 0$
 $y > t/x$ se $x < 0$

 $t < 0$
 $xy < t$
 $xy = t < 0$
 $y < t/x$ se $x > 0$
 $y > t/x$ se $x < 0$

Figura 5

$$+ \int \int_{Q_1 \cup Q_2} f(x, y) dx dy$$

Si osservi che l'integrale doppio esteso a $Q_1 \cup Q_2$ non dipende da t . Derivando rispetto a t si ottiene la densità di $Z = XY$ per $t \geq 0$:

$$\begin{aligned}
 f_Z(t) &= \int_{-\infty}^0 dx \left[-f\left(x, \frac{t}{x}\right) \frac{1}{x} \right] + \int_0^{+\infty} dx \left[f\left(x, \frac{t}{x}\right) \frac{1}{x} \right] = \\
 &= \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{|x|} f\left(x, \frac{t}{x}\right) dx .
 \end{aligned}$$

(ii) $t < 0$

$$P(XY \leq t) = \int \int_{F_1} f(x, y) dx dy + \int \int_{F_2} f(x, y) dx dy$$

(v. figura 5).

Allora:

$$P(XY \leq t) = \int_{-\infty}^0 dx \int_{t/x}^{+\infty} dy f(x, y) + \int_0^{+\infty} dx \int_{-\infty}^{t/x} dy f(x, y)$$

Derivando rispetto a t si ottiene la densità di $Z = XY$ per $t < 0$:

$$\begin{aligned} f_Z(t) &= \int_{-\infty}^0 dx f\left(x, \frac{t}{x}\right) \cdot \frac{(-1)}{x} + \int_0^{+\infty} dx f\left(x, \frac{t}{x}\right) \cdot \frac{1}{x} = \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{|x|} f\left(x, \frac{t}{x}\right) dx . \end{aligned}$$

Concludendo, per ogni $z \in (-\infty, +\infty)$ la densità di $Z = XY$ è:

$$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{|x|} f\left(x, \frac{z}{x}\right) dx .$$

densità di $Z = XY$

▷ **Esercizio 2b.7**

Il procedimento

Siccome $X, Y > 0$, si ha $0 < \frac{X}{X+Y} < 1$. Sia $Z = \frac{X}{X+Y}$ e $0 < z < 1$, allora:

$$P(Z \leq z) = P\left(\frac{X}{X+Y} \leq z\right) = P(X \leq z(X+Y)) = P\left(Y \geq \left(\frac{1-z}{z}\right)X\right)$$

Dunque:

$$P(Z \leq z) = \int \int_E f(x, y) dx dy$$

ove $f(x, y)$ è la densità congiunta di (X, Y) e E è l'insieme indicato in figura 6.

Poiché X e Y sono indipendenti e $X \sim \Gamma(\alpha, \lambda)$, $Y \sim \Gamma(\beta, \mu)$, risulta:

$$f(x, y) = \frac{\lambda^\alpha}{\Gamma(\alpha)} x^{\alpha-1} e^{-\lambda x} \frac{\mu^\beta}{\Gamma(\beta)} y^{\beta-1} e^{-\mu y} .$$

Riprendendo il calcolo dell'integrale doppio di sopra:

$$P(Z \leq z) = \int_0^{+\infty} \frac{\lambda^\alpha}{\Gamma(\alpha)} x^{\alpha-1} e^{-\lambda x} dx \int_{(1/z-1)x}^{+\infty} \frac{\mu^\beta}{\Gamma(\beta)} y^{\beta-1} e^{-\mu y} dy .$$




Figura 6

Derivando rispetto a z , si ottiene la densità di Z :

$$\begin{aligned}
 f_Z(z) &= \frac{d}{dz} P(Z \leq z) = \\
 &= \int_0^{+\infty} \frac{\lambda^\alpha}{\Gamma(\alpha)} x^{\alpha-1} e^{-\lambda x} dx \cdot \frac{\mu^\beta}{\Gamma(\beta)} [(1/z - 1)x]^{\beta-1} e^{-\mu(1/z-1)x} \frac{x}{z^2} dx \\
 &= \frac{\lambda^\alpha \mu^\beta}{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)} \cdot \frac{1}{z^2} \int_0^{+\infty} dx e^{-x[\lambda + \mu(1/z-1)]} x^{\alpha-1} (1/z - 1)^{\beta-1} x^{\beta-1} \boxed{\times} (*)
 \end{aligned}$$

Ponendo $\lambda' = \lambda + \mu(1/z - 1)$, la quantità sopra si scrive:

$$\begin{aligned}
 &\frac{\lambda^\alpha \mu^\beta}{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)} \cdot \frac{1}{z^2} (1/z - 1)^{\beta-1} \int_0^{+\infty} dx e^{-\lambda' x} x^{\alpha+\beta-1} = \\
 &= \frac{\lambda^\alpha \mu^\beta}{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)} \cdot \frac{1}{z^2} (1/z - 1)^{\beta-1} \frac{\Gamma(\alpha + \beta)}{(\lambda')^{\alpha+\beta}} \int_0^{+\infty} \frac{(\lambda')^{\alpha+\beta}}{\Gamma(\alpha + \beta)} e^{-\lambda' x} x^{\alpha+\beta-1} dx.
 \end{aligned}$$

Si noti che l'ultimo integrale vale 1, poiché la funzione integranda è una densità $\Gamma(\alpha + \beta, \lambda')$, pertanto si ottiene per $0 < z < 1$:

$$\begin{aligned}
 f_Z(z) &= \frac{\Gamma(\alpha + \beta)}{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)} \cdot \frac{\lambda^\alpha \mu^\beta}{[\lambda + \mu(1/z - 1)]^{\alpha+\beta}} \cdot \frac{1}{z^2} \left(\frac{1}{z} - 1\right)^{\beta-1} = \\
 &= \frac{\Gamma(\alpha + \beta)}{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)} \cdot \frac{\lambda^\alpha \mu^\beta}{[\lambda + \mu(1/z - 1)]^{\alpha+\beta}} z^{-2} z^{-(\beta+1)} (1 - z)^{\beta-1}.
 \end{aligned}$$

In particolare, se $\lambda = \mu$, si ottiene:

$$\begin{aligned} f_Z(z) &= \frac{\Gamma(\alpha + \beta)}{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)} \cdot \frac{\lambda^{\alpha+\beta}}{\lambda^{\alpha+\beta}[1 + 1/z - 1]^{\alpha+\beta}} \cdot \frac{z^{-2}(1-z)^{\beta-1}}{z^{\beta-1}} = \\ &= \frac{\Gamma(\alpha + \beta)}{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)} z^{\alpha-1}(1-z)^{\beta-1} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & z^{\alpha+\beta-1} \\ & z^{\alpha+\beta-1} \\ & z^{\alpha+\beta-2} = z^{\alpha-1} \end{aligned}$$

che è una densità $Beta(\alpha, \beta)$. Pertanto, se X e Y sono indipendenti e $X \sim \Gamma(\alpha, \lambda)$, $Y \sim \Gamma(\beta, \lambda)$, allora $Z = X/(X + Y) \sim Beta(\alpha, \beta)$.

Il procedimento

Ora calcoleremo la densità di Z facendo uso di un cambio di variabili. Ricordiamo prima il procedimento generale, poi lo applicheremo al nostro caso particolare.

Sia $g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ un diffeomorfismo di classe C^1 , che manda (x, y) in (u, v) , ovvero una trasformazione regolare e invertibile, con $(u, v) = g(x, y) = (g_1(x, y), g_2(x, y))$, cioè:

$$\begin{cases} u = g_1(x, y) \\ v = g_2(x, y) \end{cases}$$

oppure, usando la trasformazione inversa, $(x, y) = g^{-1}(u, v)$:

$$\begin{cases} x = (g^{-1})_1(u, v) = h_1(u, v) \\ y = (g^{-1})_2(u, v) = h_2(u, v) \end{cases}$$

Supponiamo che g_i e h_i , $i = 1, 2$ siano di classe C^1 e che $\det(J_{g^{-1}}) \neq 0$, dove $J_{g^{-1}}$ è la matrice Jacobiana della trasformazione inversa, definita da:

$$J_{g^{-1}}(u, v) = \begin{pmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{pmatrix}$$

Consideriamo ora il vettore aleatorio $(U, V) = g(X, Y)$ ottenuto dal vettore aleatorio (X, Y) mediante la trasformazione g che soddisfa le condizioni di sopra; si può dimostrare che la densità del vettore (U, V) è data da:

$$f_{(U,V)}(u, v) = f_{(X,Y)}(h_1(u, v), h_2(u, v)) \cdot |\det(J_{g^{-1}}(u, v))| \quad (**)$$

dove $f_{(X,Y)}$ è la densità di (X, Y) . La densità marginale di U si ottiene integrando $f_{(U,V)}(u, v)$ per $v \in (-\infty, +\infty)$, mentre la marginale di V si ottiene integrando $f_{(U,V)}(u, v)$ per $u \in (-\infty, +\infty)$.

Ritorniamo al caso dell'esercizio, dove $Z = X/(X + Y)$. Consideriamo il cambio di variabili:

$$\begin{cases} x = x \\ y = \frac{x(1-z)}{z} \end{cases}$$

(si noti che l'espressione per y è ottenuta dalla formula $z = x/(x + y)$, dove alle v.a. X e Y sono stati sostituiti i loro valori generici x, y); inoltre, in questo caso risulta $u = x$ e $v = z$, ovvero le nuove variabili sono (x, z)). La matrice Jacobiana della trasformazione inversa è:

$$J_{g^{-1}}(x, z) = \begin{pmatrix} \frac{\partial x}{\partial x} & \frac{\partial x}{\partial z} \\ \frac{\partial y}{\partial x} & \frac{\partial y}{\partial z} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ \frac{1-z}{z} & -\frac{x}{z^2} \end{pmatrix}$$

e, calcolando il determinante, si ottiene $|\det J_{g^{-1}}(x, z)| = \frac{|x|}{z^2}$. Quindi, per la (**), la densità del vettore aleatorio (X, Z) è:

$$f_{(X,Y)}\left(x, \frac{x(1-z)}{z}\right) \cdot \frac{|x|}{z^2}.$$

Infine, la densità di Z (seconda marginale) è:

$$\begin{aligned} f_Z(z) &= \int_{-\infty}^{+\infty} f_{(X,Y)}\left(x, \frac{x(1-z)}{z}\right) \cdot \frac{|x|}{z^2} dx = \\ &= \int_0^{+\infty} \frac{x}{z^2} \cdot \frac{\lambda^\alpha}{\Gamma(\alpha)} \cdot x^{\alpha-1} e^{-\lambda x} \frac{\mu^\beta}{\Gamma(\beta)} (x(1/z - 1))^{\beta-1} e^{-\mu x(1/z-1)} dx \end{aligned}$$

che coincide con l'espressione (*) precedentemente trovata, dalla quale segue la forma finale di f_Z .

▷ Esercizio 2b.8

Ricordiamo che se $X \sim \mathcal{N}(0, 1)$, si ha $X^2 \sim \Gamma(1/2, 1/2)$. Quindi, se $X, Y \sim \mathcal{N}(0, 1)$ e sono indipendenti, allora $U = X^2$ e $V = Y^2$ sono indipendenti ed hanno distribuzione $\Gamma(1/2, 1/2)$.

Pertanto, si può scrivere $Z = U/(U + V)$ con U e V indipendenti e con legge $\Gamma(1/2, 1/2)$.

Per l'Esercizio 2b7 con $\alpha = \beta = \lambda = \mu = 1/2$, si ottiene che la densità di Z è:

$$\begin{aligned} f_Z(z) &= \frac{\Gamma(1)}{(\Gamma(\frac{1}{2}))^2} z^{-1/2}(1-z)^{-1/2}, \quad z \in (0, 1) \\ &= \frac{1}{\pi} \cdot \frac{1}{\sqrt{z}} \cdot \frac{1}{\sqrt{1-z}} \end{aligned}$$

$$\frac{1}{\pi} \cdot z^{-1/2} \cdot (1-z)^{-1/2}$$

che è una densità $Beta(1/2, 1/2)$.

▷ Esercizio 2b.9

Se $0 < z < 1$ e $Z = X/(X + Y)$, si ha:

$$P(Z \leq z) = P\left(Y \geq \left(\frac{1-z}{z}\right) X\right) =$$

$$\begin{aligned}
&= \int_0^{+\infty} dx \int_{(1/z-1)x}^{+\infty} dy \lambda e^{-\lambda x} \lambda e^{-\lambda y} = \\
&= \lambda^2 \int_0^{+\infty} dx e^{-\lambda x} \int_{(1/z-1)x}^{+\infty} dy e^{-\lambda y}.
\end{aligned}$$

Derivando rispetto a z , si ottiene la densità di Z :

$$f_Z(z) = \frac{\lambda^2}{z^2} \int_0^{+\infty} dx e^{-\lambda x} x e^{-\lambda(1/z-1)x} = \frac{\lambda}{z} \int_0^{+\infty} dx \frac{\lambda x}{z} e^{-\lambda x/z}$$

Siccome l'integrale rappresenta la media di una v.a. esponenziale di parametro λ/z , esso vale z/λ . In conclusione, si ottiene:

$$f_Z(z) = \frac{\lambda}{z} \cdot \frac{z}{\lambda} = 1, \quad z \in (0, 1)$$

Dunque, $Z \sim Uni((0, 1))$.

▷ **Esercizio 2b.10**

Se $0 < z < 1$ e $Z = X^2/(X^2 + Y^2)$, si ha:

$$\begin{aligned}
P(Z \leq z) &= P(X^2 \leq z(X^2 + Y^2)) = P\left(Y^2 \geq X^2 \left(\frac{1-z}{z}\right)\right) = \\
&= P(Y \geq X\sqrt{1/z-1})
\end{aligned}$$

(X e Y sono ≥ 0)

$$= \int_0^{+\infty} dx \int_{x\sqrt{1/z-1}}^{+\infty} dy \lambda e^{-\lambda x} \lambda e^{-\lambda y}.$$

Derivando rispetto a z , si ottiene la densità di Z :

$$\begin{aligned}
f_Z(z) &= \frac{d}{dz} P(Z \leq z) = \lambda^2 \int_0^{+\infty} dx \frac{x}{z^2} \frac{e^{-\lambda x} e^{-\lambda x \sqrt{1/z-1}}}{2\sqrt{1/z-1}} \\
&= \frac{\lambda}{2z^2} \frac{\sqrt{z}}{\sqrt{1-z}} \frac{1}{1+\sqrt{1/z-1}} \int_0^{+\infty} x \cdot \lambda(1+\sqrt{1/z-1}) e^{-\lambda(1+\sqrt{1/z-1})x} dx
\end{aligned}$$

Siccome l'integrale rappresenta la media di una v.a. esponenziale di parametro $\lambda(1+\sqrt{1/z-1})$, esso vale $[\lambda(1+\sqrt{1/z-1})]^{-1}$. In conclusione, si ottiene:

$$f_Z(z) = \frac{\lambda}{2z^{3/2}} \frac{1}{\sqrt{1-z}} \frac{1}{1+\sqrt{1/z-1}} \frac{1}{\lambda(1+\sqrt{1/z-1})} = \dots =$$

$$= \frac{1}{2} \frac{1}{2z(1-z) + \sqrt{z(1-z)}}, \quad 0 < z < 1.$$

▷ **Esercizio 2b.11**

(i) Per il Teorema di addizione di v.a. Gaussiane indipendenti, risulta $Y \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2 + 1)$.

Consideriamo ora la trasformazione $g : (X, W) \rightarrow (X, Y)$ con

$$\begin{cases} X = X \\ W = Y - X \end{cases}$$

$$J_{g^{-1}}(x, y) = \begin{pmatrix} \frac{\partial x}{\partial x} & \frac{\partial x}{\partial y} \\ \frac{\partial w}{\partial x} & \frac{\partial w}{\partial y} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}, \quad |\det J_{g^{-1}}| = 1$$

Allora, (v. Esercizio 2b.7, II procedimento) la densità congiunta di X e Y è:

$$f(x, y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2} \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-(y-x)^2/2\sigma^2} = \frac{1}{2\pi\sigma} e^{-x^2/2} e^{-(y-x)^2/2\sigma^2}$$

(ii) Risulta:

$$\begin{aligned} f_{X|Y}(x|y) &= \frac{f(x, y)}{f_Y(y)} = \frac{\frac{1}{2\pi\sigma} e^{-x^2/2} e^{-(y-x)^2/2\sigma^2}}{\frac{1}{\sqrt{\sigma^2+1}} \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-y^2/2(\sigma^2+1)}} = \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \cdot \frac{1}{\sigma\sqrt{\sigma^2+1}} \cdot e^{\frac{-(x-y/(\sigma^2+1))^2}{2\sigma^2/(\sigma^2+1)}} \end{aligned}$$

che è una densità $\mathcal{N}\left(\frac{y}{\sigma^2+1}, \frac{\sigma^2}{\sigma^2+1}\right)$. Pertanto, $E(X|Y = y) = y/(\sigma^2 + 1)$.

(iii) Se $y = \frac{11}{20}$ e $\sigma^2 = 0.1$, risulta $X|Y \sim \mathcal{N}\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{11}\right)$. Quindi, $P(1/4 < X < 3/4|Y = 11/20) = P(1/4 < Z < 3/4)$ ove $Z \sim \mathcal{N}(1/2, 1/11)$. Dunque, la probabilità cercata è uguale a

$$P\left(\frac{1}{4} - \frac{1}{2} < \frac{Z - \frac{1}{2}}{\sqrt{\frac{1}{11}}} < \frac{3}{4} - \frac{1}{2}\right) = P\left(\frac{1}{4} - \frac{1}{2} < W < \frac{3}{4} - \frac{1}{2}\right),$$

dove $W \sim \mathcal{N}(0, 1)$. In conclusione:

$$\begin{aligned} P(1/4 < X < 3/4|Y = 11/20) &= \Phi\left(\frac{3}{4} - \frac{1}{2}\right) - \Phi\left(\frac{1}{4} - \frac{1}{2}\right) = \\ &= \Phi(0.82) - \Phi(-0.82) \end{aligned}$$

dove $\Phi(t) = P(W \leq t)$ è la funzione di distribuzione di una v.a. $\mathcal{N}(0, 1)$. Per la simmetria della densità normale standard si ricava $\Phi(-t) = 1 - \Phi(t)$, per cui la probabilità cercata è uguale a $\Phi(0.82) - (1 - \Phi(0.82)) = 2\Phi(0.82) - 1$; dalla tavola della distribuzione normale standard si ottiene $\Phi(0.82) = 0.7938$, per cui il risultato finale è $2 \cdot 0.7938 - 1 = 0.58$.

▷ **Esercizio 2b.12**

Risolviamo l'esercizio per $\lambda = 1$, ovvero supponiamo che X, Y siano indipendenti e con distribuzione esponenziale di parametro 1; ci proponiamo di trovare la densità di $Z = (X - Y)/(X + Y)$. Intanto, osserviamo che risulta $-1 < Z < 1$ quasi certamente.

I procedimento

Per $z \in (-1, 1)$ si ha:

$$P(Z \leq z) = P\left(\frac{X-Y}{X+Y} \leq z\right) = P\left(Y \geq \frac{X(1-z)}{1+z}\right) = \iint_E e^{-x} e^{-y} dx dy$$

dove E è l'insieme indicato in figura 7.




Figura 7

Allora:

$$\begin{aligned} P(Z \leq z) &= \int_0^{+\infty} dx \int_{x(1-z)/(1+z)}^{+\infty} dy e^{-x} e^{-y} = \\ &= \int_0^{+\infty} dx e^{-x} \left(e^{-x(1-z)/(1+z)} \right) = \\ &= \int_0^{+\infty} e^{-x(\frac{2}{1+z})} dx = \frac{1+z}{2}. \end{aligned}$$

Derivando rispetto a z , si ottiene che la densità di Z è $f_Z(z) = 1/2$, per $-1 < z < 1$, ovvero $Z \sim Uni((-1, 1))$.

II procedimento

Consideriamo la trasformazione $g : (X, Y) \rightarrow (X, Z)$

$$\begin{cases} X = X \\ Z = \frac{X-Y}{X+Y} \end{cases} \quad \text{ovvero} \quad \begin{cases} X = X \\ Y = \frac{X(1-Z)}{1+Z} \end{cases}$$

con

$$J_{g^{-1}}(x, z) = \begin{pmatrix} \frac{\partial x}{\partial x} & \frac{\partial x}{\partial z} \\ \frac{\partial y}{\partial x} & \frac{\partial y}{\partial z} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ \frac{1-z}{1+z} & \frac{-2x}{(1+z)^2} \end{pmatrix}, \quad \det J_{g^{-1}}(x, z) = -\frac{2x}{(1+z)^2}$$

La densità congiunta di (X, Z) è allora:

$$f_{(X,Z)}(x, z) = e^{-x} e^{-x(1-z)/(1+z)} \frac{|2x|}{(1+z)^2} = e^{-x} e^{-x(1-z)/(1+z)} \frac{2x}{(1+z)^2},$$

per $x > 0$ e $-1 < z < 1$, altrimenti $f_{(X,Z)}(x, z) = 0$. Pertanto, la densità di Z è, per $-1 < z < 1$:

$$\begin{aligned} f_Z(z) &= \int_0^{+\infty} dx e^{-x(1+\frac{1-z}{1+z})} \frac{2x}{(1+z)^2} = \frac{2}{(1+z)^2} \int_0^{+\infty} e^{-2x/(1+z)} x dx = \\ &= \frac{2}{(1+z)^2} \frac{1+z}{2} \int_0^{+\infty} \frac{2}{1+z} e^{-2x/(1+z)} x dx. \end{aligned}$$

L'integrale è uguale alla media di una v.a esponenziale di parametro $2/(1+z)$, quindi esso vale $(1+z)/2$; pertanto:

$$f_Z(z) = \frac{2}{(1+z)^2} \frac{1+z}{2} \cdot \frac{1+z}{2} = \frac{1}{2}$$

cioè $Z \sim Uni((-1, 1))$, come già trovato.

▷ Esercizio 2b.13

Si ha:

$$P(Z \leq z) = \iint_{[0,1]^2 \cap \{y \leq zx\}} (x+y) dx dy$$

ove l'insieme $[0, 1]^2 \cap \{y \leq zx\}$ è indicato nella figura 8 (si noti che occorre differenziare il caso $0 \leq z \leq 1$ da quello in cui $z > 1$).

(i) $0 \leq z \leq 1$

$$P(Z \leq z) = \int_0^1 dx \int_0^{zx} (x+y) dy = \int_0^1 dx (zx^2 + z^2 x^2/2) = z/3 + z^2/6$$

(ii) $z > 1$

$$P(Z \leq z) = \int_0^1 dy \int_{y/z}^1 (x+y) dx = \int_0^1 dy \left[x^2/2 + yx \right]_{y/z}^1 = \dots = 1 - \frac{1}{6z^2} - \frac{1}{3z}.$$




Figura 8

Derivando, si ottiene la densità di Z :

$$f_Z(z) = \begin{cases} \frac{1}{3} + \frac{1}{3}z & \text{se } 0 \leq z \leq 1 \\ \frac{1}{3z^3} + \frac{1}{3z^2} & \text{se } z > 1. \end{cases}$$

▷ **Esercizio 2b.14**

Si ha:

$$\begin{aligned} f_X(x) &= \int_{-\infty}^{+\infty} dy e^{-y} \mathbf{1}_{\{0 < x < y\}}(x, y) = \\ &= \int_x^{+\infty} e^{-y} dy = \left[-e^{-y} \right]_x^{+\infty} = e^{-x}, \text{ se } x > 0. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f_Y(y) &= \int_{-\infty}^{+\infty} dx e^{-y} \mathbf{1}_{\{0 < x < y\}}(x, y) = \\ &= \int_0^y e^{-y} dx = ye^{-y}, \text{ se } y > 0 \end{aligned}$$

Inoltre, se $Z = Y - X$, risulta quasi certamente $Z \geq 0$ e, per $z \geq 0$:

$$P(Z \leq z) = P(Y - X \leq z) = \int \int_E e^{-y} \mathbf{1}_{\{0 < x < y\}}(x, y) dx dy,$$