

1. Siano $d, n \in \mathbf{Z}_{\geq 1}$ e supponiamo che d sia un divisore di n .
 - (a) Dimostrare che l'applicazione $r : \mathbf{Z}_n \rightarrow \mathbf{Z}_d$ data da $r(a \pmod n) = (a \pmod d)$ è un'omomorfismo ben definito. Far vedere che è suriettivo.
 - (b) Dimostrare che l'applicazione $r : \mathbf{Z}_n^* \rightarrow \mathbf{Z}_d^*$ data da $r(a \pmod n) = (a \pmod d)$ è un'omomorfismo ben definito. Far vedere che è suriettivo.
2. Sia G un gruppo e sia $g \in G$. Sia $f : \mathbf{Z} \rightarrow G$ l'applicazione definita da $f(n) = g^n$. Dimostrare che f è un omomorfismo e descrivere il nucleo e l'immagine in termini dell'ordine dell'elemento g .
3. Sia G il gruppo $\mathbf{Z}_8^* = \{\bar{1}, \bar{3}, \bar{5}, \bar{7}\}$. Determinare le classi laterali dei sottogruppi $H_1 = \{\bar{1}, \bar{3}\}$, $H_2 = \{\bar{1}, \bar{5}\}$ e di $H_3 = \{\bar{1}, \bar{7}\}$.
4. Dimostrare che il gruppo quoziente \mathbf{C}/\mathbf{R} è isomorfo a \mathbf{R} .
5. Sia $H \subset \mathbf{Z}_{31}^*$ il sottogruppo generato da $\bar{2}$.
 - (a) Quanti elementi ha H ? Quanti elementi ha il gruppo quoziente \mathbf{Z}_{31}^*/H ?
 - (b) Dimostrare che \mathbf{Z}_{31}^*/H è ciclico.
6. Dimostrare che il gruppo quoziente $\mathbf{R}^*/\{+1, -1\}$ è isomorfo al gruppo additivo \mathbf{R} .
7. Sia G il gruppo $\mathbf{Z}_2 \times \mathbf{Z}_8$ e sia H il sottogruppo generato dall'elemento v . Nei seguenti casi determinare l'ordine di v e determinare la struttura del gruppo quoziente G/H .
 - (a) $v = (\bar{0}, \bar{2})$; (b) $v = (\bar{1}, \bar{0})$; (c) $v = (\bar{1}, \bar{2})$.
8. Sia $G = \mathbf{Z}_{20}^*$.
 - (a) Sia H il sottogruppo generato da $\bar{9}$. Stabilire se il gruppo quoziente G/H è ciclico o meno.
 - (b) Sia H il sottogruppo generato da $\bar{19}$. Stabilire se il gruppo quoziente G/H è ciclico o meno.
9. Sia G un gruppo e siano H e H' due sottogruppi di G con le seguenti proprietà:
 - $hh' = h'h$ per ogni $h \in H, h' \in H'$,
 - $H \cap H' = \{e\}$,
 - Per ogni $g \in G$ ci sono $h \in H$ e $h' \in H'$ tali che $g = hh'$.

Dimostrare che l'applicazione

$$f : H \times H' \rightarrow G$$

data da $f(h, h') = hh'$ è un isomorfismo.

10. Sia S il sottogruppo moltiplicativo $\{z \in \mathbf{C} : |z| = 1\}$ di \mathbf{C}^* . Dimostrare che

$$\mathbf{C}^* \cong \mathbf{R}_{>0} \times S.$$

(Sugg. utilizzare l'esercizio precedente.)