Analisi I per Ingegneria Online, Sessione estivo, primo appello
15-06-2020 A.A. 2019/2020

Nome(Stampatello)

Cognome(Stampatello)

Matricola

Le risposte vanno motivate. Se immotivate, ancorché esatte, non verranno prese in considerazione. **Chi intende ritirarsi scriva ritirata/o sotto il proprio cognome**

Si possono consultare libri, appunti, note etc.

1) Dopo aver trovato l'insieme di definizione della funzione $f(x) = \frac{-x}{2} + \ln\left(1 + \frac{e^x - 1}{e^x + 1}\right)$ disegnarne il grafico specificando i punti di minimo/massimo, gli intervalli di crescita e decrescenza, il comportamento della derivata nei punti salienti del dominio, la concavità, eventuali asintoti.

1.1) Argomentando dire se converge o meno la serie $\sum_{k=1}^{+\infty} |f(k)|^{-2}$

1.2) Argomentando dire se converge o meno la serie $\sum_{k=1}^{+\infty} f(1/k)$

1.3) Argomentando trovare il massimo valore di a per cui converge o meno la serie $\sum_{k=1}^{+\infty} k^a (f(1/k) - f(-1/k))$

2) Discutere al variare di $a \in \mathbf{R}$ la convergenza dell'integrale $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{\ln x (|\sin(\pi x)|)^a + x^2 - 1}$

3) Calcolare $\lim_{n \rightarrow +\infty} n^2 \sin\left(18\pi \sqrt[3]{n^3 + n^2}\right) + 2\pi n \cos \frac{1}{n}$

4) Usando lo sviluppo di MacLaurin con resto di Lagrange della funzione e^x , stimare $e^{1/4}$ a meno di 2^{-12} (stimare significa trovare un numero razionale p/q tale che $|e^{1/4} - p/q| \leq 2^{-12}$). Riportare per esteso i calcoli e ricordare che non si può scrivere nessun numero ricavato dalla calcolatrice. Ogni calcolo deve essere ricavato "a mano" ed esposto in modo completo

Soluzioni

1) La funzione è $f(x) = \frac{-x}{2} + \ln 2 + x - \ln(1 + e^x) = \ln 2 + \frac{x}{2} - \ln(1 + e^x)$ per cui il dominio è $\mathbf{R}$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln 2 + \frac{x}{2} - x - \ln(1 + e^{-x}) = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln 2 + \frac{x}{2} - x - \ln(1 + e^{-x}) = -\infty$$

$$f'(x) = \frac{1}{2} - \frac{e^x}{1 + e^x} = \frac{1 - e^x}{2(1 + e^x)}$$

per cui cresce a sinistra e decresce a destra. $x = 0$ è di massimo.

Il grafico è

1.1) Se dimostriamo che $\lim_{k \rightarrow +\infty} \frac{k^a}{|f(k)|^2} = L (\neq +\infty)$ con $a > 1$, abbiamo la convergenza. Basta prendere $a = 3/2$ e si ha $L = 0$ (la dimostrazione la lascio agli studenti)

1.2) Estraiamo il comportamento della della funzione in $x = 0$.

$$f(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{1}{2}f''(c)x^2 = \frac{1}{2}f''(c)x^2, \quad (x - |x|)/2 < c < (x + |x|)/2$$

L'unica cosa da verificare è che $f''(c)$ è limitata in un intervallo che comprende $x = 0$ e per questo è sufficiente verificare che $f''(0) \neq \pm\infty$ e che $f''(x)$ è continua in $x = 0$. La continuità ci dice che $f''(x)$ non si discosta troppo da $f''(0)$ se x è vicino a $x = 0$. Essendo $f''(x) = \frac{-e^x}{(1 + e^x)^2}$ sono vere entrambe le condizioni.

Tenendo conto che al posto di x ci va $1/k$, possiamo dire che la serie converge.

Un altro modo di procedere è studiare direttamente il comportamento di $f(1/k)$.

$$\begin{aligned} f\left(\frac{1}{k}\right) &= \ln 2 + \frac{1}{2k} - \ln(1 + e^{\frac{1}{k}}) = \ln 2 + \frac{1}{2k} - \ln(1 + e^{\frac{1}{k}} - 2 + 2) = \ln 2 + \frac{1}{2k} - \ln 2 - \ln\left(1 + \frac{e^{1/k} - 1}{2}\right) = \\ &= \frac{1}{2k} - \frac{e^{1/k} - 1}{2} + O\left((e^{1/k} - 1)^2\right) = \frac{1}{2k} - \frac{1 + \frac{1}{k} + O(k^{-2}) - 1}{2} + O(k^{-2}) = O(k^{-2}) \end{aligned}$$

1.3) Provare che $f(x) = f(-x)$ e quindi $f(1/k) - f(-1/k) \equiv 0$. La serie converge per ogni valore di a .

2) Guardando il precedente compito, si vede che a $+\infty$ converge per ogni a .

Vediamo ora la convergenza nell'intorno di $x = 1$.

Sia $a > 0$.

$$\lim_{x \rightarrow 1} (x-1)f(x) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x-1}{\ln x |\sin(\pi x)|^a + (x-1)(x+1)} = 1/2 (\neq 0)$$

e quindi l'integrale diverge. Sia $a = 0$. Lo stesso limite vale 3 e quindi l'integrale diverge

Sia $a < 0$. La funzione diventa ($a = -|a|$)

$$\frac{|\sin(\pi(x-1) + \pi)|^{|a|}}{\ln x + (x-1)(x+1) |\sin(\pi(x-1) + \pi)|^{|a|}} = \frac{|\sin(\pi(x-1))|^{|a|}}{\ln x + (x-1)(x+1) |\sin(\pi(x-1))|^{|a|}}$$

ed osserviamo che la funzione è asintotica a $\pi(x-1)^{|a|-1}$ il cui esponente è minore di zero ma maggiore di -1 per cui si ha convergenza. Per dimostrarlo basta far vedere che

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1^+} (x-1)^{1-|a|} \frac{|\sin(\pi(x-1))|^{|a|}}{\ln x + (x-1)(x+1) |\sin(\pi(x-1))|^{|a|}} &= \\ = \lim_{x \rightarrow 1^+} \underbrace{\frac{|\sin(\pi(x-1))|^{|a|}}{(x-1)^{|a|}}}_{\rightarrow \pi} \underbrace{\frac{(x-1)}{\ln x}}_{\rightarrow 1} \frac{1}{\underbrace{(x-1)(x+1) |\sin(\pi(x-1))|^{|a|}}_{\ln x}}}_{\rightarrow 0} &= \pi \end{aligned}$$

3) $(1+x)^a = 1 + ax + \frac{a(a-1)}{2}x^2 + \frac{a(a-1)(a-2)}{6}x^3 + O(x^4)$ per $x \rightarrow 0$ da cui

$$18\pi n \sqrt[3]{1 + \frac{1}{n}} = 18\pi n \left(1 + \frac{1}{3n} - \frac{1}{9n^2} + \frac{5}{81n^3} + O\left(\frac{1}{n^4}\right) \right) = 18\pi n + 6\pi - \frac{2\pi}{n} + \frac{10\pi}{9n^2} + O\left(\frac{1}{n^3}\right)$$

da cui

$$\sin \left(18\pi n \sqrt[3]{1 + \frac{1}{n}} \right) = \sin \left(-\frac{2\pi}{n} + \frac{10\pi}{9n^2} + O\left(\frac{1}{n^3}\right) \right) = \frac{-2\pi}{n} + \frac{10\pi}{9n^2} + O\left(\frac{1}{n^3}\right)$$

$$2\pi n \cos \frac{1}{n} = 2\pi n \left(1 - \frac{1}{2n^2} + O\left(\frac{1}{n^4}\right) \right)$$

e quindi

$$n^2 \sin \left(18\pi \sqrt[3]{n^3 + n^2} \right) - 2\pi n \cos \frac{1}{n} = -2\pi n + \frac{10\pi}{9} + O\left(\frac{1}{n}\right) + 2\pi n - \frac{\pi}{n} + O\left(\frac{1}{n^3}\right) \rightarrow \frac{10\pi}{9}$$

4) $e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + \frac{e^c}{24}x^4$, $0 < c < 1/4$. Ponendo $x = 1/4$ dobbiamo mostrare che

$$\frac{e^{1/4}}{24 \cdot 256} < \frac{1}{4096}$$

Basta dimostrare che

$$\frac{e^{1/4}}{24 \cdot 256} < \frac{3^{1/4}}{24 \cdot 256} < \frac{3}{2} \frac{1}{24 \cdot 256} = \frac{1}{4096}$$

Quindi ci siamo ridotti a $3^{1/4} < 3/2$ ossia $3 < 81/16$ che è certamente vera. La frazione p/q è pari a $(21067)/(16512)$