Svolgimento esame Gennaio - I

Esercizio 1

Svolgimento 1: Tenendo conto dello sviluppo, per $x \rightarrow 0$,

$$\text{sen } x = x + o(x),$$

si ha

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow +\infty} n \text{sen}(2\pi\sqrt{n^2 + a}) &= \lim_{n \rightarrow +\infty} n \text{sen}(2\pi\sqrt{n^2 + a} - 2\pi\sqrt{n^2}) \\ &= \lim_{n \rightarrow +\infty} n \text{sen} \left(2\pi(\sqrt{n^2 + a} - \sqrt{n^2}) \right) \\ &= \lim_{n \rightarrow +\infty} n \text{sen} \left(2\pi \frac{\cancel{n^2} + a - \cancel{n^2}}{\sqrt{n^2 + a} + \sqrt{n^2}} \right) \\ &= \lim_{n \rightarrow +\infty} n \left[\frac{2\pi a}{\sqrt{n^2 + a} + \sqrt{n^2}} + o\left(\frac{1}{n}\right) \right] \\ &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \left[\cancel{n} \frac{2\pi a}{\cancel{n} \sqrt{1 + \frac{a}{n^2}} + 1} + \frac{o(1/n)}{(1/n)} \right] \\ &= \pi a \end{aligned}$$

Osservazione: nella penultima uguaglianza si è usato

$$o\left(\frac{2\pi a}{\sqrt{n^2 + a} + \sqrt{n^2}}\right) = o\left(\frac{1}{n}\right).$$

Svolgimento 2: Usando anche lo sviluppo, per $x \rightarrow 0$,

$$(1 + x)^{1/2} = 1 + \frac{1}{2}x + o(x),$$

otteniamo

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow +\infty} n \text{sen}(2\pi\sqrt{n^2 + a}) &= \lim_{n \rightarrow +\infty} n \text{sen} \left(2\pi n \sqrt{1 + \frac{a}{n^2}} \right) \\ &= \lim_{n \rightarrow +\infty} n \text{sen} \left(2\pi n \left(1 + \frac{a}{2n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right) \right) \right) \\ &= \lim_{n \rightarrow +\infty} n \text{sen} \left(2\pi n + \frac{\pi a}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right) \right) \\ &= \lim_{n \rightarrow +\infty} n \text{sen} \left(\frac{\pi a}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right) \right) \\ &= \lim_{n \rightarrow +\infty} n \left(\frac{\pi a}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right) \right) \\ &= \pi a. \end{aligned}$$

Esercizio 2

Dominio, segno, intersezione con gli assi:

$$\mathcal{D}(f) = \mathbb{R}, \quad f(x) > 0 \quad \text{per } x > a, \quad f(x) = 0 \quad \text{per } x = \pm a, \quad f(0) = -a.$$

Asintoti: c'è uno stesso asintoto obliquo a $\pm\infty$ rappresentato da

$$y = mx + q, \quad \text{con } m = 1 \quad \text{e } q = \frac{a}{3}.$$

Infatti:

$$m := \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{\sqrt[3]{(x-a)(x+a)^2}}{x} = 1;$$

$$\begin{aligned} q &= \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \sqrt[3]{(x-a)(x+a)^2} - x \\ &= \lim_{x \rightarrow \pm\infty} x \left[\sqrt[3]{\left(1 - \frac{a}{x}\right) \left(1 + \frac{a}{x}\right)^2} - 1 \right] \\ &= \lim_{y \rightarrow 0} \frac{\sqrt[3]{(1-ay)(1+ay)^2} - 1}{y} \\ &\stackrel{H}{=} \lim_{y \rightarrow 0} \frac{1}{3[(1-ay)(1+ay)^2]^{2/3}} \cdot [-a(1+ay)^2 + 2a(1+ay)(1-ay)] \\ &= \frac{a}{3}. \end{aligned}$$

Osserviamo che intersecando la funzione con il suo asintoto si trova un solo punto di intersezione, di ascissa $-\frac{7}{9}a$.

Derivata:

$$f'(x) = \frac{1}{3} \frac{3x-a}{(x-a)^{2/3}(x+a)^{1/3}} \quad \text{per } x \neq \pm a.$$

Poiché

$$\lim_{x \rightarrow -a^\pm} f'(x) = \mp\infty,$$

$$\lim_{x \rightarrow a^\pm} f'(x) = +\infty,$$

possiamo dedurre dal teorema di de l'Hôpital che f non è derivabile in $\pm a$, che in $-a$ c'è una cuspidè e in a c'è un punto a tangente verticale.

Inoltre

$$f'(x) > 0, \quad \text{quindi } f \text{ è crescente, sulle semirette } (-\infty, -a) \text{ e } (a/3, +\infty);$$

$$f'(x) < 0, \quad \text{quindi } f \text{ decrescente, per } x \in (-a, a/3);$$

$$f'(x) = 0, \quad \text{quindi un punto stazionario, per } x = \frac{a}{3}.$$

Possiamo dedurre allora che $x_m := \frac{a}{3}$ è un punto di minimo relativo. Osserviamo che x_m non è un punto di minimo assoluto perché

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty.$$

Grafico:

Figure 1: Tratteggiati l'asintoto obliquo e la tangente nel punto di ascissa $x = a$

Esercizio 3

Integrabilità in (un intorno di) 0: Detta f_α la funzione integranda, ed osservando che

$$\frac{\sin x - x}{\sqrt{1+x^2} - 1} = \frac{-\frac{1}{6}x^3 + o(x^4)}{\frac{1}{2}x^2 + o(x^2)} = -\frac{x^3}{6} \frac{2}{x^2} \frac{1+o(x^2)}{1+o(x)} = -\frac{1}{3}x(1+o(x)) = -\frac{1}{3}x + o(x)$$

risulta

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f_\alpha(x)}{\left(\frac{2}{3}x\right)^\alpha \log x} = a > 0.$$

Per confronto asintotico, abbiamo allora che l'integrabilità in 0 della funzione f_α equivale all'integrabilità in 0 di $\left(\frac{2}{3}x\right)^\alpha \log x$, che è integrabile se e solo se $\alpha > -1$.

Integrabilità in (un intorno di) a : Siccome

$$\lim_{x \rightarrow a^-} \frac{f_\alpha(x)}{\log\left(\frac{1}{a-x}\right)} = \left(\frac{a - \operatorname{sen} a}{\sqrt{1 + a^2} - 1}\right) \cdot (2a) \cdot 1 > 0 \quad \forall \alpha \in \mathbb{R}$$

e poiché

$$\int_0^a \log\left(\frac{1}{a-x}\right) dx = \int_{1/a}^{+\infty} \frac{1}{y^2} \log y dy \quad \text{è un valore finito,}$$

possiamo concludere che f_α è integrabile in un intorno di a per ogni $\alpha \in \mathbb{R}$.

Concludendo, **l'integrale proposto è convergente se e solo se $\alpha > -1$.**

Calcolo per $\alpha = 0$:

$$\begin{aligned} & \int_0^a (x+a) \log \frac{x}{a-x} dx \\ &= \lim_{c \rightarrow 0^+} \int_c^a (x+a) \log x dx - \lim_{c \rightarrow a^-} \int_0^c (x+a) \log(a-x) dx \\ &= \lim_{c \rightarrow 0^+} \left[\left(\frac{1}{2}x^2 + ax \right) \log x - \frac{1}{4}x^2 - ax \right]_c^a \\ & \quad - \lim_{c \rightarrow a^-} \left[\left(-\frac{1}{2}x^2 - ax + \frac{3}{2}a^2 \right) \log(a-x) + \frac{1}{2} \left(\frac{x^2}{2} + 3ax \right) \right] \\ &= \frac{3}{2}a^2 \log a - \frac{5}{4}a^2 + \frac{7}{4}a^2 - \frac{3}{2}a^2 \log a \\ &= \frac{1}{2}a^2. \end{aligned}$$

Esercizio 4

Risulta

- $\operatorname{sen} x^2 = x^2 + o(x^5)$
- $\log(1+t) = t - \frac{t^2}{2} + \frac{t^3}{3} + o(t^3)$
- $(\operatorname{sen} x)^2 = \left(x - \frac{x^3}{6} + o(x^3)\right)^2 = x^2 - \frac{1}{3}x^4 + o(x^5)$

- $\log(1 + \operatorname{sen}^2 x) = (x^2 - \frac{1}{3}x^4 + o(x^5)) - \frac{1}{2}(x^2 - \frac{1}{3}x^4 + o(x^5))^2 + o(x^5)$
 $= x^2 - \frac{1}{3}x^4 - \frac{1}{2}x^4 + o(x^5) = x^2 - \frac{5}{6}x^4 + o(x^5)$
- $\log(1 + \operatorname{sen}^2 x) - \operatorname{sen} x^2 = \cancel{x^2} - \frac{5}{6}x^4 - \cancel{x^2} + o(x^5) = -\frac{5}{6}x^4 + o(x^5)$.

Nella penultima relazione abbiamo usato la proprietà

$$\left(x^2 - \frac{1}{3}x^4 + o(x^5)\right)^3 = x^6 \left(1 - \frac{1}{3}x^2 + o(x^3)\right)^3 = o(x^5).$$

Riassumendo:

$$\begin{aligned} (x+a)^2 [\log(1 + \operatorname{sen}^2 x) - \operatorname{sen} x^2] &= (a^2 + 2ax + x^2) \left(-\frac{5}{6}x^4 + o(x^5)\right) \\ &= -\frac{5}{6}a^2x^4 - \frac{5}{3}ax^5 + o(x^5). \end{aligned}$$

Esercizio 5

Risolviamo l'equazione $z^2 + i\bar{z} = 1$. Gli altri testi proposti si svolgono in modo analogo.

Scritto $z = a + bi$, con $a, b \in \mathbb{R}$, si ha

$$z^2 = (a^2 - b^2) + (2ab)i, \quad i\bar{z} = i(a - bi) = b + ai.$$

Quindi l'equazione proposta è verificata se

$$(a^2 - b^2) + (2ab)i + b + ai = 1,$$

ovvero, eguagliando parti reali e parti immaginarie dell'equazione, quando è verificato il sistema

$$\begin{cases} a^2 - b^2 + b = 1 \\ 2ab + a = 0 \end{cases}$$

La seconda equazione è verificata per $a = 0$ o per $b = -\frac{1}{2}$.

Se $a = 0$ la prima equazione diventa $b^2 - b + 1 = 0$, che *non* ha soluzioni reali (N.B. $b \in \mathbb{R}$).

Se $b = -\frac{1}{2}$ la prima equazione diventa $a^2 = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} = \frac{7}{4}$, che ha soluzioni $a = \pm \frac{\sqrt{7}}{2}$.

Le soluzioni del problema proposto sono allora:

$$z_1 = \frac{\sqrt{7}}{2} - \frac{1}{2}i \quad \text{e} \quad z_2 = -\frac{\sqrt{7}}{2} - \frac{1}{2}i.$$