

1. Sia E la curva ellittica su $\mathbf{R}$ di equazione $Y^2 = X^3 - 2X$. Sia P il punto $(2, 2)$ e sia $Q = (-1, 1)$. Calcolare le coordinate dei punti $-P$, $P + Q$, $P - Q = P + (-Q)$ e $2P = P + P$.
2. Sia p un primo e sia E una curva ellittica su $\mathbf{Z}_p$. Per un punto $P \in E(\mathbf{Z}_p)$ e un intero $n \geq 0$ definiamo nP come $P + P + \cdots + P$ (n volte). Per $n < 0$ definiamo nP come il punto inverso di $(-n)P$. Il più piccolo intero $n > 0$ tale che $nP = \infty$ si chiama *l'ordine* del punto P .
 - (a) Determinare l'ordine del punto $(2, 1)$ sulla curva ellittica E su $\mathbf{Z}_5$ di equazione $Y^2 = X^3 + X + 1$.
 - (b) Determinare l'ordine di tutti i punti sulla curva ellittica E su $\mathbf{Z}_3$ di equazione $Y^2 = X^3 - X - 1$. Stessa domanda per la curva di equazione $Y^2 = X^3 - X + 1$.
3. Sia E la curva $Y^2 = X^3 + X + 1$ su $\mathbf{Z}_5$.
 - (a) Dimostrare che si tratta di una curva ellittica.
 - (b) Esibire tutti i punti di E con coordinate in $\mathbf{Z}_5$ (ce ne sono nove).
 - (c) Esibire un punto di ordine 9 e concludere che il gruppo $E(\mathbf{Z}_5)$ è ciclico.
4. Sia $a \in \mathbf{Z}_5$ e sia E la curva su $\mathbf{Z}_5$ di equazione $Y^2 = X^3 + aX + 1$.
 - (a) Far vedere che per $a \neq 3$, si tratta di una curva ellittica.
 - (b) Per $a \in \mathbf{Z}_5^*$ diverso da 3, determinare il numero di punti di $E(\mathbf{Z}_5)$.
 - (b) Per $a \in \mathbf{Z}_5^*$ diverso da 3, determinare la struttura del gruppo $E(\mathbf{Z}_5)$ (cioè scrivere $E(\mathbf{Z}_5)$ come prodotto di gruppi ciclici).
5. Sia p un numero primo e sia E una curva ellittica su $\mathbf{Z}_p$. Dimostrare che per ogni $n \in \mathbf{Z}$ l'insieme $\{P \in E(\mathbf{Z}_p) : nP = \infty\}$ è un sottogruppo di $E(\mathbf{Z}_p)$.
6. Sia $p > 2$ un numero primo e sia E la curva ellittica su $\mathbf{Z}_p$ di equazione $Y^2 = X^3 - X$.
 - (a) Calcolare la somma del punto $(0, 0)$ con se stesso. Far vedere che l'ordine del punto $(0, 0)$ è uguale a 2.
 - (b) Determinare i punti di ordine 2 di E .
 - (c) Sia $E[2] = \{P \in E(\mathbf{Z}_p) : P + P = \infty\}$. Dimostrare che $E[2]$ è un gruppo di ordine 4 isomorfo a $\mathbf{Z}_2 \times \mathbf{Z}_2$.
7. Sia $p > 3$ un numero primo e sia E una curva ellittica su $\mathbf{Z}_p$ di equazione $Y^2 = X^3 + AX + B$.
 - (a) Dimostrare che un punto $P = (x, y) \in E(\mathbf{Z}_p)$ ha ordine 2 se e solo se

$$x^3 + Ax + B = 0$$
 - (b) Dimostrare che ci sono al più 3 punti di ordine 2.
 - (c) Dimostrare che il gruppo $\{P \in E(\mathbf{Z}_p) : 2P = \infty\}$ è isomorfo a $\mathbf{Z}_2$, $\mathbf{Z}_2 \times \mathbf{Z}_2$ o al gruppo banale.
8. Sia $p > 3$ un numero primo e sia E una curva ellittica su $\mathbf{Z}_p$ di equazione $Y^2 = X^3 + AX + B$.
 - (a) Dimostrare che un punto $P = (x, y) \in E(\mathbf{Z}_p)$ ha ordine 3 se e solo se

$$3x^4 + 6Ax^2 + 12Bx - A^2 = 0.$$

PER IL SEGUENTE ESERCIZIO È UTILE UN COMPUTER.

9. (Esperimento fattorizzare usando il metodo “ $p - 1$ ”) Sia $M = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5 \cdot 7$
 - (a) Sia $n = 95431706263$. Scegliere $\bar{a} \in \mathbf{Z}_n^*$ a caso. Calcolare $\bar{b} = \bar{a}^M \pmod{n}$. Calcolare il divisore $d = \gcd(b - 1, n)$ di n ed il cofattore n/d .
 - (b) Sia $n = 57841557763361$. Scegliere $\bar{a} \in \mathbf{Z}_n^*$ a caso. Calcolare $\bar{b} = \bar{a}^M \pmod{n}$. Calcolare il divisore $d = \gcd(b - 1, n)$ di n ed il cofattore n/d .
 - (c) Come mai l'algoritmo trova queste due fattorizzazioni?