

ALGEBRA e LOGICA
CdL in Ingegneria Informatica — a.a. 2012/2013
prof. Fabio GAVARINI

Sessione Estiva Anticipata - I sessione / I appello
Esame scritto del 4 Febbraio 2013 — COMPITO ♣

.....

*N.B.: compilare il compito in modo sintetico ma **esauriente**, spiegando
chiaramente quanto si fa, e scrivendo in *corsivo* con grafia leggibile.*

..... ♣

[1] Determinare — se esistono — tutte le successioni $\underline{a} := \{a_n\}_{n \in \mathbb{N}} \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ tali che

$$a_0 = -2 \quad , \quad a_1 = 1 \quad , \quad a_n = 2a_{n-1} + 4a_{n-2} \quad \forall n \geq 2 \quad .$$

[2] Determinare se esista una soluzione per ciascuna delle due equazioni diofantee seguenti:

$$(a) : 45x + 20y = -24 \quad , \quad (b) : 45x + 20y = 15$$

In caso positivo, calcolare esplicitamente una tale soluzione. In caso negativo, spiegare perché una tale soluzione non esista.

[3] Si consideri il polinomio booleano — nelle tre variabili x, y e z — dato da

$$p(x, y, z) := \left((y \vee x' \vee z') \wedge (z \vee y \vee x') \right)' \vee \left((z \vee x') \wedge (y \vee z' \vee y) \right)'$$

(a) Determinare la *forma normale disgiuntiva* di p .

(b) Utilizzando il *Metodo del Consenso*, determinare la *somma di tutti gli implicanti primi* di p .

(c) Determinare — eventualmente sfruttando i risultati ottenuti in (a) e/o in (b) — una *forma minimale* di p .

[4] Determinare tutte le soluzioni del sistema di equazioni congruenziali

$$\circledast : \begin{cases} -26x \equiv 22 \pmod{3} \\ 49x \equiv -9 \pmod{5} \end{cases}$$
