ESERCIZI DI
ARITMETICA MODULARE

N.B.: il simbolo $\diamond$ contrassegna gli esercizi (relativamente) più complessi.

— * —

1 — Calcolare, se esiste, l'inverso $\bar{z}^{-1}$ di ciascuno dei seguenti elementi nel rispettivo anello unitario: $\bar{z} := \overline{91} \in \mathbb{Z}_{100}$, $\bar{z} := \overline{37} \in \mathbb{Z}_{42}$, $\bar{z} := \overline{28} \in \mathbb{Z}_{42}$, $\bar{z} := \overline{21} \in \mathbb{Z}_{55}$.

2 — Sia $n \in \mathbb{Z}$ un intero che diviso per 7 ha resto 5 e sia $m \in \mathbb{Z}$ un intero che diviso per 7 ha resto 3. Dividendo $n + m$ per 7, che resto si trova? Dividendo $n \cdot m$ per 7, che resto si trova? (giustificare adeguatamente le risposte)

Suggerimento: Le ipotesi dicono che $[n]_7 = [5]_7 \in \mathbb{Z}_7$ e $[m]_7 = [3]_7 \in \mathbb{Z}_7$; quindi...

3 — (a) Determinare se esistano le classi inverse $\bar{9}^{-1}$, $\bar{5}^{-1}$, $\bar{7}^{-1}$, $(\bar{9} \cdot \bar{7})^{-1}$ e $(\bar{5} \cdot \bar{7})^{-1}$ nell'anello $\mathbb{Z}_{20}$ degli interi modulo 20. In caso negativo, si spieghi perché tale classe inversa non esista; in caso affermativo, si calcoli esplicitamente la suddetta classe inversa.

(b) Calcolare tutte le soluzioni dell'equazione modulare $\overline{647}x = \overline{-516}$ in $\mathbb{Z}_{20}$.

(c) Calcolare tutte le soluzioni dell'equazione congruenziale $436x \equiv 92 \pmod{20}$ in $\mathbb{Z}$.

4 — Per ogni $n \in \mathbb{N}_+$ e per ogni $a \in \mathbb{Z}$, sia $f_{\bar{a}} : \mathbb{Z}_n \longrightarrow \mathbb{Z}_n$ la funzione definita da $\bar{z} \mapsto f_{\bar{a}}(\bar{z}) := \bar{a} \cdot \bar{z}$ per ogni $\bar{z} \in \mathbb{Z}_n$.

(a) Dimostrare che $f_{\bar{a}}$ è iniettiva se e soltanto se è suriettiva.

(b) Verificare che la funzione $f_{\bar{a}}$ è $\mathbb{Z}_n$ -lineare, cioè

$$f_{\bar{a}}(\bar{c}_1 \bar{x}_1 + \bar{c}_2 \bar{x}_2) = \bar{c}_1 f_{\bar{a}}(\bar{x}_1) + \bar{c}_2 f_{\bar{a}}(\bar{x}_2) \quad \forall \bar{c}_1, \bar{c}_2 \in \mathbb{Z}_n, \quad \forall \bar{x}_1, \bar{x}_2 \in \mathbb{Z}_n.$$

(c) Posto $\text{Ker}(f_{\bar{a}}) := \{ \bar{z} \in \mathbb{Z}_n \mid f_{\bar{a}}(\bar{z}) = \bar{0} \}$, dimostrare che

$$f_{\bar{a}} \text{ è iniettiva} \iff \text{Ker}(f_{\bar{a}}) = \{ \bar{0} \}$$

(d) Posto $U(\mathbb{Z}_n) := \{ \bar{z} \in \mathbb{Z}_n \mid \bar{z} \text{ è invertibile} \} = \{ \bar{z} \in \mathbb{Z}_n \mid \exists \bar{\zeta} : \bar{z}\bar{\zeta} = \bar{1} \}$, dimostrare che $f_{\bar{a}}$ è suriettiva $\iff \bar{a} \in U(\mathbb{Z}_n)$.

(e) Dimostrare che $f_{\bar{a}}$ è iniettiva $\iff \bar{a} \in U(\mathbb{Z}_n)$.

Suggerimento: Per la parte (e), l'implicazione " $\Leftarrow$ " segue direttamente dalle definizioni; l'implicazione inversa " $\Rightarrow$ " invece richiede l'uso dei risultati in (a) e in (d) qui sopra.

5 — Verificare che in $\mathbb{Z}_{21}$ si ha $\bar{5}^{159} = -\bar{1}$, $\bar{3}^{41} = \bar{12}$, $\bar{15}^{159} = -\bar{6}$.

6 — Calcolare le ultime due cifre decimali di $7^{6503219}$.

7 — Calcolare il resto nella divisione per 20 dei tre numeri

$$a := 457^{35062867} \quad , \quad b := 2384^{16} \quad , \quad c := 645^{5607290843}$$

8 — Senza calcolare esplicitamente il prodotto, verificare che

$$2468 \cdot 13579 \equiv -3 \pmod{25}$$

Suggerimento: Il problema è equivalente a verificare che sia $\overline{2468} \cdot \overline{13579} = -\bar{3}$ in $\mathbb{Z}_{25}$.

9 — Senza calcolare esplicitamente il prodotto che li definisce, determinare il resto della divisione per 10 e per 5 dei seguenti tre numeri:

$$a := 12345678 \cdot 90123 \quad , \quad b := 9085679 \cdot 120001 \quad , \quad c := 4876515329871674 \cdot 765976$$

Suggerimento: Si passi alle classi di congruenza modulo 10 (nel primo caso) e modulo 5 (nel secondo caso), e poi si facciano i calcoli in $\mathbb{Z}_{10}$ e in $\mathbb{Z}_5$ rispettivamente.

10 — Sia $N := (c_k c_{k-1} \cdots c_1 c_0)_b$ un numero naturale rappresentato in base $b := \text{DIECI}$.

(a) Dimostrare che $N \equiv c_k + c_{k-1} + \cdots + c_1 + c_0 \pmod{9}$.

(b) Dimostrare che $N \equiv c_0 - c_1 + \cdots + (-1)^{k-1} c_{k-1} + (-1)^k c_k \pmod{11}$.

(c) Usare il risultato in (a) per dimostrare che $54321 \cdot 98765 \neq 5363013565$.

(d) Usare il risultato in (b) per determinare se 121314151617 sia divisibile per 11.

11 — Calcolare il resto nella divisione per 11 dei due numeri

$$A := 1111111^{44444444} \quad , \quad B := 999999999^{333333333}$$

Suggerimento: Si può sfruttare l'esercizio **10** qui sopra.

12 — Determinare il resto delle divisioni per 3, 9, 4 e 11 del numero $N := 3548917$.

Suggerimento: Nel caso della divisione per 9 e per 11 si può sfruttare l'esercizio **8**.

13 — Dato $b \in \mathbb{N}_+ \setminus \{1\}$, sia $N := (c_k c_{k-1} \cdots c_1 c_0)_b \in \mathbb{N}$ un numero naturale rappresentato in base b .

(a) Dimostrare che $N \equiv c_k + c_{k-1} + \cdots + c_1 + c_0 \pmod{(b-1)}$.

(b) Dimostrare che $N \equiv c_0 - c_1 + \cdots + (-1)^{k-1} c_{k-1} + (-1)^k c_k \pmod{(b+1)}$.

(c) Per ogni $d \in \mathbb{Z}$ che sia divisore di b , si ha $d \mid N \iff d \mid c_0$ (in parole, “ N è divisibile per d se e soltanto se l’ultima cifra di N è divisibile per d ”).

(d) Per ogni $d \in \mathbb{Z}$ tale che $d \mid b$ ma $d^2 \nmid b$, si ha (per ogni $s \in \mathbb{N}_+$)

$$d^s \mid N \iff d^s \mid (c_{s-1} \cdots c_1 c_0)_b$$

(in parole, “ N è divisibile per d se e soltanto se [il numero formato dalle] ultime s cifre di N è divisibile per d ”).

Suggerimento: Le parti (a) e (b) sono la diretta generalizzazione delle analoghe parti dell’esercizio **10** qui sopra.

14 — Calcolare tutte le soluzioni dell’equazione congruenziale

$$580397^{6250395} x \equiv -4251093768 \pmod{20}$$

Suggerimento: L’equazione congruenziale assegnata corrisponde all’equazione modulare $\overline{580397}^{6250395} \bar{x} = \overline{-4251093768}$ in $\mathbb{Z}_{20}$, quindi si risolva quest’ultima e dalle sua soluzione si deduca la soluzione del problema iniziale.

15 — Determinare tutti i numeri $x \in \mathbb{Z}$ che soddisfino *simultaneamente* le tre condizioni seguenti:

$$317x \equiv 287 \pmod{14} \quad (\text{in } \mathbb{Z}), \quad -\overline{71} \bar{x} = \overline{414} \quad (\text{in } \mathbb{Z}_{11}), \quad 101 \leq x \leq 200$$

16 — Determinare, se esiste, un numero intero $z \in \mathbb{Z}$ tale che

$$31 \leq z \leq 50 \quad \text{e} \quad z \equiv N \pmod{20}$$

dove N è il numero intero $N := 837^{65084}$. Se invece un tale z non esiste, si spieghi perché.

17 — (a) Calcolare — se esiste — la classe $\bar{z}^{-1} \in \mathbb{Z}_{100}$ inversa della classe $\bar{z} \in \mathbb{Z}_{100}$ per i casi $z := -435$ e $z := 63$.

(b) Risolvere l’equazione $\overline{-563} \cdot \bar{x} = \overline{-908}$ in $\mathbb{Z}_{100}$.

(c) Risolvere l’equazione congruenziale $437 \cdot x \equiv 192 \pmod{100}$ in $\mathbb{Z}$.

18 — Determinare tutti i valori di $x \in \mathbb{Z}$ che siano soluzioni *simultaneamente* delle due equazioni modulari seguenti:

$$\textcircled{*} : \begin{cases} [39]_7 \cdot [x]_7 = -[15]_7 & \text{in } \mathbb{Z}_7 \\ [-13]_{11} \cdot [x]_{11} = [56]_{11} & \text{in } \mathbb{Z}_{11} \end{cases}$$

19 — (a) Calcolare i due gruppi degli elementi invertibili

$$U(\mathbb{Z}_{23}) := \{ \bar{z} \in \mathbb{Z}_{23} \mid \exists \bar{z}^{-1} \in \mathbb{Z}_{23} : \bar{z} \cdot \bar{z}^{-1} = \bar{1} \}$$

$$U(\mathbb{Z}_{10}) := \{ \bar{z} \in \mathbb{Z}_{10} \mid \exists \bar{z}^{-1} \in \mathbb{Z}_{10} : \bar{z} \cdot \bar{z}^{-1} = \bar{1} \}$$

(b) Risolvere, se possibile, ciascuna delle tre equazioni seguenti:

$$\bar{6} \cdot \bar{x} = \bar{28} \text{ in } \mathbb{Z}_{10}, \quad \bar{6} \cdot \bar{x} = \bar{13} \text{ in } \mathbb{Z}_{10}, \quad \bar{45} \cdot \bar{x} = \bar{6} \text{ in } \mathbb{Z}_{23}.$$

(c) Determinare — se esiste — la classe $\bar{6}^{-1} \in \mathbb{Z}_{23}$ inversa della classe $\bar{6} \in \mathbb{Z}_{23}$, la classe $\bar{6}^{-1} \in \mathbb{Z}_{10}$ inversa di $\bar{6} \in \mathbb{Z}_{10}$ e la classe $\bar{7}^{-1} \in \mathbb{Z}_{10}$ inversa di $\bar{7} \in \mathbb{Z}_{10}$.

20 $\diamond$ — Risolvere le seguenti equazioni modulari di secondo grado a coefficienti in $\mathbb{Z}_{11}$:

$$x^2 - \bar{8}x + \bar{4} = \bar{0}, \quad x^2 - \bar{3}x + \bar{5} = \bar{0}, \quad x^2 + \bar{3}x + \bar{6} = \bar{0}$$

Suggerimento: Si provi ad applicare la consueta (!) formula risolutiva delle equazioni di secondo grado, discutendo se abbia effettivamente senso utilizzarla...