

- (1) Siano $\mathbf{p} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ e $\mathbf{q} = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}$.
- (i) Trovare le formule per la traslazione $T_{\mathbf{p}}$.
 - (ii) Calcolare $T_{\mathbf{p}} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$, $T_{\mathbf{p}} \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix}$.
 - (iii) Calcolare $T_{3\mathbf{p}} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$, $T_{3\mathbf{p}} \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix}$.
 - (iv) Calcolare $(T_{\mathbf{q}} \circ T_{3\mathbf{p}}) \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$, $(T_{3\mathbf{p}} \circ T_{-\mathbf{q}}) \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix}$.

Sol. (i) Si ha

$$T_{\mathbf{p}} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 + 1 \\ x_2 + 2 \end{pmatrix}$$

(ii)

$$T_{\mathbf{p}} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad T_{\mathbf{p}} \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 6 \end{pmatrix}$$

(iii)

$$T_{3\mathbf{p}} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 6 \end{pmatrix}, \quad T_{3\mathbf{p}} \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 \\ 10 \end{pmatrix}$$

(iv)

$$(T_{\mathbf{q}} \circ T_{3\mathbf{p}}) \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} = T_{\mathbf{q}+3\mathbf{p}} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 4 \end{pmatrix}$$

$$(T_{3\mathbf{p}} \circ T_{-\mathbf{q}}) \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix} = T_{3\mathbf{p}-\mathbf{q}} \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 12 \end{pmatrix}$$

(2) Sia Q il trapezio in \mathbf{R}^2 di vertici

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 6 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

- (i) Disegnare l'immagine di Q dopo la traslazione $T_{\begin{pmatrix} 0 \\ -1 \end{pmatrix}}$.
- (ii) Disegnare l'immagine di Q dopo la riflessione S_0 data dalla matrice $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$.
- (iii) Disegnare l'immagine di Q dopo la rotazione R_π data dalla matrice $\begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$.

Sol. (i) Si tratta del trapezio di vertici

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 6 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

(ii) Si tratta del trapezio di vertici

$$\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 6 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 3 \\ -3 \end{pmatrix}.$$

(iii) Si tratta del trapezio di vertici

$$\begin{pmatrix} -1 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} -6 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} -2 \\ -3 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} -3 \\ -3 \end{pmatrix}.$$

(3) Sia Q il quadrato in \mathbf{R}^2 di vertici

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

- (i) Disegnare l'immagine di Q dopo la rotazione $R_{\pi/2}$.
- (ii) Disegnare l'immagine di Q dopo la rotazione R_{π} .
- (iii) Disegnare l'immagine di Q dopo la rotazione $R_{3\pi/2}$.
- (iv) Disegnare l'immagine di Q dopo la dilatazione $D_{2,3}$.
- (v) Disegnare l'immagine di Q dopo l'omotetia D_2 .
- (vi) Disegnare l'immagine di Q dopo lo shear N_{-1} .

Sol. (i) La rotazione $R_{\pi/2}$ è data dalla matrice $\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, dunque l'immagine di Q è il quadrato di vertici

$$\begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -3 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -3 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

(ii) La rotazione R_{π} è data dalla matrice $\begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$, dunque l'immagine di Q è il quadrato di vertici

$$\begin{pmatrix} -1 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ -3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -3 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -3 \\ -3 \end{pmatrix}.$$

(iii) La rotazione $R_{3\pi/2}$ è data dalla matrice $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$, dunque l'immagine di Q è il quadrato di vertici

$$\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ -3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ -3 \end{pmatrix}.$$

(iv) La dilatazione $D_{2,1}$ è data dalla matrice $\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, dunque l'immagine di Q è il quadrato di vertici

$$\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 6 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 6 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

(v) L'omotetia D_3 è data dalla matrice $\begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$, dunque l'immagine di Q è il quadrato di vertici

$$\begin{pmatrix} 3 \\ 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ 9 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 9 \\ 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 9 \\ 9 \end{pmatrix}.$$

(vi) Lo shear N_3 è dato dalla matrice $\begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, dunque l'immagine di Q è il quadrato di vertici

$$\begin{pmatrix} 4 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 10 \\ 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 6 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 12 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

(4) Sia Q il quadrato in \mathbf{R}^2 di vertici

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

- (i) Disegnare l'immagine di Q dopo la rotazione $R_{\pi/2}$.
- (ii) Per quali angoli φ la rotazione R_{φ} manda il quadrato in se stesso?

- (iii) Disegnare l'immagine di Q dopo la rotazione $R_{\pi/4}$.
- (iv) Disegnare l'immagine di Q dopo la dilatazione $D_{2,1}$.
- (v) Disegnare l'immagine di Q dopo l'omotetia D_3 .
- (vi) Disegnare l'immagine di Q dopo lo shear N_3 .

Sol. (i) La rotazione $R_{\pi/2}$ è data dalla matrice $\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, dunque l'immagine di Q è il quadrato di vertici

$$\begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

Chiaramente coincide con Q . (ii) Per tutti gli angoli della forma $\varphi = k\pi/2$, con $k \in \mathbf{Z}$. (iii) La rotazione $R_{\pi/4}$ è data dalla matrice $\begin{pmatrix} \sqrt{2}/2 & -\sqrt{2}/2 \\ \sqrt{2}/2 & \sqrt{2}/2 \end{pmatrix}$, dunque l'immagine di Q è il quadrato di vertici

$$\begin{pmatrix} -\sqrt{2}/2 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ \sqrt{2}/2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ -\sqrt{2}/2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \sqrt{2}/2 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

(iv) La dilatazione $D_{2,3}$ è data dalla matrice $\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$, dunque l'immagine di Q è il quadrato di vertici

$$\begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -2 \\ -3 \end{pmatrix}.$$

(v) L'omotetia D_2 è data dalla matrice $\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$, dunque l'immagine di Q è il quadrato di vertici

$$\begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -2 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -2 \\ -2 \end{pmatrix}.$$

(vi) Lo shear N_{-1} è dato dalla matrice $\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, dunque l'immagine di Q è il quadrato di vertici

$$\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

(5) Siano $Q_1, Q_2, Q_3, Q_4, Q_5, Q_6$ i punti di \mathbf{R}^2 di coordinate

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2}\sqrt{3} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2}\sqrt{3} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2}\sqrt{3} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2}\sqrt{3} \end{pmatrix}.$$

(i) Per quali angoli φ la rotazione R_φ manda l'esagono di vertici $Q_1, Q_2, Q_3, Q_4, Q_5, Q_6$ in se stesso?

Sol. (i) Per tutti gli angoli della forma $\varphi = k\pi/3$, con $k \in \mathbf{Z}$.

(6) Sia $\mathbf{p} = \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \end{pmatrix}$.

- (i) Trovare le formule per la rotazione R di centro \mathbf{p} ed angolo $\pi/2$.
- (ii) Trovare le formule per la rotazione R' di centro \mathbf{p} ed angolo $-\pi/4$.
- (iii) Sia l la retta di equazione parametrica

$$\mathbf{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad t \in \mathbf{R}.$$

Calcolare un'equazione parametrica della retta che si ottiene applicando R ad l .

(iv) Sia m la retta di equazione cartesiana

$$x_1 + x_2 = 7.$$

Calcolare un'equazione parametrica della retta che si ottiene applicando R' ad l .

Sol. (i) $R\mathbf{x} = R_{\pi/2}(\mathbf{x} - \mathbf{p}) + \mathbf{p}$. Poiché la rotazione $R_{\pi/2}$ è rappresentata dalla matrice $\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, troviamo

$$R \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x_1 + 1 \\ x_2 + 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -x_2 - 2 \\ x_1 \end{pmatrix}$$

(ii) $R'\mathbf{x} = R_{\pi/4}(\mathbf{x} - \mathbf{p}) + \mathbf{p}$. Poiché la rotazione $R_{\pi/4}$ è rappresentata dalla matrice $\begin{pmatrix} \sqrt{2}/2 & -\sqrt{2}/2 \\ \sqrt{2}/2 & \sqrt{2}/2 \end{pmatrix}$, troviamo

$$R \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sqrt{2}/2 & -\sqrt{2}/2 \\ \sqrt{2}/2 & \sqrt{2}/2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x_1 + 1 \\ x_2 + 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2}x_1 - \frac{\sqrt{2}}{2}x_2 - 1 \\ \frac{\sqrt{2}}{2}x_1 + \frac{\sqrt{2}}{2}x_2 + \sqrt{2} - 1 \end{pmatrix}$$

(iii) I punti della retta l sono quelli della forma $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 + 2t \\ -1 + t \end{pmatrix}$. Applicando la formula trovata nel punto (i), troviamo che l'immagine della retta l tramite la trasformazione R è una retta di equazione parametrica

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 - t \\ 1 + 2t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

(iv) I punti della retta m sono quelli della forma $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 - t \\ t \end{pmatrix}$. Applicando la formula trovata nel punto (ii), troviamo che l'immagine della retta m tramite la trasformazione R' è una retta di equazione parametrica

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{7\sqrt{2}-2}{2} - \sqrt{2}t \\ \frac{9\sqrt{2}-2}{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{7\sqrt{2}-2}{2} \\ \frac{9\sqrt{2}-2}{2} \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} -\sqrt{2} \\ 0 \end{pmatrix}$$

ovvero, mediante un cambio di parametro,

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{7\sqrt{2}-2}{2} \\ \frac{9\sqrt{2}-2}{2} \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

(7) Sia l la retta di equazione $x_1 + x_2 = 0$.

(i) Calcolare le formule della riflessione rispetto ad l .

(ii) Calcolare le immagini dei punti

$$\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

(iii) Calcolare l'immagine della retta di equazione parametrica

$$\begin{pmatrix} 5 \\ 0 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad t \in \mathbf{R}.$$

Sol. (i) La retta l è generata dal vettore $\mathbf{v} = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} \\ -1/\sqrt{2} \end{pmatrix}$ di norma 1. Questo vettore si completa ad una base ortonormale di \mathbf{R}^2 come

$$\mathbf{e}_1 = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} \\ -1/\sqrt{2} \end{pmatrix}, \quad \mathbf{e}_2 = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} \end{pmatrix}$$

Rispetto alla base $\{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2\}$, la matrice che rappresenta la riflessione rispetto a l è

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

dunque la matrice che rappresenta la riflessione rispetto a l nella base canonica di \mathbf{R}^2 è

$$\begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} \\ -1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} \\ -1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$$

ovvero

$$S \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -x_2 \\ -x_1 \end{pmatrix}.$$

Alternativamente. Sia θ l'angolo formato dalla retta con l'asse delle x_1 positive. Allora, dalle coordinate di \mathbf{v} , troviamo $\cos \theta = 1/\sqrt{2}$ e $\sin \theta = -1/\sqrt{2}$. Usando le formule di duplicazione di $\cos \theta$ e $\sin \theta$ ricaviamo la matrice della riflessione rispetto ad l

$$\begin{pmatrix} \cos 2\theta & \sin 2\theta \\ \sin 2\theta & -\cos 2\theta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Alternativamente. Sia $P = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$ un generico punto in \mathbf{R}^2 . La retta per P e perpendicolare ad l ha equazione parametrica

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad t \in \mathbf{R}.$$

Essa interseca l nel punto $Q = \begin{pmatrix} (a-b)/2 \\ -(a-b)/2 \end{pmatrix}$, corrispondente al valore del parametro $t_0 = -(a+b)/2$. Il punto $S_l(P)$, simmetrico di P rispetto ad l , corrisponde al valore del parametro $2t_0$ ed è dato da

$$S_l(P) = \begin{pmatrix} -b \\ -a \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}.$$

(ii) Si tratta dei punti

$$\begin{pmatrix} -1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

(iii) I punti della retta in questione hanno la forma $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ -t \end{pmatrix}$. Applicando la formula trovata al punto (i), troviamo che l'equazione parametrica della retta riflessa è

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} t \\ -5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ -5 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

(8) Sia Q il quadrato dell'Eserc.3. Calcolare l'immagine di Q dopo la riflessione rispetto

- (i) all'asse delle ascisse.
- (ii) all'asse delle ordinate.
- (iii) alla retta di equazione $x_1 = x_2$.

Sol. (i) E' il quadrato di vertici

$$\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 \\ -3 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 3 \\ -3 \end{pmatrix}.$$

(ii) E' il quadrato di vertici

$$\begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -3 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -3 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

(iii) Coincide con Q .

(9) Sia Q il quadrato dell'Eserc.4. Calcolare l'immagine di Q dopo la riflessione rispetto

(i) all'asse delle ascisse.

(ii) all'asse delle ordinate.

(iii) alla retta di equazione $x_1 = x_2$.

(iv) Trovare tutte le riflessioni S_φ che mandano Q in se stesso.

Sol. (i) Coincide con Q . (ii) Coincide con Q . (iii) Coincide con Q . (iv) Oltre a quelle indicate nei punti (i), (ii) e (iii), c'è anche la riflessione rispetto alla retta $x_1 = -x_2$.

(10) Siano $Q_1, Q_2, Q_3, Q_4, Q_5, Q_6$ i punti dell'Eserc.5. Calcolare l'immagine dell'esagono di vertici Q_i dopo la riflessione rispetto

(i) all'asse delle ascisse.

(ii) all'asse delle ordinate.

(iii) la retta di equazione $\sqrt{3}x_1 + x_2 = 0$.

(iv) Trovare tutte le riflessioni S_φ che mandano l'esagono in se stesso.

Sol. (i) Coincide con l'esagono dato. (ii) Coincide con l'esagono dato. (iii) Coincide con l'esagono dato. (iv) Oltre a quelle indicate nei punti (i), (ii) e (iii), ci sono anche le riflessioni rispetto alle rette $\sqrt{3}x_1 - x_2 = 0$, $x_1 + \sqrt{3}x_2 = 0$ e $x_1 - \sqrt{3}x_2 = 0$.

(11) Sia S la riflessione rispetto alla retta l di equazione cartesiana $3x_1 + 4x_2 = 0$.

(i) Calcolare la tangente dell'angolo φ formato da l con l'asse delle ascisse.

(ii) Calcolare le formule per S .

Sol. (i) I vettori della retta l hanno la forma $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = t \begin{pmatrix} 4/5 \\ -3/5 \end{pmatrix}$, $t \in \mathbf{R}$. Sia θ l'angolo φ formato da l con l'asse delle ascisse. Avendo scelto il vettore della direzione $\mathbf{v} = \begin{pmatrix} 4/5 \\ -3/5 \end{pmatrix}$ di l di norma 1, troviamo $\cos \varphi = 4/5$ e $\sin \varphi = -3/5$ e di conseguenza

$$\tan \varphi = -3/4.$$

(ii) Usando le formule di duplicazione di $\cos \theta$ e $\sin \theta$ ricaviamo la matrice della riflessione S

$$\begin{pmatrix} \cos 2\theta & \sin 2\theta \\ \sin 2\theta & -\cos 2\theta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7/25 & -24/25 \\ -24/25 & -7/25 \end{pmatrix}.$$

Alternativamente: Una base ortonormale di \mathbf{R}^2 con il primo vettore parallelo alla direzione di l è

$$\mathbf{e}_1 = \begin{pmatrix} 4/5 \\ -3/5 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{e}_2 = \begin{pmatrix} 3/5 \\ 4/5 \end{pmatrix}$$

La riflessione rispetto a l , nella base $\{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2\}$ è rappresentata dalla matrice $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$, dunque, nella base canonica si \mathbf{R}^2 la riflessione rispetto a l è rappresentata dalla matrice

$$\begin{pmatrix} 4/5 & 3/5 \\ -3/5 & 4/5 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 4/5 & 3/5 \\ -3/5 & 4/5 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 7/25 & -24/25 \\ -24/25 & -7/25 \end{pmatrix}$$

da cui

$$S \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{7}{25} x_1 - \frac{24}{25} x_2 \\ -\frac{24}{25} x_1 - \frac{7}{25} x_2 \end{pmatrix}$$

(12) Sia S la riflessione rispetto alla retta l di equazione cartesiana $3x_1 + 4x_2 = 0$.

- (i) Calcolare le formule della riflessione S_0 rispetto all'asse delle ascisse.
- (ii) Vedere se

$$S = R_\varphi \circ S_0 \circ R_{-\varphi},$$

dove φ e' l'angolo formato dalla retta l con l'asse delle ascisse. (Suggerimento: calcolare le formule per R_φ e per S).

Sol. (i) Si ha

$$S \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 \\ -x_2 \end{pmatrix}$$

(ii) La matrice che rappresenta R_φ è

$$\begin{pmatrix} 4/5 & 3/5 \\ -3/5 & 4/5 \end{pmatrix}$$

(vedi esercizio 11), mentre la matrice che rappresenta $R_{-\varphi}$ è

$$\begin{pmatrix} 4/5 & -3/5 \\ 3/5 & 4/5 \end{pmatrix}$$

Pertanto la matrice che rappresenta $R_\varphi \circ S_0 \circ R_{-\varphi}$ è

$$\begin{pmatrix} 4/5 & 3/5 \\ -3/5 & 4/5 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 4/5 & -3/5 \\ 3/5 & 4/5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7/25 & -24/25 \\ -24/25 & -7/25 \end{pmatrix}$$

cioè coincide con la matrice che rappresenta S , ovvero

$$S = R_\varphi \circ S_0 \circ R_{-\varphi}.$$

(13) Sia l la retta di equazione parametrica

$$\mathbf{x} = t \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad t \in \mathbf{R}$$

e sia m la retta di equazione $x_1 = 0$.

- (i) Trovare le formule della riflessione S rispetto ad l .
- (ii) Calcolare le formule della riflessione S' rispetto ad m .
- (iii) Calcolare le formule della trasformazione composta

$$S \circ S'$$

(iv) Calcolare le formule per la trasformazione composta

$$S' \circ S.$$

(v) Geometricamente, che cosa fanno $S \circ S'$ e $S' \circ S$?

Sol. (i) Il vettore $\mathbf{e}_1 = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} \end{pmatrix}$ è un vettore parallelo alla retta l , di norma 1. Una base ortonormale di \mathbf{R}^2 il cui primo vettore sia \mathbf{e}_1 è

$$\mathbf{e}_1 = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} \end{pmatrix}, \quad \mathbf{e}_2 = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} \\ -1/\sqrt{2} \end{pmatrix}.$$

In questa base la riflessione rispetto alla retta l è rappresentata dalla matrice $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$. Dunque la matrice che rappresenta la riflessione rispetto ad l nella base canonica di \mathbf{R}^2 è

$$\begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{2} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{2} \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

e quindi

$$S \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_2 \\ x_1 \end{pmatrix}.$$

(ii) La retta m è l'asse delle ordinate. Dunque

$$S' \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}.$$

(iii)

$$(S \circ S')\mathbf{x} = S(S'\mathbf{x}) = S \begin{pmatrix} -x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_2 \\ -x_1 \end{pmatrix}$$

(iv)

$$(S' \circ S)\mathbf{x} = S'(S\mathbf{x}) = S' \begin{pmatrix} x_2 \\ x_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -x_2 \\ x_1 \end{pmatrix}$$

(v) La matrice che rappresenta $S \circ S'$ rispetto alla base canonica di \mathbf{R}^2 è

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos(-\frac{\pi}{2}) & -\text{sen}(-\frac{\pi}{2}) \\ \text{sen}(-\frac{\pi}{2}) & \cos(-\frac{\pi}{2}) \end{pmatrix}$$

Vale a dire: $S \circ S'$ è la rotazione di angolo $-\pi/2$ attorno all'origine. La matrice che rappresenta $S' \circ S$ rispetto alla base canonica di \mathbf{R}^2 è

$$\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \frac{\pi}{2} & -\text{sen} \frac{\pi}{2} \\ \text{sen} \frac{\pi}{2} & \cos \frac{\pi}{2} \end{pmatrix}$$

Vale a dire: $S' \circ S$ è la rotazione di angolo $\pi/2$ attorno all'origine.

(14) Sia l la retta di equazione $x_1 = 1$ e sia m la retta di equazione $x_2 = 2$.

- (i) Calcolare le formule della riflessione S rispetto ad l .
- (ii) Calcolare le formule della riflessione S' rispetto ad m .
- (iii) Calcolare le formule della trasformazione composta

$$S \circ S'.$$

(iv) Calcolare le formule della trasformazione composta

$$S' \circ S.$$

(v) Geometricamente, che cosa fanno $S \circ S'$ e $S' \circ S$?

Sol. (i) Un punto di l è $\mathbf{p} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$. La riflessione rispetto a l è $S\mathbf{x} = A(\mathbf{x} - \mathbf{p}) + \mathbf{p}$, dove A rappresenta la riflessione rispetto alla retta vettoriale avente la stessa direzione di l . La matrice che rappresenta la trasformazione lineare A è $\begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, da cui

$$S \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 - 1 \\ x_2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -x_1 + 2 \\ x_2 \end{pmatrix}$$

(ii) Un punto di m è $\mathbf{q} = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \end{pmatrix}$. La riflessione rispetto a m è $S'\mathbf{x} = A'(\mathbf{x} - \mathbf{q}) + \mathbf{q}$, dove A' rappresenta la riflessione rispetto alla retta vettoriale avente la stessa direzione di m . La matrice che rappresenta la trasformazione lineare A' è $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$, da cui

$$S' \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 - 2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 \\ -x_2 + 4 \end{pmatrix}$$

(iii) Si ha

$$(S \circ S')\mathbf{x} = S(S'\mathbf{x}) = S \begin{pmatrix} x_1 \\ -x_2 + 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -x_1 + 2 \\ -x_2 + 4 \end{pmatrix}$$

(iv) Si ha

$$(S' \circ S)\mathbf{x} = S'(S\mathbf{x}) = S' \begin{pmatrix} -x_1 + 2 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -x_1 + 2 \\ -x_2 + 4 \end{pmatrix} = (S \circ S')\mathbf{x}$$

(v) Sono la rotazione di angolo π attorno al punto $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ di intersezione tra l e m (verificarlo!).

(15) Calcolare autovalori e autospazi della matrice

$$\begin{pmatrix} \cos 2\varphi & \sin 2\varphi \\ \sin 2\varphi & -\cos 2\varphi \end{pmatrix}, \quad \varphi \in \mathbf{R}.$$

Interpretare geometricamente il risultato.

Sol. La matrice data rappresenta la riflessione rispetto all'asse delle ascisse seguita dalla rotazione di angolo 2φ attorno all'origine. Si ha

$$\det \begin{pmatrix} \cos 2\varphi - \lambda & \sin 2\varphi \\ \sin 2\varphi & -\cos 2\varphi - \lambda \end{pmatrix} = \lambda^2 - 1$$

pertanto gli autovalori della matrice data sono

$$\lambda_{1/2} = \pm 1$$

Per determinare l'1-autospazio risolviamo

$$\begin{pmatrix} \cos 2\varphi - 1 & \sin 2\varphi \\ \sin 2\varphi & -\cos 2\varphi - 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

La dimensione di un autospazio è compresa tra 1 e la molteplicità algebrica dell'autovalore corrispondente. Dunque lo spazio delle soluzioni di questo sistema avrà dimensione esattamente uguale ad uno. Ricordiamo che

$$\cos 2\varphi = 2 \cos^2 \varphi - 1 = 1 - 2 \sin^2 \varphi; \quad \sin 2\varphi = 2 \sin \varphi \cos \varphi$$

e dunque il sistema si può riscrivere come

$$\begin{pmatrix} -2 \sin \varphi & 0 \\ 0 & 2 \cos \varphi \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \sin \varphi & -\cos \varphi \\ \sin \varphi & -\cos \varphi \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Le soluzioni di questo sistema contengono le soluzioni del sistema

$$\begin{pmatrix} \sin \varphi & -\cos \varphi \\ \sin \varphi & -\cos \varphi \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

la cui soluzione è $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = t \begin{pmatrix} \cos \varphi \\ \sin \varphi \end{pmatrix}$. Per le ragioni dimensionali espresse sopra, l'1 autospazio è dunque esattamente la retta l_φ che forma un angolo φ con l'asse delle ascisse, ovvero la trasformazione lineare data fissa la retta l_φ . Essendo una isometria lineare deve pertanto essere la riflessione rispetto a l_φ : l'altro autospazio è la retta ortogonale a l_φ , formata dai vettori della forma $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = t \begin{pmatrix} -\sin \varphi \\ \cos \varphi \end{pmatrix}$.

(16) Calcolare gli autovalori della matrice

$$\begin{pmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi \\ \sin \varphi & \cos \varphi \end{pmatrix}, \quad \varphi \in \mathbf{R}, \varphi \neq k\pi, k \in \mathbf{Z}.$$

Interpretare geometricamente il risultato. Cosa succede per $\varphi = k\pi$, $k \in \mathbf{Z}$?

Sol. La matrice data rappresenta la rotazione di angolo φ attorno all'origine. Si ha

$$\det \begin{pmatrix} \cos \varphi - \lambda & -\operatorname{sen} \varphi \\ \operatorname{sen} \varphi & \cos \varphi - \lambda \end{pmatrix} = \lambda^2 - 2\lambda \cos \varphi + 1$$

pertanto gli autovalori della matrice data sono

$$\lambda_{1/2} = \cos \varphi \pm \sqrt{-1} \cdot \operatorname{sen} \varphi$$

(ovvero, per chi conosce la formula di Eulero, $\lambda_{1,2} = e^{\pm\sqrt{-1}\varphi}$). Ne segue che, per $\varphi \neq k\pi$, con $k \in \mathbf{Z}$, la matrice data non ha autovalori reali e dunque non ci sono rette fissate dalla trasformazione lineare associata. Per $\varphi = k\pi$, $k \in \mathbf{Z}$, gli assi coordinati sono rette fissate dalla rotazione data.

(17) Sia $M = \begin{pmatrix} \sqrt{2}/2 & -\sqrt{2}/2 \\ \sqrt{2}/2 & \sqrt{2}/2 \end{pmatrix}$. Interpretare geometricamente l'isometria $F: \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}^2$, $\mathbf{x} \mapsto M\mathbf{x}$.

Sol. Si ha $M = \begin{pmatrix} \cos \pi/4 & -\operatorname{sen} \pi/4 \\ \operatorname{sen} \pi/4 & \cos \pi/4 \end{pmatrix}$, dunque M è la rotazione di centro $\mathbf{0}$ e angolo $\pi/4$.

(18) Sia $M = \begin{pmatrix} \sqrt{2}/2 & \sqrt{2}/2 \\ \sqrt{2}/2 & -\sqrt{2}/2 \end{pmatrix}$. Interpretare geometricamente l'isometria $F: \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}^2$, $\mathbf{x} \mapsto M\mathbf{x}$.

Sol. Si ha $M = \begin{pmatrix} \cos \pi/4 & -\operatorname{sen} \pi/4 \\ \operatorname{sen} \pi/4 & \cos \pi/4 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$, dunque M è la riflessione rispetto all'asse delle ascisse seguita dalla rotazione di centro $\mathbf{0}$ e angolo $\pi/4$.

(19) Siano $\mathbf{v} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ e $\mathbf{w} = \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \end{pmatrix}$.

(i) Calcolare l'orientazione di \mathbf{v} e \mathbf{w} .

(ii) Calcolare l'orientazione di \mathbf{w} e \mathbf{v} .

(iii) Sia S_0 la riflessione rispetto all'asse delle ascisse. Calcolare $\operatorname{Or}(S_0(\mathbf{v}), S_0(\mathbf{w}))$.

(iv) Sia S_φ la riflessione rispetto alla retta passante per $\mathbf{0}$ e formante un angolo φ con l'asse delle ascisse. Calcolare $\operatorname{Or}(S_\varphi(\mathbf{v}), S_\varphi(\mathbf{w}))$.

Sol. (i) Si ha

$$\det \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} = 1 > 0$$

dunque \mathbf{v} e \mathbf{w} sono orientati positivamente. (ii) $\operatorname{Or}(\mathbf{w}, \mathbf{v}) = -\operatorname{Or}(\mathbf{v}, \mathbf{w})$ dunque \mathbf{w} e \mathbf{v} sono orientati negativamente. (iii) $\operatorname{Or}(S_0(\mathbf{v}), S_0(\mathbf{w})) = \det(S_0)\operatorname{Or}(\mathbf{v}, \mathbf{w}) = -\operatorname{Or}(\mathbf{v}, \mathbf{w})$ (iv) $\operatorname{Or}(S_\varphi(\mathbf{v}), S_\varphi(\mathbf{w})) = \det(S_\varphi)\operatorname{Or}(\mathbf{v}, \mathbf{w}) = -\operatorname{Or}(\mathbf{v}, \mathbf{w})$

(20) Siano $\mathbf{v} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ e $\mathbf{w} = \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \end{pmatrix}$.

(i) Sia $R_{\pi/2}$ la rotazione di centro $\mathbf{0}$ e angolo $\pi/2$. Calcolare $\operatorname{Or}(R_{\pi/2}(\mathbf{v}), R_{\pi/2}(\mathbf{w}))$.

(ii) Sia R_φ la rotazione di centro $\mathbf{0}$ e angolo φ . Calcolare $\operatorname{Or}(R_\varphi(\mathbf{v}), R_\varphi(\mathbf{w}))$.

Sol. (i) I vettori sono quelli dell'esercizio precedente, sappiamo pertanto che sono orientati positivamente. $\operatorname{Or}(R_{\pi/2}(\mathbf{v}), R_{\pi/2}(\mathbf{w})) = \det(R_{\pi/2})\operatorname{Or}(\mathbf{v}, \mathbf{w}) = \operatorname{Or}(\mathbf{v}, \mathbf{w})$. (ii) $\operatorname{Or}(R_\varphi(\mathbf{v}), R_\varphi(\mathbf{w})) = \det(R_\varphi)\operatorname{Or}(\mathbf{v}, \mathbf{w}) = \operatorname{Or}(\mathbf{v}, \mathbf{w})$.

(21) Siano $\mathbf{v} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ e $\mathbf{w} = \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \end{pmatrix}$. Siano $S^{(1)}, S^{(2)}, \dots, S^{(t)}$ le riflessioni rispetto a delle rette passanti per $\mathbf{0}$. Sia $S = S^{(1)} \circ S^{(2)} \circ \dots \circ S^{(t)}$. Calcolare l'orientazione $\operatorname{Or}(S(\mathbf{v}), S(\mathbf{w}))$.

Sol. $\operatorname{Or}(S(\mathbf{v}), S(\mathbf{w})) = \det(S)\operatorname{Or}(\mathbf{v}, \mathbf{w}) = \det(S^{(1)}) \cdots \det(S^{(t)})\operatorname{Or}(\mathbf{v}, \mathbf{w}) = (-1)^t \operatorname{Or}(\mathbf{v}, \mathbf{w})$.

(22) Sia $D_{2,5}$ la dilatazione data dalla matrice $\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 5 \end{pmatrix}$.

(i) Trovare una dilatazione $D_{\lambda,\mu}$ tale che $D_{\lambda,\mu} \circ D_{2,5}$ sia l'applicazione identica.

(ii) Trovare una dilatazione $D_{\lambda,\mu}$ tale che $D_{2,5} \circ D_{\lambda,\mu}$ sia l'applicazione identica.

Sol. Osserviamo innanzitutto che le dilatazioni commutano fra loro: date due dilatazioni $D_{\lambda,\mu}$ e $D_{\sigma,\tau}$ si ha

$$D_{\lambda,\mu} \circ D_{\sigma,\tau} = D_{\sigma,\tau} \circ D_{\lambda,\mu} = D_{\lambda\sigma,\mu\tau}.$$

(i)(ii) La dilatazione $D_{1/2,1/5}$, che è l'inversa di $D_{2,5}$, soddisfa $D_{1/2,1/5} \circ D_{2,5} = D_{2,5} \circ D_{1/2,1/5} = Id$.

(23) Per quali dilatazioni $D_{\lambda,\mu}$ abbiamo che $D_{\lambda,\mu} \circ D_{\lambda,\mu}$ è l'applicazione identica?

Sol. Si ha che $D_{\lambda,\mu} \circ D_{\lambda,\mu} = Id$ se e solo se $\lambda^2 = \mu^2 = 1$, ossia se e solo se $\lambda = \pm 1$, $\mu = \pm 1$. Pertanto le dilatazioni con questa proprietà sono 4.

(24) Dimostrare che una dilatazione $D_{\lambda,\mu}$ conserva le direzioni delle rette se e solo se $\lambda = \mu$.

Sol. Se $\lambda = \mu$, la dilatazione $D_{\lambda,\lambda}$ conserva gli angoli fra i vettori e quindi le direzioni delle rette:

$$\cos \theta = \frac{\mathbf{v} \cdot \mathbf{w}}{\|\mathbf{v}\| \|\mathbf{w}\|} = \frac{\lambda \mathbf{v} \cdot \lambda \mathbf{w}}{\|\lambda \mathbf{v}\| \|\lambda \mathbf{w}\|}, \quad \forall \mathbf{v}, \mathbf{w} \in \mathbf{R}^2. \quad (*)$$

D'altra parte, se $\lambda \neq \mu$, la dilatazione $D_{\lambda,\mu}$ non conserva gli angoli fra i vettori e quindi ne anche le direzioni delle rette: basta provare per esempio con $\lambda = 4$, $\mu = 1$, $\mathbf{v} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ e $\mathbf{w} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$.

(25) Calcolare l'inversa della trasformazione (shear) N_5 .

Sol. L'inversa N_5^{-1} è data dalla matrice $\begin{pmatrix} 1 & -5 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 5 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}^{-1}$. Pertanto

$$N_5^{-1} \left(\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \right) = \begin{pmatrix} x_1 - 5x_2 \\ x_2 \end{pmatrix}.$$