Esercizio A1. [punti 6] Data la seguente funzione

$$f(x, y) = x^2y + 3x^2 + y^2 + y$$

- (a) determinarne i punti stazionari e la loro natura,
 (b) determinare massimo e minimo di f in $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : -4 \leq y \leq 4 - x^2\}$.

Esercizio A2. [punti 6] Calcolare il seguente integrale

$$\iint_D \sqrt{4 - x^2 - y^2} \, dx dy ,$$

dove $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq 4, x^2 + (y - 1)^2 \geq 1\}$.

Esercizio A3. [punti 6] Calcolare $\int_S \vec{F} \cdot \vec{n}_e \, d\sigma$, dove S è la superficie laterale del cono

$$T = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : y^2 \geq x^2 + z^2, y \in [1, 2]\},$$

orientata nel verso della normale esterna $\vec{n}_e$ a T , e

$$\vec{F}(x, y, z) = \left(-2x + \frac{x^3}{3} + z^2 \right) \vec{i} - (x^2y + z^2) \vec{j} + 2z \vec{k}.$$

Esercizio A4. [punti 6] Data la serie

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n^2(n^{3x} + x^n)}, \quad x \in \mathbb{R} \setminus (-1, 0),$$

- (a) determinare l'insieme di convergenza puntuale,
 (b) determinare l'insieme di convergenza assoluta.

Esercizio A5. [punti 6] Risolvere il problema di Cauchy

$$\begin{cases} y' = Ay \\ y(0) = y_0 \end{cases} \quad A = \begin{pmatrix} 3 & -2 & -1 \\ 2 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}, \quad y_0 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

Esercizio A1. [punti 6] Data la seguente funzione

$$f(x, y) = x^2y + 3x^2 + y^2 + y$$

- (a) determinarne i punti stazionari e la loro natura,
 (b) determinare massimo e minimo di f in $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : -4 \leq y \leq 4 - x^2\}$.

Svolgimento: (a) I punti stazionari sono soluzioni di

$$\begin{cases} f_x(x, y) = 2x(y + 3) = 0 \\ f_y(x, y) = x^2 + 2y + 1 = 0 \end{cases}$$

che fornisce i punti $P_1 = (0, -\frac{1}{2})$, $P_{\pm} = (\pm\sqrt{5}, -3)$. Poiché $f_{xx}(x, y) = 2y + 6$, $f_{xy}(x, y) = 2x$, $f_{yy}(x, y) = 2$, si ha

$$H_f(0, -\frac{1}{2}) = \begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad H_f(\pm\sqrt{5}, -3) = \begin{pmatrix} 0 & \pm 2\sqrt{5} \\ \pm 2\sqrt{5} & 2 \end{pmatrix},$$

per cui P_1 è un punto di minimo, mentre $P_{\pm}$ sono di sella.

(b) Poiché D è chiuso e limitato e f è continua su D , il teorema di Weierstrass ci assicura che f ha massimo e minimo su D . Come conseguenza del teorema di Fermat, cerchiamo i punti di massimo e minimo in tre insiemi:

(b1) tra i punti stazionari interni a D . In questo caso, $P_1 \in D^\circ$.

(b2) tra i punti interni a D in cui non esiste almeno una delle derivate parziali prime di f . In questo caso non ci sono.

(b3) tra i punti di frontiera di D . Determiniamo, allora, i punti di massimo e minimo di $f|_{\mathcal{F}D}$. Osserviamo che $\mathcal{F}D$ è costituita di un arco di parabola $C = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y = 4 - x^2, x \in (-\sqrt{8}, \sqrt{8})\}$, e un segmento di retta $S = \{(x, -3) \in \mathbb{R}^2 : x \in [-\sqrt{8}, \sqrt{8}]\}$. Usiamo il metodo dei moltiplicatori di Lagrange per studiare $f|_C$, e ci accontentiamo di trovare i punti stazionari della Lagrangiana [tra questi ci saranno anche i punti di massimo e minimo di $f|_C$].

Introduciamo la funzione di vincolo $g(x, y) = x^2 + y - 4$, $x \in (-\sqrt{8}, \sqrt{8})$, e determiniamo dapprima i punti non regolari per il vincolo, cioè le soluzioni del sistema

$$\begin{cases} g_x(x, y) = 2x = 0 \\ g_y(x, y) = 1 = 0 \\ g(x, y) = x^2 + y - 4 = 0, x \in (-\sqrt{8}, \sqrt{8}), \end{cases}$$

che non ha soluzione.

Introduciamo ora la Lagrangiana $\mathcal{L}(x, y, \lambda) = f(x, y) + \lambda g(x, y)$, e cerchiamo i punti stazionari di $\mathcal{L}$, cioè le soluzioni del sistema

$$\begin{cases} \mathcal{L}_x(x, y, \lambda) = 2x(y + 3) + 2x\lambda = 0 \\ \mathcal{L}_y(x, y, \lambda) = x^2 + 2y + 1 + \lambda = 0 \\ \mathcal{L}_\lambda(x, y, \lambda) = x^2 + y - 4 = 0, x \in (-\sqrt{8}, \sqrt{8}), \end{cases}$$

$$\iff \begin{cases} x = 0 \\ y - 4 = 0, x \in (-\sqrt{8}, \sqrt{8}), \end{cases} \quad \vee \begin{cases} \lambda = -y - 3 \\ x^2 + y - 2 = 0 \\ x^2 + y - 4 = 0, x \in (-\sqrt{8}, \sqrt{8}), \end{cases}$$

cioè il punto $P_2 = (0, 4)$.

Oppure, più rapidamente, consideriamo $k(x) := f(x, 4 - x^2) = x^2(4 - x^2) + 3x^2 + (4 - x^2)^2 + 4 - x^2 = 20 - 2x^2$, $x \in [-\sqrt{8}, \sqrt{8}]$, ed essendo $k'(x) = -4x$, segue dal teorema di Fermat che bisogna considerare i punti P_2 , e $Q_{\pm} = (\pm\sqrt{8}, -4)$.

Per quanto riguarda $f|_S$, si ha $h(x) := f(x, -4) = 12 - x^2$, $x \in [-\sqrt{8}, \sqrt{8}]$, ed essendo $h'(x) = -2x$, segue dal teorema di Fermat, che bisogna considerare i punti $P_3 = (0, -4)$, e $Q_{\pm}$.

Il dominio D e i punti trovati sono riportati in figura 1.

Figura 1: Il dominio D e i punti trovati

(b4) Calcolando il valore di f su tutti i punti trovati, otteniamo $f(Q_{\pm}) = 4$, $f(P_1) = -\frac{1}{4}$, $f(P_2) = 20$, $f(P_3) = 12$. Quindi $\min_D f = -\frac{1}{4}$ e $\max_D f = 20$.

Esercizio A2. [punti 6] Calcolare il seguente integrale

$$\iint_D \sqrt{4 - x^2 - y^2} \, dx dy ,$$

dove $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq 4, x^2 + (y - 1)^2 \geq 1\}$.

Svolgimento: Si ha

$$\begin{aligned} \iint_D \sqrt{4 - x^2 - y^2} \, dx dy &\stackrel{(a)}{=} \iint_{D_{\varrho, \vartheta}} \sqrt{4 - \varrho^2} \, \varrho \, d\varrho d\vartheta \\ &= \int_0^\pi \left(\int_{2 \sin \vartheta}^2 \varrho \sqrt{4 - \varrho^2} \, d\varrho \right) d\vartheta + \int_\pi^{2\pi} \left(\int_0^2 \varrho \sqrt{4 - \varrho^2} \, d\varrho \right) d\vartheta \\ &\stackrel{(b)}{=} \int_0^\pi \left[-\frac{1}{3}(4 - \varrho^2)^{3/2} \right]_{2 \sin \vartheta}^2 d\vartheta + \int_\pi^{2\pi} \left[-\frac{1}{3}(4 - \varrho^2)^{3/2} \right]_0^2 d\vartheta \\ &= \frac{8}{3} \int_0^\pi |\cos \vartheta|^3 \, d\vartheta + \frac{8}{3} \int_\pi^{2\pi} d\vartheta \stackrel{(c)}{=} \frac{16}{3} \int_0^{\pi/2} \cos^3 \vartheta \, d\vartheta + \frac{8}{3} \pi \\ &\stackrel{(d)}{=} \frac{16}{3} \int_0^1 (1 - z^2) \, dz + \frac{8}{3} \pi = \frac{16}{3} \left[z - \frac{z^3}{3} \right]_0^1 + \frac{8}{3} \pi = \frac{32}{9} + \frac{8}{3} \pi, \end{aligned}$$

dove in (a) si è usato il cambio di variabile $x = \varrho \cos \vartheta$, $y = \varrho \sin \vartheta$, per cui

$$D_{\varrho\vartheta} = \{(\varrho, \vartheta) \in \mathbb{R}^2 : 2 \sin \vartheta \leq \varrho \leq 2, \vartheta \in [0, \pi]\} \cup \{(\varrho, \vartheta) \in \mathbb{R}^2 : 0 \leq \varrho \leq 2, \vartheta \in [\pi, 2\pi]\},$$

in (b) il risultato $\int \varrho \sqrt{4 - \varrho^2} \, d\varrho = -\frac{1}{2} \int \sqrt{t} \, dt = -\frac{1}{3} t^{3/2} = -\frac{1}{3} (4 - \varrho^2)^{3/2}$, in (c) le simmetrie della funzione integranda, e in (d) la sostituzione $\sin \vartheta = z \implies \cos \vartheta \, d\vartheta = dz$.

Il dominio D è riportato in figura 2.

Figura 2: Il dominio d'integrazione D

Esercizio A3. [punti 6] Calcolare $\int_S \vec{F} \cdot \vec{n}_e d\sigma$, dove S è la superficie laterale del cono

$$T = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : y^2 \geq x^2 + z^2, y \in [1, 2]\},$$

orientata nel verso della normale esterna $\vec{n}_e$ a T , e

$$\vec{F}(x, y, z) = \left(-2x + \frac{x^3}{3} + z^2\right) \vec{i} - (x^2y + z^2) \vec{j} + 2z \vec{k}.$$

Svolgimento: Siano $S_1 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + z^2 \leq 1, y = 1\}$, $S_2 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + z^2 \leq 4, y = 2\}$, per cui $\partial T = S \cup S_1 \cup S_2$. Una parametrizzazione di S_1 è $\Phi^1(x, z) = (x, 1, z)$,

$(x, z) \in A_1 := \{(x, z) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + z^2 \leq 1\}$, il cui vettore normale è $\Phi_x^1 \wedge \Phi_z^1 = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = -\vec{j}$,

che è esterno a T , mentre una parametrizzazione di S_2 è $\Phi^2(x, z) = (x, 2, z)$, $(x, z) \in A_2 := \{(x, z) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + z^2 \leq 4\}$, il cui vettore normale è $\Phi_x^2 \wedge \Phi_z^2 = -\vec{j}$, che è interno a T .

Le superfici S, S_1, S_2 , e le loro normali esterne, sono riportate in figura 3.

Figura 3: Le superfici S , a sinistra, e S_1, S_2 , a destra

Dal teorema della divergenza si ha

$$\iiint_T \operatorname{div} \vec{F} dx dy dz = \int_S \vec{F} \cdot \vec{n}_e d\sigma + \int_{S_1} \vec{F} \cdot \vec{n}_e d\sigma + \int_{S_2} \vec{F} \cdot \vec{n}_e d\sigma,$$

dove $\vec{n}_e$ è il versore normale esterno rispetto a T . Poiché $\operatorname{div} F = -2 + x^2 - x^2 + 2 = 0$, si ha

$$\begin{aligned} \int_S \vec{F} \cdot \vec{n}_e d\sigma &= - \int_{S_1} \vec{F} \cdot \vec{n}_e d\sigma - \int_{S_2} \vec{F} \cdot \vec{n}_e d\sigma \\ &= - \iint_{A_1} \vec{F} \circ \Phi^1 \cdot \Phi_x^1 \wedge \Phi_z^1 dx dz + \iint_{A_2} \vec{F} \circ \Phi^2 \cdot \Phi_x^2 \wedge \Phi_z^2 dx dz \\ &= - \iint_{A_1} (x^2 + z^2) dx dz + \iint_{A_2} (2x^2 + z^2) dx dz \\ &\stackrel{(a)}{=} - \int_0^{2\pi} \int_0^1 \varrho^2 \varrho d\varrho d\vartheta + \int_0^{2\pi} \int_0^2 \varrho^2 (1 + \cos^2 \vartheta) \varrho d\varrho d\vartheta \\ &\stackrel{(b)}{=} -2\pi \left[\frac{\varrho^4}{4} \right]_0^1 + \left[\frac{\varrho^4}{4} \right]_0^2 \cdot \left[\frac{3}{2} + \frac{1}{2} \cos(2\vartheta) \right]_0^{2\pi} = -\frac{\pi}{2} + 12\pi = \frac{23}{2}\pi, \end{aligned}$$

dove in (a) si è usato il cambio di coordinate $x = \varrho \cos \vartheta$, $z = \varrho \sin \vartheta$, e in (b) l'identità trigonometrica $\cos^2 \vartheta = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cos(2\vartheta)$.

Esercizio A4. [punti 6] Data la serie

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n^2(n^{3x} + x^n)}, \quad x \in \mathbb{R} \setminus (-1, 0),$$

- (a) determinare l'insieme di convergenza puntuale,
 (b) determinare l'insieme di convergenza assoluta.

Svolgimento: Sia $a_n := \frac{1}{n^2(n^{3x} + x^n)}$.

Per $x \in [0, 1)$ si ha $a_n = \frac{1}{n^{3x+2}}(1 + o(1))$ e la serie converge (assolutamente).

Per $x = -1$ si ha $a_n = \frac{1}{n^2(\frac{1}{n^3} + (-1)^n)}$, e poiché $|\frac{1}{n^3} + (-1)^n| \geq \frac{1}{2}, \forall n \geq 2$, si ha $|a_n| \leq \frac{2}{n^2}$, e la serie converge assolutamente.

Per $x = 1$ si ha $a_n = \frac{1}{n^2(n^3+1)}$ e la serie converge (assolutamente).

Per $|x| > 1$ si ha $a_n = \frac{1}{n^2 x^n}(1 + o(1)) = o(\frac{1}{n^2})$, e la serie converge assolutamente.

Quindi la serie converge assolutamente in $(-\infty, -1] \cup [0, +\infty)$.

Esercizio A5. [punti 6] Risolvere il problema di Cauchy

$$\begin{cases} y' = Ay \\ y(0) = y_0 \end{cases} \quad A = \begin{pmatrix} 3 & -2 & -1 \\ 2 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}, \quad y_0 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

Svolgimento: Cerchiamo gli autovalori di A :

$$\begin{aligned} \det(A - \lambda I) &= \begin{vmatrix} 3 - \lambda & -2 & -1 \\ 2 & -1 - \lambda & -1 \\ 1 & -1 & -\lambda \end{vmatrix} = \lambda(1 + \lambda)(3 - \lambda) + 4 - (1 + \lambda) - (3 - \lambda) - 4\lambda \\ &= -\lambda(\lambda^2 - 2\lambda + 1) = -\lambda(\lambda - 1)^2 = 0, \end{aligned}$$

da cui si ottengono le soluzioni $\lambda_1 = 0$ e $\lambda_2 = 1$ (doppia).

Autovettore per $\lambda_1 = 0$:

$$0 = A\vec{v} = \begin{pmatrix} 3 & -2 & -1 \\ 2 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \iff 2x_1 - x_2 - x_3 = 0 \wedge x_1 - x_2 = 0 \iff x_1 = x_2 = x_3,$$

e possiamo scegliere $\vec{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$.

Autovettori per $\lambda_2 = 1$:

$$\begin{aligned} 0 &= (A - I)\vec{v} = \begin{pmatrix} 2 & -2 & -1 \\ 2 & -2 & -1 \\ 1 & -1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \iff 2x_1 - 2x_2 - x_3 = 0 \wedge x_1 - x_2 - x_3 = 0 \\ &\iff x_1 = x_2 \wedge x_3 = 0, \end{aligned}$$

cioè i detti autovettori sono tutti proporzionali a $\vec{v} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$.

Poiché c'è un solo autovettore indipendente, occorre cercare un autovettore generalizzato:

$$0 = (A - I)^2 \vec{v} = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \iff x_1 - x_2 - x_3 = 0,$$

e quindi scegliamo $\vec{v}_2 = \vec{e}_1 + \vec{v}_3 \in \ker(A - I)^2 \setminus \ker(A - I)$, e $\vec{v}_3 = (A - I)\vec{v}_2 = \vec{e}_1 + \vec{e}_2$.
Da $y_0 = c_1\vec{v}_1 + c_2\vec{v}_2 + c_3\vec{v}_3$ si ricava

$$\begin{cases} 0 = y_1(0) = c_1 + c_2 + c_3 \\ 1 = y_2(0) = c_1 + c_3 \\ 2 = y_3(0) = c_1 + c_2 \end{cases} \iff \begin{cases} c_1 = 3 \\ c_2 = -1 \\ c_3 = -2. \end{cases}$$

La soluzione del problema di Cauchy è quindi:

$$\begin{aligned} y(t) &= e^{At}y_0 = c_1e^{At}\vec{v}_1 + c_2e^{At}\vec{v}_2 + c_3e^{At}\vec{v}_3 = c_1\vec{v}_1 + c_2e^t(I + (A - I)t)\vec{v}_2 + c_3e^t\vec{v}_3 \\ &= c_1\vec{v}_1 + c_2e^t\vec{v}_2 + (c_3 + c_2t)e^t\vec{v}_3 = 3 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} - e^t \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} - (2 + t)e^t \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \end{aligned}$$

cioè

$$\begin{aligned} y_1(t) &= 3 - (3 + t)e^t \\ y_2(t) &= 3 - (2 + t)e^t \\ y_3(t) &= 3 - e^t. \end{aligned}$$

CORSO DI STUDI IN FISICA – CALCOLO 2 (3/2/2023)

Esercizio A1. [punti 6] Studiare continuità, esistenza delle derivate parziali e differenziabilità di

$$f(x, y) = \begin{cases} (x^2 + y^2) \sin\left(\frac{1}{x^2 + y^2}\right) + x - 3y^2 & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

Determinare l'eventuale equazione del piano tangente al grafico nel punto $(0, 0)$.

Esercizio A2. [punti 6] Calcolare il seguente integrale

$$\iiint_D (x + z^2) \, dx dy dz$$

dove $D = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : 1 \leq x^2 + y^2 + z^2 \leq 4, x \leq 0\}$.

Esercizio A3. [punti 6] Sia data la forma differenziale

$$\omega(x, y) = \left(\frac{x}{2 + x^2 + y^2} + 4x^3\right) dx + \left(\frac{y}{2 + x^2 + y^2} - 6y^5\right) dy.$$

(a) Verificare che ω è esatta in $D = \mathbb{R}^2$, e determinarne una primitiva (o potenziale).

(b) Calcolare $\int_\gamma \omega$, dove $\gamma(t) = (2t + t \cos(\pi t), t + t \sin(\pi t))$, $t \in [0, 1]$.

Esercizio A4. [punti 6] Data la serie

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x^2 - 2)^n}{n},$$

(a) determinare gli insiemi di convergenza puntuale (o semplice) e assoluta,

(b) determinare il generico insieme di convergenza uniforme della serie.

Esercizio A5. [punti 6] Dato il sistema di equazioni differenziali

$$\begin{cases} x' = y \\ y' = y^{5/3} \end{cases} \quad (E)$$

determinare gli eventuali punti di equilibrio, e tracciare il diagramma di fase. Determinare la traiettoria di fase e la soluzione di (E) che soddisfano $x(0) = 1$, $y(0) = 1$.

Esercizio A1. [punti 6] Studiare continuità, esistenza delle derivate parziali e differenziabilità di

$$f(x, y) = \begin{cases} (x^2 + y^2) \sin\left(\frac{1}{x^2 + y^2}\right) + x - 3y^2 & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

Determinare l'eventuale equazione del piano tangente al grafico nel punto $(0, 0)$.

Svolgimento: La continuità di f in $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$ segue da teoremi generali sulle funzioni continue. In $(0, 0)$ si ha

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} (x^2 + y^2) \sin \frac{1}{x^2 + y^2} + x - 3y^2 = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} (x^2 + y^2) \sin \frac{1}{x^2 + y^2} = \lim_{\varrho \rightarrow 0} \varrho^2 \sin \frac{1}{\varrho^2} = 0,$$

perché $\varrho^2 \rightarrow 0$ e $|\sin \frac{1}{\varrho^2}| \leq 1$. Quindi f è continua in $\mathbb{R}^2$.

Calcoliamo le derivate parziali in $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$. Si ha

$$\begin{aligned} f_x(x, y) &= 2x \sin \frac{1}{x^2 + y^2} + (x^2 + y^2) \frac{-2x}{(x^2 + y^2)^2} \cos \frac{1}{x^2 + y^2} + 1 \\ &= 2x \sin \frac{1}{x^2 + y^2} - \frac{2x}{x^2 + y^2} \cos \frac{1}{x^2 + y^2} + 1 \\ f_y(x, y) &= 2y \sin \frac{1}{x^2 + y^2} - \frac{2y}{x^2 + y^2} \cos \frac{1}{x^2 + y^2} - 6y. \end{aligned}$$

Quindi le derivate parziali sono anche continue in $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$. Calcoliamole in $(0, 0)$. Si ha

$$\begin{aligned} f_x(0, 0) &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(t, 0) - f(0, 0)}{t} = \lim_{t \rightarrow 0} t \sin \frac{1}{t^2} + 1 = 1 \\ f_y(0, 0) &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(0, t) - f(0, 0)}{t} = \lim_{t \rightarrow 0} t \sin \frac{1}{t^2} - 3t = 0. \end{aligned}$$

Infine, f è differenziabile in $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$, perché le derivate parziali sono continue in $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$. In $(0, 0)$ si ha

$$\begin{aligned} \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{f(x, y) - f_x(0, 0)x}{(x^2 + y^2)^{1/2}} &= \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{(x^2 + y^2) \sin \frac{1}{x^2 + y^2} + x - 3y^2 - x}{(x^2 + y^2)^{1/2}} \\ &= \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} (x^2 + y^2)^{1/2} \sin \frac{1}{x^2 + y^2} - \frac{3y^2}{(x^2 + y^2)^{1/2}} \\ &= \lim_{\varrho \rightarrow 0} \left(\varrho \sin \frac{1}{\varrho^2} - 3\varrho \sin^2 \vartheta \right) = 0, \end{aligned}$$

perché $\varrho \rightarrow 0$ e $|\sin \frac{1}{\varrho^2}| \leq 1$, $\sin^2 \vartheta \leq 1$. Quindi f è differenziabile in $\mathbb{R}^2$.

Il piano tangente al grafico di f in $(0, 0)$ ha equazione $z = f(0, 0) + f_x(0, 0)x + f_y(0, 0)y = x$.

Esercizio A2. [punti 6] Calcolare il seguente integrale

$$\iiint_D (x + z^2) \, dx dy dz$$

dove $D = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : 1 \leq x^2 + y^2 + z^2 \leq 4, x \leq 0\}$.

Svolgimento: Si ha

$$\begin{aligned} \iiint_D (x + z^2) \, dx dy dz &\stackrel{(a)}{=} \iiint_{D_{\varrho\vartheta\varphi}} (\varrho \cos \vartheta \sin \varphi + \varrho^2 \cos^2 \varphi) \varrho^2 \sin \varphi \, d\varrho d\vartheta d\varphi \\ &= \int_0^\pi \sin^2 \varphi \, d\varphi \int_{\pi/2}^{3\pi/2} \cos \vartheta \, d\vartheta \int_1^2 \varrho^3 \, d\varrho + \int_0^\pi \cos^2 \varphi \sin \varphi \, d\varphi \int_{\pi/2}^{3\pi/2} d\vartheta \int_1^2 \varrho^4 \, d\varrho \\ &\stackrel{(b)}{=} -\frac{\pi}{2} \cdot 2 \cdot \frac{15}{4} + \frac{2}{3} \cdot \pi \cdot \frac{31}{5} = \frac{23}{60}\pi, \end{aligned}$$

dove in (a) si è usato il cambio di variabile $x = \varrho \cos \vartheta \sin \varphi$, $y = \varrho \sin \vartheta \sin \varphi$, $z = \varrho \cos \varphi$, per cui $D_{\varrho\vartheta\varphi} = \{(\varrho, \vartheta, \varphi) \in \mathbb{R}^3 : 1 \leq \varrho \leq 2, \vartheta \in [\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}], \varphi \in [0, \pi]\}$, e in (b) i risultati $\int_0^\pi \sin^2 \varphi \, d\varphi = \int_0^\pi \frac{1}{2}(1 - \cos 2\varphi) \, d\varphi = \frac{\pi}{2}$, $\int_{\pi/2}^{3\pi/2} \cos \vartheta \, d\vartheta = [\sin \vartheta]_{\pi/2}^{3\pi/2} = -2$, $\int_1^2 \varrho^3 \, d\varrho = [\frac{1}{4}\varrho^4]_1^2 = \frac{15}{4}$, $\int_0^\pi \cos^2 \varphi \sin \varphi \, d\varphi = -\int_0^\pi \cos^2 \varphi \, d(\cos \varphi) = \int_{-1}^1 t^2 \, dt = 2[\frac{1}{3}t^3]_0^1 = \frac{2}{3}$, e $\int_1^2 \varrho^4 \, d\varrho = [\frac{1}{5}\varrho^5]_1^2 = \frac{31}{5}$.

Esercizio A3. [punti 6] Sia data la forma differenziale

$$\omega(x, y) = \left(\frac{x}{2 + x^2 + y^2} + 4x^3 \right) dx + \left(\frac{y}{2 + x^2 + y^2} - 6y^5 \right) dy.$$

(a) Verificare che ω è esatta in $D = \mathbb{R}^2$, e determinarne una primitiva (o potenziale).

(b) Calcolare $\int_\gamma \omega$, dove $\gamma(t) = (2t + t \cos(\pi t), t + t \sin(\pi t))$, $t \in [0, 1]$.

Svolgimento: Posto $\omega(x, y) = f \, dx + g \, dy$, si ha $\frac{\partial g}{\partial x} = \frac{\partial f}{\partial y} = -\frac{2xy}{(2+x^2+y^2)^2}$, per cui ω è chiusa in D , che è semplicemente connesso, e quindi ω è esatta in D . Una funzione potenziale U deve soddisfare

$$\begin{cases} \frac{\partial U}{\partial x} = \frac{x}{2+x^2+y^2} + 4x^3 \\ \frac{\partial U}{\partial y} = \frac{y}{2+x^2+y^2} - 6y^5. \end{cases}$$

Dalla prima equazione segue che $U(x, y) = \int \left(\frac{x}{2+x^2+y^2} + 4x^3 \right) dx = \frac{1}{2} \log(2 + x^2 + y^2) + x^4 + \varphi(y)$, e derivando rispetto ad y , $\frac{y}{2+x^2+y^2} + \varphi'(y) = \frac{\partial U}{\partial y} = \frac{y}{2+x^2+y^2} - 6y^5 \iff \varphi'(y) = -6y^5 \implies \varphi(y) = -y^6$, per cui una funzione potenziale è data da

$$U(x, y) = \frac{1}{2} \log(2 + x^2 + y^2) + x^4 - y^6.$$

Allora $\int_\gamma \omega = U(\gamma(1)) - U(\gamma(0)) = U(1, 1) - U(0, 0) = \frac{1}{2} \log 2$.

Esercizio A4. [punti 6] Data la serie

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x^2 - 2)^n}{n},$$

- (a) determinare gli insiemi di convergenza puntuale (o semplice) e assoluta,
(b) determinare il generico insieme di convergenza uniforme della serie.

Svolgimento: Posto $y = \varphi(x) = x^2 - 2$, la serie diventa $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{y^n}{n}$, che è una serie di potenze, il cui raggio di convergenza è $\frac{1}{\rho} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{1}{n}} = 1$. Per $y = 1$, la serie diventa $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$, che non converge. Per $y = -1$, la serie diventa $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n}$, che converge (non assolutamente), per Leibniz. Quindi, la serie di potenze converge assolutamente per ogni $y \in (-1, 1)$, semplicemente per ogni $y \in [-1, 1)$, e uniformemente in $[-1, 1 - \delta]$, $\forall \delta > 0$. Poiché $-1 \leq x^2 - 2 < 1 \iff x \in (-\sqrt{3}, -1] \cup [1, \sqrt{3})$, la serie data converge semplicemente in $(-\sqrt{3}, -1] \cup [1, \sqrt{3})$, converge assolutamente in $(-\sqrt{3}, -1) \cup (1, \sqrt{3})$, e uniformemente in $[-\sqrt{3} + \delta, -1] \cup [1, \sqrt{3} - \delta]$, per ogni $\delta > 0$.

Esercizio A5. [punti 6] Dato il sistema di equazioni differenziali

$$\begin{cases} x' = y \\ y' = y^{5/3} \end{cases} \quad (E)$$

determinare gli eventuali punti di equilibrio, e tracciare il diagramma di fase. Determinare la traiettoria di fase e la soluzione di (E) che soddisfano $x(0) = 1$, $y(0) = 1$.

Svolgimento: I punti di equilibrio nel piano delle fasi sono soluzioni del sistema

$$\begin{cases} x' = y = 0 \\ y' = y^{5/3} = 0 \end{cases} \iff y = 0.$$

Le traiettorie di fase sono soluzioni dell'equazione differenziale

$$\begin{cases} y \neq 0 \\ y'(x) = \frac{y^{5/3}}{y} = y^{2/3} \end{cases} \quad \text{oppure} \quad \begin{cases} y \neq 0 \\ x'(y) = \frac{1}{y^{2/3}}. \end{cases}$$

Integrando la prima equazione si ottiene $y = 0$, che non è ammissibile, e

$$x + c = \int dx = \int y^{-2/3} dy = 3y^{1/3} \iff y(x) = \left(\frac{x+c}{3}\right)^3, \quad c \in \mathbb{R}.$$

Osserviamo che $\mathbb{R}^2$ è unione disgiunta delle orbite

$$\{(x, 0)\}, \quad \forall x \in \mathbb{R},$$

$$\left\{ \left(x, \frac{(x+c)^3}{27}\right) : x < -c \right\}, \quad \forall c \in \mathbb{R},$$

$$\left\{ \left(x, \frac{(x+c)^3}{27}\right) : x > -c \right\}, \quad \forall c \in \mathbb{R}.$$

Figura 1: Diagramma di fase

Il diagramma di fase è riportato in figura 1.

Per determinare la traiettoria di fase richiesta, imponiamo il passaggio per $(x_0, y_0) = (1, 1)$, cioè $c = 2$, ottenendo $y(x) = \left(\frac{x+2}{3}\right)^3$, $x \in \mathbb{R}$.

Cerchiamo infine la soluzione di (E) che soddisfa le condizioni iniziali. Deve essere

$$x' = y(x) = \left(\frac{x+2}{3}\right)^3, \quad x \in \mathbb{R},$$

per cui $t + c = \int \frac{27 dx}{(x+2)^3} = -\frac{27}{2(x+2)^2}$, e dalla condizione iniziale $x(0) = 1$ segue $c = -\frac{3}{2}$, per cui

$$\begin{cases} x(t) = \frac{3\sqrt{3}}{\sqrt{3-2t}} - 2, & t < \frac{3}{2}, \\ y(t) = \frac{3\sqrt{3}}{(3-2t)^{3/2}}, & t < \frac{3}{2}. \end{cases}$$

CORSO DI STUDI IN FISICA – CALCOLO 2 (8/6/2023)

Esercizio A1. [punti 6] Studiare continuità, esistenza delle derivate parziali, differenziabilità di

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2y + 3xy^3}{2x^2 + y^2} & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

Esercizio A2. [punti 6] Sia data la forma differenziale

$$\omega(x, y) = \left(\frac{y^2}{2+x} - \frac{y}{x^2+y^2} \right) dx + \left(2y \log(2+x) + \frac{x}{x^2+y^2} \right) dy.$$

(a) Verificare se ω è chiusa/esatta in $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x > -2\} \setminus \{(0, 0)\}$.

(b) Calcolare $\int_{\partial^+ Q} \omega$, dove $Q = [-1, 2] \times [-2, 1]$.

Esercizio A3. [punti 6] Siano S la superficie contenuta nel piano $z = x - 1$ e limitata dal cono ellittico $z^2 = 2x^2 + y^2$.

(a) Determinare una parametrizzazione regolare di S .

(b) Calcolare

$$\int_S \frac{1}{2x^2 + y^2 - z^2 + 3} d\sigma.$$

Esercizio A4. [punti 6] Data la successione di funzioni

$$f_n(x) = \frac{n^2 x^2}{2 + n^2 x^2},$$

(a) determinare l'insieme di convergenza puntuale e $f(x) := \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x)$,

(b) determinare il generico intervallo di convergenza uniforme della successione.

Esercizio A5. [punti 6] Data l'equazione differenziale

$$(2 + u^2)u'' - 2u(u')^2 = 0,$$

(a) determinarne i punti di equilibrio, e tracciarne il diagramma di fase,

(b) determinare la soluzione che soddisfa le condizioni iniziali $u(0) = 0$, $u'(0) = 1$.

Esercizio A1. [punti 6] Studiare continuità, esistenza delle derivate parziali, differenziabilità di

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2y + 3xy^3}{2x^2 + y^2} & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

Svolgimento: La continuità di f in $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$ segue da teoremi generali sulle funzioni continue. In $(0, 0)$ si ha

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2y + 3xy^3}{2x^2 + y^2} = \lim_{(z,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\frac{1}{2}z^2y + \frac{3}{\sqrt{2}}zy^3}{z^2 + y^2} = \lim_{\varrho \rightarrow 0} \varrho \left(\frac{1}{2} \cos^2 \vartheta \sin \vartheta + \frac{3}{\sqrt{2}} \cos \vartheta \sin^2 \vartheta \right) = 0,$$

perché $\varrho \rightarrow 0$, e $|\frac{1}{2} \cos^2 \vartheta \sin \vartheta + \frac{3}{\sqrt{2}} \cos \vartheta \sin^2 \vartheta| \leq \frac{1}{2} + \frac{3}{\sqrt{2}}$. Quindi f è continua in $\mathbb{R}^2$. Calcoliamo le derivate parziali in $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$. Si ha

$$f_x(x, y) = \frac{y^3(3y^2 + 2x - 6x^2)}{(2x^2 + y^2)^2},$$

$$f_y(x, y) = \frac{x(3y^4 + 18x^2y^2 - xy^2 + 2x^3)}{(2x^2 + y^2)^2}.$$

Quindi le derivate parziali sono continue in $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$, per teoremi generali sulle funzioni continue. Calcoliamole in $(0, 0)$. Si ha

$$f_x(0, 0) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(t, 0) - f(0, 0)}{t} = 0,$$

$$f_y(0, 0) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(0, t) - f(0, 0)}{t} = 0.$$

Infine, f è differenziabile in $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$, perché ivi f è di classe C^1 . Verifichiamo se f è differenziabile in $(0, 0)$. Si ha

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2y + 3xy^3}{(2x^2 + y^2)\sqrt{x^2 + y^2}} = \nexists,$$

perché

$$\lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (0,0) \\ y=x}} \frac{x^2y + 3xy^3}{(2x^2 + y^2)\sqrt{x^2 + y^2}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^3 + 3x^4}{3\sqrt{2}x^2|x|} = \frac{1}{3\sqrt{2}} \lim_{x \rightarrow 0} (\operatorname{sgn} x + |x|) = \nexists.$$

Quindi f non è differenziabile in $(0, 0)$.

Esercizio A2. [punti 6] Sia data la forma differenziale

$$\omega(x, y) = \left(\frac{y^2}{2+x} - \frac{y}{x^2+y^2} \right) dx + \left(2y \log(2+x) + \frac{x}{x^2+y^2} \right) dy.$$

(a) Verificare se ω è chiusa/esatta in $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x > -2\} \setminus \{(0, 0)\}$.

(b) Calcolare $\int_{\partial^+ Q} \omega$, dove $Q = [-1, 2] \times [-2, 1]$.

Svolgimento: Indichiamo con $\omega = f(x, y) dx + g(x, y) dy$ la forma differenziale da integrare.

Poiché $\frac{\partial f}{\partial y} = \frac{2y}{2+x} + \frac{y^2-x^2}{(x^2+y^2)^2} = \frac{\partial g}{\partial x}$, ω è chiusa in D , che non è semplicemente connesso. Osser-

viamo, però, che $\omega = \omega_1 + \omega_2$ è la somma di una forma esatta $\omega_1 = \frac{y^2}{2+x} dx + 2y \log(2+x) dy$ [perché chiusa in $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x > -2\}$, che è semplicemente connesso], e di una forma chiusa non necessariamente esatta $\omega_2 = \frac{-y dx + x dy}{x^2+y^2}$. Usando l'invarianza omotopica dell'integrale

di una forma chiusa, possiamo introdurre la curva $\gamma(t) = (\cos t, \sin t)$, $t \in [0, 2\pi]$, e ottenere

$$\int_{\partial^+ Q} \omega = \int_{\partial^+ Q} \omega_1 + \int_{\partial^+ Q} \omega_2 = \int_{\partial^+ Q} \omega_2 = \int_{\gamma} \omega_2 = \int_0^{2\pi} (\sin^2 t + \cos^2 t) dt = 2\pi.$$

Esercizio A3. [punti 6] Siano S la superficie contenuta nel piano $z = x - 1$ e limitata dal cono ellittico $z^2 = 2x^2 + y^2$.

(a) Determinare una parametrizzazione regolare di S .

(b) Calcolare

$$\int_S \frac{1}{2x^2 + y^2 - z^2 + 3} d\sigma.$$

Svolgimento: (a) La superficie S è descritta dal grafico della funzione $z = x - 1$, definita sul dominio piano $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 2x^2 + y^2 \leq (x-1)^2\} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : (x+1)^2 + y^2 \leq 2\}$ [che si ottiene proiettando sul piano $z = 0$ l'insieme $S = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : 2x^2 + y^2 \leq z^2, z = x - 1\}$]. Quindi, una parametrizzazione regolare di S è data da $\Phi(x, y) = (x, y, x - 1)$, $(x, y) \in D$, il cui vettore normale è $\Phi_x \wedge \Phi_y = -\vec{i} + \vec{k}$.

(b) Si ha

$$\begin{aligned} \int_S \frac{1}{2x^2 + y^2 - z^2 + 3} d\sigma &= \iint_D \frac{\|\Phi_x \wedge \Phi_y\|}{2x^2 + y^2 - (x-1)^2 + 3} dx dy = \sqrt{2} \iint_D \frac{dx dy}{(x+1)^2 + y^2 + 1} \\ &\stackrel{(\alpha)}{=} \sqrt{2} \int_0^{2\pi} \int_0^{\sqrt{2}} \frac{\rho d\rho d\vartheta}{\rho^2 + 1} = \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot 2\pi [\log(\rho^2 + 1)]_0^{\sqrt{2}} = \pi\sqrt{2} \log 3, \end{aligned}$$

dove in (α) si è usato il cambiamento di coordinate $x = -1 + \rho \cos \vartheta$, $y = \rho \sin \vartheta$.

Esercizio A4. [punti 6] Data la successione di funzioni

$$f_n(x) = \frac{n^2 x^2}{2 + n^2 x^2},$$

- (a) determinare l'insieme di convergenza puntuale e $f(x) := \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x)$,
 (b) determinare il generico intervallo di convergenza uniforme della successione.

Svolgimento: Osserviamo che $f(x) := \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = \begin{cases} 0, & x = 0, \\ 1, & x \neq 0, \end{cases}$ e quindi la successione converge per ogni $x \in \mathbb{R}$. Poiché $f \notin C^0(\mathbb{R})$, $f_n \not\rightarrow f$ in $\mathbb{R}$. Inoltre, per ogni $a > 0$, $|f_n(x) - f(x)| = 1 - \frac{n^2 x^2}{2 + n^2 x^2} = \frac{2}{2 + n^2 x^2}$ è pari, e decrescente in $[a, +\infty)$, per cui $\sup_{|x| \geq a} |f_n(x) - f(x)| = \frac{2}{2 + n^2 a^2} \rightarrow 0$, e quindi $f_n \rightarrow f$ in $(-\infty, -a] \cup [a, +\infty)$, per ogni $a > 0$.

Esercizio A5. [punti 6] Data l'equazione differenziale

$$(2 + u^2)u'' - 2u(u')^2 = 0,$$

- (a) determinarne i punti di equilibrio, e tracciarne il diagramma di fase,
 (b) determinare la soluzione che soddisfa le condizioni iniziali $u(0) = 0$, $u'(0) = 1$.

Svolgimento: (a) Trasformiamo l'equazione in un sistema, introducendo le coordinate del piano delle fasi $x := u$, $y := u'$, e ottenendo

$$\begin{cases} x' = u' = y \\ y' = u'' = \frac{2u(u')^2}{u^2 + 2} = \frac{2xy^2}{x^2 + 2}. \end{cases}$$

I punti di equilibrio nel piano delle fasi sono soluzioni del sistema

$$\begin{cases} x' = y = 0 \\ y' = \frac{2xy^2}{x^2 + 2} = 0 \end{cases} \iff y = 0.$$

Le traiettorie di fase sono soluzioni dell'equazione differenziale

$$y'(x) = \frac{2xy(x)}{x^2 + 2}.$$

Integrando si ottiene $\int \frac{dy}{y} = \int \frac{2x dx}{x^2 + 2} \iff \log |y| = \log(x^2 + 2) + k \iff y = C(x^2 + 2)$, cioè le famiglie di grafici $y(x) = C(x^2 + 2)$, $C \in \mathbb{R}$. Il diagramma di fase è riportato in figura 1, per $C \in \{-4, -3, \dots, 4\}$.

(b) Per determinare la soluzione del problema di Cauchy proposto, imponiamo la condizione iniziale $y(0) = 1$, ottenendo $C = \frac{1}{2}$, per cui $y(x) = \frac{1}{2}(x^2 + 2)$, $\forall x \in \mathbb{R}$. Ricordando che $(x, y) = (u, u')$, si ottiene l'equazione differenziale $u' = \frac{1}{2}(u^2 + 2)$, e bisogna risolvere il problema di Cauchy

$$\begin{cases} u' = \frac{1}{2}(u^2 + 2) \\ u(0) = 0. \end{cases}$$

La soluzione è $t + c = \int dt = 2 \int \frac{du}{2 + u^2} = \sqrt{2} \operatorname{arctg} \frac{u}{\sqrt{2}} \iff u = \sqrt{2} \operatorname{tg} \left(\frac{\sqrt{2}}{2}(t + c) \right)$, e imponendo la condizione iniziale si ha $c = 0$, per cui $u(t) = \sqrt{2} \operatorname{tg} \left(\frac{\sqrt{2}}{2} t \right)$, $t \in \left(-\frac{\pi}{\sqrt{2}}, \frac{\pi}{\sqrt{2}} \right)$.

Figura 1: Diagramma di fase per l'equazione differenziale

CORSO DI STUDI IN FISICA – CALCOLO 2 (11/7/2023)

Esercizio A1. [punti 6] Data la seguente funzione

$$f(x, y) = x^3 - y^3$$

- (a) determinarne i punti stazionari e la loro natura,
 (b) determinare massimo e minimo di f in $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq 1\}$.

Esercizio A2. [punti 6] Siano $T := \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : \frac{1}{4}x^2 + y^2 \leq 1\}$, e ω la forma differenziale

$$\omega(x, y) = \left(x^2y + \frac{x}{x^2 + y^2}\right) dx + \left(x^3 + \frac{y}{x^2 + y^2}\right) dy.$$

- (a) Dire se ω è chiusa e/o esatta in $D = \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$.
 (b) Calcolare $\int_{\partial^+ T} \omega$.

Esercizio A3. [punti 6] Calcolare $\int_S \vec{F} \cdot \vec{n} d\sigma$, dove S è la superficie laterale della porzione di ellissoide $T = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 + 4z^2 \leq 4, z \leq \frac{1}{2}\}$, orientata nel verso della normale esterna $\vec{n}_e$, e

$$\vec{F}(x, y, z) = x^2yz \vec{i} - xy^2z \vec{j} + \log(1 + x^2 + y^2) \vec{k}.$$

Esercizio A4. [punti 6] Data la serie

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(n+1)e^{nx}}{e^{2n}},$$

- (a) determinare gli insiemi di convergenza puntuale (o semplice) e assoluta,
 (b) determinare il generico insieme di convergenza uniforme.

Esercizio A5. [punti 6] Determinare gli eventuali punti di equilibrio, e tracciare il diagramma di fase per il seguente sistema di equazioni differenziali

$$\begin{cases} x' = y^2 \\ y' = y. \end{cases} \quad (E)$$

Determinare, inoltre, la traiettoria di fase e la soluzione di (E) che soddisfano le condizioni iniziali $x(0) = 1, y(0) = 1$.

Esercizio A1. [punti 6] Data la seguente funzione

$$f(x, y) = x^3 - y^3$$

- (a) determinarne i punti stazionari e la loro natura,
 (b) determinare massimo e minimo di f in $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq 1\}$.

Svolgimento: (a) I punti stazionari sono soluzioni di

$$\begin{cases} f_x(x, y) = 3x^2 = 0 \\ f_y(x, y) = -3y^2 = 0 \end{cases}$$

che fornisce il punto $P_1 = (0, 0)$. Poiché $\det H_f(0, 0) = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, nulla si può dire sulla natura di P_1 .

(b) Poiché D è chiuso e limitato e f è continua su D , il teorema di Weierstrass ci assicura che f ha massimo e minimo su D . Come conseguenza del teorema di Fermat, cerchiamo i punti di massimo e minimo in tre insiemi:

(b1) tra i punti stazionari interni a D . In questo caso, $P_1 \in D^\circ$.

(b2) tra i punti interni a D in cui non esiste almeno una delle derivate parziali prime di f . In questo caso non ci sono.

(b3) tra i punti di frontiera di D . Determiniamo, allora, i punti di massimo e minimo di $f|_{\mathcal{F}D}$. Osserviamo che $\mathcal{F}D$ è costituita dalla circonferenza $C = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 = 1\}$. Usiamo il metodo dei moltiplicatori di Lagrange per studiare $f|_C$, e ci accontentiamo di trovare i punti stazionari della Lagrangiana [tra questi ci saranno anche i punti di massimo e minimo di $f|_C$]. Introduciamo la funzione di vincolo $g(x, y) = x^2 + y^2 - 1$, e determiniamo dapprima i punti non regolari per il vincolo, cioè le soluzioni del sistema

$$\begin{cases} g_x(x, y) = 2x = 0 \\ g_y(x, y) = 2y = 0 \\ g(x, y) = x^2 + y^2 - 1 = 0, \end{cases}$$

che non ha soluzione.

Introduciamo ora la Lagrangiana $\mathcal{L}(x, y, \lambda) = f(x, y) + \lambda g(x, y)$, e cerchiamo i punti stazionari di $\mathcal{L}$, cioè le soluzioni del sistema

$$\begin{cases} \mathcal{L}_x(x, y, \lambda) = 3x^2 + 2x\lambda = x(3x + 2\lambda) = 0 \\ \mathcal{L}_y(x, y, \lambda) = -3y^2 + 2y\lambda = y(-3y + 2\lambda) = 0 \\ \mathcal{L}_\lambda(x, y, \lambda) = x^2 + y^2 - 1 = 0, \end{cases}$$

$$\iff \begin{cases} x = 0 \\ y = 0 \\ -1 = 0, \end{cases} \quad \vee \begin{cases} x = 0 \\ y = \pm 1, \end{cases} \quad \vee \begin{cases} y = 0 \\ x = \pm 1, \end{cases} \quad \vee \begin{cases} y = \frac{2}{3}\lambda = -x \\ x = \pm \frac{1}{\sqrt{2}}, \end{cases}$$

cioè i punti $P_\pm = (0, \pm 1)$, $Q_\pm = (\pm 1, 0)$, $R_\pm = (\pm \frac{1}{\sqrt{2}}, \mp \frac{1}{\sqrt{2}})$.

(b4) Calcolando il valore di f su tutti i punti trovati, otteniamo $f(P_1) = 0$, $f(P_\pm) = \mp 1$, $f(Q_\pm) = \pm 1$, $f(R_\pm) = \pm \frac{1}{\sqrt{2}}$. Quindi $\min_D f = -1$ e $\max_D f = 1$.

Esercizio A2. [punti 6] Siano $T := \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : \frac{1}{4}x^2 + y^2 \leq 1\}$, e ω la forma differenziale

$$\omega(x, y) = \left(x^2y + \frac{x}{x^2 + y^2}\right) dx + \left(x^3 + \frac{y}{x^2 + y^2}\right) dy.$$

(a) Dire se ω è chiusa e/o esatta in $D = \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$.

(b) Calcolare $\int_{\partial^+ T} \omega$.

Svolgimento: (a) Posto $\omega(x, y) = f(x, y) dx + g(x, y) dy$, si ha $\frac{\partial g}{\partial x} - \frac{\partial f}{\partial y} = 3x^2 - \frac{2xy}{(x^2+y^2)^2} - x^2 + \frac{2xy}{(x^2+y^2)^2} = 2x^2 \neq 0$, per cui ω non è chiusa in D , e quindi nemmeno esatta.

Figura 1: Cammino $\partial^+ T$

(b) Osserviamo che $\omega = \omega_1 + \omega_2$, dove $\omega_1(x, y) := x^2y dx + x^3 dy$ non è chiusa in D , e $\omega_2(x, y) := \frac{x dx + y dy}{x^2 + y^2}$ è chiusa in D . Allora usiamo il teorema di Gauss-Green per calcolare $\int_{\partial^+ T} \omega_1$, e l'invarianza omotopica dell'integrale di una forma chiusa per calcolare $\int_{\partial^+ T} \omega_2$. Posto $\gamma(t) := (\cos t, \sin t)$, $t \in [0, 2\pi]$, si ha

$$\begin{aligned} \int_{\partial^+ T} \omega &= \int_{\partial^+ T} \omega_1 + \int_{\partial^+ T} \omega_2 = \iint_T 2x^2 dx dy + \int_{\partial^+ T} \omega_2 \stackrel{(a)}{=} 2 \int_{T_{\rho\vartheta}} 4\rho^2 \cos^2 \vartheta 2\rho d\rho d\vartheta + \int_{\gamma} \omega_2 \\ &= 16 \int_0^{2\pi} \cos^2 \vartheta \left(\int_0^1 \rho^3 d\rho \right) d\vartheta = 16 \int_0^{2\pi} \frac{1 + \cos 2\vartheta}{2} \left[\frac{\rho^4}{4} \right]_0^1 d\vartheta = 4\pi, \end{aligned}$$

dove in (a) si è usato il cambiamento di coordinate $x = 2\rho \cos \vartheta$, $y = \rho \sin \vartheta$.

Esercizio A3. [punti 6] Calcolare $\int_S \vec{F} \cdot \vec{n} d\sigma$, dove S è la superficie laterale della porzione di ellissoide $T = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 + 4z^2 \leq 4, z \leq \frac{1}{2}\}$, orientata nel verso della normale esterna $\vec{n}_e$, e

$$\vec{F}(x, y, z) = x^2yz\vec{i} - xy^2z\vec{j} + \log(1 + x^2 + y^2)\vec{k}.$$

Svolgimento: Sia $S' = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 \leq 3, z = \frac{1}{2}\}$, per cui $\partial T = S \cup S'$. Una parametrizzazione di S' è $\Phi(x, y) = (x, y, \frac{1}{2})$, $(x, y) \in A := \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq 3\}$, il cui vettore normale è $\Phi_x \wedge \Phi_y = \vec{k}$, che è esterno a T . Dal teorema della divergenza si ha

$$\iiint_T \operatorname{div} \vec{F} dx dy dz = \int_S \vec{F} \cdot \vec{n}_e d\sigma + \int_{S'} \vec{F} \cdot \vec{n}_e d\sigma,$$

dove $\vec{n}_e$ è il versore normale esterno rispetto a T . Poiché $\operatorname{div} F = 0$, si ha

$$\begin{aligned} \int_S \vec{F} \cdot \vec{n}_e d\sigma &= - \int_{S'} \vec{F} \cdot \vec{n}_e d\sigma = - \iint_A \vec{F} \circ \Phi \cdot \Phi_x \wedge \Phi_y dx dy \\ &= - \iint_A \log(x^2 + y^2 + 1) dx dy \stackrel{(a)}{=} - \int_0^{2\pi} \int_0^{\sqrt{3}} \log(\varrho^2 + 1) \varrho d\varrho d\vartheta \\ &\stackrel{(b)}{=} -\pi \int_1^4 \log t dt = -\pi \left[t(\log t - 1) \right]_1^4 = \pi(3 - 4 \log 4), \end{aligned}$$

dove in (a) si è usato il cambio di coordinate $x = \varrho \cos \vartheta$, $y = \varrho \sin \vartheta$, e in (b) il cambio di variabile $\varrho^2 + 1 = t$, $2\varrho d\varrho = dt$.

Figura 2: Superficie S , e orientazione del suo bordo (in rosso)

Esercizio A4. [punti 6] Data la serie

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(n+1)e^{nx}}{e^{2n}},$$

- (a) determinare gli insiemi di convergenza puntuale (o semplice) e assoluta,
 (b) determinare il generico insieme di convergenza uniforme.

Svolgimento: (Primo metodo: trasformazione in serie di potenze) Posto $y = \varphi(x) = e^{x-2}$, la serie diventa $\sum_{n=1}^{\infty} (n+1)y^n$, che è una serie di potenze, il cui raggio di convergenza è $\frac{1}{e} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n+1} = 1$. Per $y = 1$, la serie diventa $\sum_{n=1}^{\infty} (n+1)$, che non converge. Per $y = -1$, la serie diventa $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n (n+1)$, che non converge. Quindi, la serie di potenze converge assolutamente e semplicemente per ogni $y \in (-1, 1)$, e uniformemente in $[-1+\delta, 1-\delta]$, $\forall \delta > 0$.

Tornando alla serie proposta, poiché $-1 < e^{x-2} < 1 \iff x < 2$, la serie data converge assolutamente e semplicemente in $(-\infty, 2)$, e uniformemente in $(-\infty, 2-\delta]$, per ogni $\delta > 0$.

(Secondo metodo: serie di funzioni) Applicando il criterio della radice, ad $x \in \mathbb{R}$ fissato, si ha $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n+1} e^{x-2} = e^{x-2} < 1 \iff x < 2$. Se $x = 2$, la serie data diventa $\sum_{n=1}^{\infty} (n+1)$ che diverge, per cui la serie data converge puntualmente e assolutamente in $(-\infty, 2)$, e non converge altrove.

Per la convergenza uniforme, applichiamo il criterio di Weierstrass, e sia

$$M_n := \sup_{x \leq 2-\delta} (n+1)e^{n(x-2)} = (n+1)e^{-n\delta}, \quad \forall n \in \mathbb{N},$$

perché la funzione $e^{n(x-2)}$ è strettamente crescente. Poiché $\sum_{n=1}^{\infty} M_n < \infty$, la serie data converge uniformemente in $(-\infty, 2-\delta]$, per ogni $\delta > 0$.

Esercizio A5. [punti 6] Determinare gli eventuali punti di equilibrio, e tracciare il diagramma di fase per il seguente sistema di equazioni differenziali

$$\begin{cases} x' = y^2 \\ y' = y. \end{cases} \quad (E)$$

Determinare, inoltre, la traiettoria di fase e la soluzione di (E) che soddisfano le condizioni iniziali $x(0) = 1, y(0) = 1$.

Svolgimento: I punti di equilibrio nel piano delle fasi sono soluzioni del sistema

$$\begin{cases} x' = y^2 = 0 \\ y' = y = 0 \end{cases} \iff y = 0.$$

Le traiettorie di fase sono soluzioni dell'equazione differenziale

$$\begin{cases} y \neq 0 \\ y'(x) = \frac{1}{y} \end{cases} \quad \text{oppure} \quad \begin{cases} y \neq 0 \\ x'(y) = y. \end{cases}$$

Integrando la prima equazione si ottiene

$$\int y \, dy = \int dx \iff \frac{1}{2} y^2 = x + c \iff y = \pm \sqrt{2x + C}, \quad C \in \mathbb{R}.$$

Osserviamo che $\mathbb{R}^2$ è unione disgiunta delle orbite

$$\{(x, 0)\}, \quad \forall x \in \mathbb{R},$$

$$\{(x, \pm\sqrt{2x+C}) : x > -\frac{C}{2}\} = \{(\frac{1}{2}(y^2 - C), y) : y \in \mathbb{R}\}, \quad \forall C \in \mathbb{R}.$$

Alcune traiettorie di fase sono riportate in figura 3.

Figura 3: Diagramma di fase

Per determinare la traiettoria di fase richiesta, imponiamo la condizione iniziale $y(1) = 1$, e otteniamo $C = -1$, per cui

$$y(x) = \sqrt{2x-1}, \quad x > \frac{1}{2}.$$

Cerchiamo infine la soluzione di (E) che soddisfa le condizioni iniziali. Deve essere

$$x' = y(x)^2 = 2x - 1, \quad x > \frac{1}{2},$$

per cui

$$t + c = \int dt = \int \frac{dx}{2x-1} = \frac{1}{2} \log |2x-1|.$$

Dalla condizione iniziale $x(0) = 1$ segue $c = 0$, per cui

$$\begin{cases} x(t) = \frac{1}{2}(e^{2t} + 1), & t \in \mathbb{R}, \\ y(t) = \sqrt{2x(t) - 1} = e^t, & t \in \mathbb{R}. \end{cases}$$

CORSO DI STUDI IN FISICA – CALCOLO 2 (5/9/2023)

Esercizio A1. [punti 6] Determinare massimo e minimo della funzione

$$f(x, y) = \frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{2}y^2,$$

su $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq 1\}$.

Esercizio A2. [punti 6] Calcolare il seguente integrale

$$\iiint_D y^2(2 - z) \, dx dy dz$$

dove $D = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 \leq (1 - z)^2, 0 \leq z \leq 1\}$ è una porzione di cono.

Esercizio A3. [punti 6] Calcolare $\int_S \vec{F} \cdot \vec{n} \, d\sigma$, dove S è la superficie laterale del paraboloide

$$T = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : y^2 + z^2 \leq x \leq 4\},$$

orientata nel verso della normale esterna, e

$$\vec{F}(x, y, z) = (y^2 z^2 + 1) \vec{i} + \frac{2y}{x^2 + 1} \vec{j} - \frac{2z}{x^2 + 1} \vec{k}.$$

Esercizio A4. [punti 6] Data la successione di funzioni

$$f_n(x) = \frac{n^2}{1 + n^2 x^2},$$

(a) determinare l'insieme di convergenza puntuale e $f(x) := \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x)$,

(b) determinare il generico intervallo di convergenza uniforme della successione.

Esercizio A5. [punti 6] Data l'equazione differenziale

$$u'' = -2(u')^2 \operatorname{tg} u, \tag{E}$$

determinare i punti di equilibrio, e tracciare il diagramma di fase. Determinare la soluzione di (E) che soddisfa le condizioni iniziali $u(1) = 0$, $u'(1) = 2$.

Esercizio A1. [punti 6] Determinare massimo e minimo della funzione

$$f(x, y) = \frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{2}y^2,$$

su $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq 1\}$.

Svolgimento: Poiché D è chiuso e limitato e f è continua su D , il teorema di Weierstrass ci assicura che f ha massimo e minimo su D . Come conseguenza del teorema di Fermat, cerchiamo i punti di massimo e minimo in tre insiemi:

(a) tra i punti stazionari interni a D . Cerchiamo, cioè, le soluzioni $(x, y) \in D^\circ$ del sistema

$$\begin{cases} f_x(x, y) = x^2 = 0 \\ f_y(x, y) = y = 0 \end{cases}$$

che fornisce il punto $(0, 0)$.

(b) tra i punti interni a D in cui non esiste almeno una delle derivate parziali prime di f . In questo caso non ci sono.

(c) tra i punti di frontiera di D . Determiniamo, allora, i punti di massimo e minimo di $f|_{\mathcal{F}D}$. Per determinare il massimo e il minimo di f sull'insieme $S = \{(x, y) \in D : x^2 + y^2 = 1\}$, usiamo il metodo dei moltiplicatori di Lagrange, e ci accontentiamo di trovare i punti stazionari della Lagrangiana [tra questi ci saranno anche i punti di massimo e minimo di $f|_S$].

Introduciamo la funzione di vincolo $g(x, y) = x^2 + y^2 - 1$, e determiniamo dapprima i punti non regolari per il vincolo, cioè le soluzioni del sistema

$$\begin{cases} g_x(x, y) = 2x = 0 \\ g_y(x, y) = 2y = 0 \\ g(x, y) = x^2 + y^2 - 1 = 0 \end{cases}$$

che non ha soluzione.

Introduciamo ora la Lagrangiana $\mathcal{L}(x, y, \lambda) = f(x, y) + \lambda g(x, y)$, e cerchiamo i punti stazionari di $\mathcal{L}$, cioè le soluzioni del sistema

$$\begin{cases} \mathcal{L}_x(x, y, \lambda) = x^2 + 2x\lambda = x(x + 2\lambda) = 0 \\ \mathcal{L}_y(x, y, \lambda) = y + 2y\lambda = y(1 + 2\lambda) = 0 \\ \mathcal{L}_\lambda(x, y, \lambda) = x^2 + y^2 - 1 = 0 \end{cases}$$

che equivale a

$$\begin{cases} x = 0 \\ y = 0 \\ x^2 + y^2 - 1 = 0 \end{cases} \quad \vee \quad \begin{cases} x = 0 \\ 1 + 2\lambda = 0 \\ y^2 - 1 = 0 \end{cases}$$

$$\vee \begin{cases} x + 2\lambda = 0 \\ y = 0 \\ x^2 + y^2 - 1 = 0 \end{cases} \quad \vee \quad \begin{cases} x + 2\lambda = 0 \\ 1 + 2\lambda = 0 \\ x^2 + y^2 - 1 = 0. \end{cases}$$

Il primo sistema è assurdo. Il secondo fornisce i punti $P_\pm = (0, \pm 1)$. Il terzo fornisce i punti $Q_\pm = (\pm 1, 0)$. Il quarto fornisce il punto $Q_+ = (1, 0)$.

(d) Calcolando il valore di f su tutti i punti trovati, otteniamo $f(O) = 0$, $f(P_\pm) = \frac{1}{2}$, $f(Q_\pm) = \pm \frac{1}{3}$. Quindi $\min_D f = -\frac{1}{3}$ e $\max_D f = \frac{1}{2}$.

Esercizio A2. [punti 6] Calcolare il seguente integrale

$$\iiint_D y^2(2-z) \, dx dy dz$$

dove $D = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 \leq (1-z)^2, 0 \leq z \leq 1\}$ è una porzione di cono.

Svolgimento: Si ha

Figura 1: Dominio D

$$\begin{aligned} \iiint_D y^2(2-z) \, dx dy dz &\stackrel{(a)}{=} \iiint_{D_{\varrho\vartheta z}} (2-z)\varrho^2 \sin^2 \varphi \varrho \, d\varrho d\vartheta dz \\ &= \int_0^1 (2-z) \left(\int_0^{2\pi} \sin^2 \varphi \, d\varphi \int_0^{1-z} \varrho^3 \, d\varrho \right) dz \stackrel{(b)}{=} \pi \int_0^1 (2-z) \left[\frac{\varrho^4}{4} \right]_0^{1-z} dz \\ &= \frac{\pi}{4} \int_0^1 (2-z)(1-z)^4 dz \stackrel{(c)}{=} \frac{\pi}{4} \int_0^1 t^4(t+1) dt = \frac{\pi}{4} \left[\frac{t^6}{6} + \frac{t^5}{5} \right]_0^1 = \frac{11\pi}{120}, \end{aligned}$$

dove in (a) si è usato il cambio di variabile $x = \varrho \cos \vartheta$, $y = \varrho \sin \vartheta$, $z = z$, per cui $D_{\varrho\vartheta z} = \{(\varrho, \vartheta, z) \in \mathbb{R}^3 : 0 \leq \varrho \leq 1-z, \vartheta \in [0, 2\pi], z \in [0, 1]\}$, in (b) il risultato $\int_0^{2\pi} \sin^2 \varphi \, d\varphi = \int_0^{2\pi} \frac{1}{2}(1 - \cos 2\varphi) \, d\varphi = \pi$, e in (c) la sostituzione $t = 1-z$.

Esercizio A3. [punti 6] Calcolare $\int_S \vec{F} \cdot \vec{n} \, d\sigma$, dove S è la superficie laterale del paraboloido

$$T = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : y^2 + z^2 \leq x \leq 4\},$$

orientata nel verso della normale esterna, e

$$\vec{F}(x, y, z) = (y^2 z^2 + 1) \vec{i} + \frac{2y}{x^2 + 1} \vec{j} - \frac{2z}{x^2 + 1} \vec{k}.$$

Svolgimento: Sia $S' = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : y^2 + z^2 \leq 4, x = 4\}$, per cui $\partial T = S \cup S'$. Una parametrizzazione di S' è $\Phi(y, z) = (4, y, z)$, $(y, z) \in A := \{(y, z) \in \mathbb{R}^2 : y^2 + z^2 \leq 4\}$, il cui vettore normale è $\Phi_y \wedge \Phi_z = \vec{i}$, che è esterno a T . Dal teorema della divergenza si ha

$$\iiint_T \operatorname{div} \vec{F} \, dx dy dz = \int_S \vec{F} \cdot \vec{n}_e \, d\sigma + \int_{S'} \vec{F} \cdot \vec{n}_e \, d\sigma,$$

Figura 2: Superficie S

dove $\vec{n}_e$ è il vettore normale esterno rispetto a T . Poiché $\operatorname{div} F = 0$, si ha

$$\begin{aligned} \int_S \vec{F} \cdot \vec{n}_e \, d\sigma &= - \int_{S'} \vec{F} \cdot \vec{n}_e \, d\sigma = - \iint_A \vec{F} \circ \Phi \cdot \Phi_y \wedge \Phi_z \, dydz \\ &= - \iint_A (y^2 z^2 + 1) \, dydz \stackrel{(a)}{=} - \int_0^{2\pi} \int_0^2 (1 + \varrho^4 \cos^2 \vartheta \sin^2 \vartheta) \varrho \, d\varrho d\vartheta \\ &\stackrel{(b)}{=} - \int_0^{2\pi} \left[\frac{\varrho^2}{2} \right]_0^2 d\vartheta - \int_0^{2\pi} \left[\frac{\varrho^6}{6} \right]_0^2 \frac{1}{8} (1 - \cos 4\vartheta) d\vartheta = -4\pi - \frac{8}{3}\pi = -\frac{20}{3}\pi, \end{aligned}$$

dove in (a) si è usato il cambio di coordinate $y = \varrho \cos \vartheta$, $z = \varrho \sin \vartheta$, e in (b) il risultato $\cos^2 \vartheta \sin^2 \vartheta = \frac{1}{4} \sin^2(2\vartheta) = \frac{1}{8}(1 - \cos 4\vartheta)$.

Esercizio A4. [punti 6] Data la successione di funzioni

$$f_n(x) = \frac{n^2}{1 + n^2 x^2},$$

- (a) determinare l'insieme di convergenza puntuale e $f(x) := \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x)$,
 (b) determinare il generico intervallo di convergenza uniforme della successione.

Svolgimento: Osserviamo che

$$f(x) := \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = \begin{cases} +\infty, & x = 0, \\ \frac{1}{x^2}, & x \neq 0, \end{cases}$$

e quindi la successione converge per ogni $x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$. Poiché $f \notin C^0(\mathbb{R})$, $f_n \not\rightarrow f$ in $\mathbb{R}$. Inoltre, per ogni $a > 0$,

$$|f_n(x) - f(x)| = \frac{1}{x^2} - \frac{n^2}{1 + n^2 x^2} = \frac{1}{x^2(1 + n^2 x^2)}$$

è pari, e decrescente in $[a, +\infty)$, per cui

$$\sup_{|x| \geq a} |f_n(x) - f(x)| = \frac{1}{a^2(1 + n^2 a^2)} \rightarrow 0,$$

e quindi $f_n \rightrightarrows f$ in $(-\infty, -a] \cup [a, +\infty)$, per ogni $a > 0$.

Esercizio A5. [punti 6] Data l'equazione differenziale

$$u'' = -2(u')^2 \operatorname{tg} u, \quad (E)$$

determinare i punti di equilibrio, e tracciare il diagramma di fase. Determinare la soluzione di (E) che soddisfa le condizioni iniziali $u(1) = 0, u'(1) = 2$.

Svolgimento: L'equazione differenziale è della forma $u'' = f(u, u')$, con $f(x, y) = -2y^2 \operatorname{tg} x$, $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$. I punti di equilibrio nel piano delle fasi sono soluzioni del sistema

$$\begin{cases} u' = 0 \\ u'' = f(u, u') = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} y = 0 \\ f(x, 0) = 0 \end{cases} \iff y = 0, x \in \mathbb{R}, x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}.$$

Le traiettorie di fase sono soluzioni dell'equazione differenziale

$$y'(x) = \frac{f(x, y(x))}{y(x)} = -2y(x) \operatorname{tg} x.$$

Integrando si ottiene

$$\log |y(x)| = \int \frac{dy}{y} = -2 \int \frac{\sin x}{\cos x} dx = 2 \log |\cos x| + \tilde{c} \iff y(x) = C \cos^2 x, \quad C \in \mathbb{R}.$$

Il diagramma di fase è riportato in figura 3, per $C \in \{-4, -3, \dots, 4\}$.

Figura 3: Diagramma di fase

Per determinare la soluzione del problema di Cauchy proposto, imponiamo la condizione iniziale $y(0) = 2$, ottenendo $C = 2$, per cui la traiettoria di fase cercata è

$$y(x) = 2 \cos^2 x, \quad \forall x \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right).$$

Ricordando che $(x, y) = (u, u')$, si ottiene l'equazione differenziale $u' = 2 \cos^2 u$, che ha soluzione $2t + c = \int 2 dt = \int \frac{du}{\cos^2 u} = \operatorname{tg} u$. Usando la condizione iniziale, si ha $c = -2$, per cui

$$u(t) = \operatorname{arctg}(2t - 2), \quad t \in \mathbb{R}.$$

Esercizio A1. [punti 6] Studiare continuità, esistenza delle derivate parziali e differenziabilità di

$$f(x, y) = \begin{cases} y^3 \log(x^2 + y^2) + x^2 y^2 + 2y & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

Determinare l'eventuale equazione del piano tangente al grafico nel punto $(0, 0)$.

Esercizio A2. [punti 6] Calcolare il seguente integrale

$$\iint_D \frac{y}{\sqrt{x+4}} dx dy ,$$

dove $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 5 \leq x \leq 12, \frac{1}{\sqrt{x}} \leq y \leq \sqrt{x-3}\}$.

Esercizio A3. [punti 6] Siano T la semicorona circolare

$$T := \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 1 \leq x^2 + y^2 \leq 9, x \geq 0\}$$

e ω la forma differenziale

$$\omega(x, y) = \left(\cos x - \frac{3y}{(x-2)^2 + y^2} \right) dx + \left(\cos y^2 + \frac{3(x-2)}{(x-2)^2 + y^2} \right) dy.$$

(a) Dire se ω è chiusa e/o esatta in $\mathbb{R}^2 \setminus \{(2, 0)\}$.

(b) Calcolare $\int_{\partial^+ T} \omega$.

Esercizio A4. [punti 6] Data la serie

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{1 + (2x)^n}, \quad x \neq -\frac{1}{2},$$

(a) determinare l'insieme di convergenza puntuale,

(b) determinare l'insieme di convergenza assoluta.

Esercizio A5. [punti 6] Risolvere il problema di Cauchy

$$\begin{cases} y' = Ay \\ y(0) = y_0 \end{cases} \quad A = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad y_0 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

Esercizio A1. [punti 6] Studiare continuità, esistenza delle derivate parziali e differenziabilità di

$$f(x, y) = \begin{cases} y^3 \log(x^2 + y^2) + x^2 y^2 + 2y & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

Determinare l'eventuale equazione del piano tangente al grafico nel punto $(0, 0)$.

Svolgimento: La continuità di f in $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$ segue da teoremi generali sulle funzioni continue. In $(0, 0)$ si ha

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} y^3 \log(x^2 + y^2) + x^2 y^2 + 2y = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} y^3 \log(x^2 + y^2) = \lim_{\varrho \rightarrow 0} \varrho^3 \sin^3 \vartheta \log(\varrho^2) = 0,$$

perché $\varrho^3 \log(\varrho^2) \rightarrow 0$ e $|\sin^3 \vartheta| \leq 1$. Quindi f è continua in $\mathbb{R}^2$.

Calcoliamo le derivate parziali in $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$. Si ha

$$f_x(x, y) = \frac{2xy^3}{x^2 + y^2} + 2xy^2$$

$$f_y(x, y) = 3y^2 \log(x^2 + y^2) + \frac{2y^4}{x^2 + y^2} + 2x^2 y + 2.$$

Quindi le derivate parziali sono anche continue in $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$. Calcoliamole in $(0, 0)$. Si ha

$$f_x(0, 0) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(t, 0) - f(0, 0)}{t} = \lim_{t \rightarrow 0} t \log(t^2) = 0$$

$$f_y(0, 0) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(0, t) - f(0, 0)}{t} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t^3 \log(t^2) + 2t}{t} = 2.$$

Infine, f è differenziabile in $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$, perché le derivate parziali sono continue in $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$. In $(0, 0)$ si ha

$$\begin{aligned} \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{f(x, y) - f_y(0, 0)y}{(x^2 + y^2)^{1/2}} &= \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{y^3 \log(x^2 + y^2) + x^2 y^2 + 2y - 2y}{(x^2 + y^2)^{1/2}} \\ &= \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{y^3 \log(x^2 + y^2)}{(x^2 + y^2)^{1/2}} + \frac{x^2 y^2}{(x^2 + y^2)^{1/2}} \\ &= \lim_{\varrho \rightarrow 0} (\varrho^2 \log(\varrho^2) \sin^3 \vartheta + \varrho^3 \cos^2 \vartheta \sin^2 \vartheta) = 0, \end{aligned}$$

perché $\varrho^2 \log(\varrho^2) \rightarrow 0$, $\varrho^3 \rightarrow 0$, e $|\sin^3 \vartheta| \leq 1$, $|\cos^2 \vartheta \sin^2 \vartheta| \leq 1$. Quindi f è differenziabile in $\mathbb{R}^2$.

Il piano tangente al grafico di f in $(0, 0)$ ha equazione $z = f(0, 0) + f_x(0, 0)x + f_y(0, 0)y = 2y$.

Esercizio A2. [punti 6] Calcolare il seguente integrale

$$\iint_D \frac{y}{\sqrt{x+4}} dx dy,$$

dove $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 5 \leq x \leq 12, \frac{1}{\sqrt{x}} \leq y \leq \sqrt{x-3}\}$.

Svolgimento: Si ha

Figura 1: Dominio D

$$\begin{aligned} \iint_D \frac{y}{\sqrt{x+4}} dx dy &= \int_5^{12} \left(\int_{1/\sqrt{x}}^{\sqrt{x-3}} \frac{y}{\sqrt{x+4}} dy \right) dx = \int_5^{12} \left[\frac{y^2}{2} \right]_{1/\sqrt{x}}^{\sqrt{x-3}} \frac{dx}{\sqrt{x+4}} \\ &= \frac{1}{2} \int_5^{12} \left(x-3 - \frac{1}{x} \right) \frac{dx}{\sqrt{x+4}} \stackrel{(a)}{=} \int_3^4 \left(t^2 - 7 - \frac{1}{t^2-4} \right) dt \\ &\stackrel{(b)}{=} \left[\frac{t^3}{3} - 7t - \frac{1}{4} \log \left| \frac{t-2}{t+2} \right| \right]_3^4 = \frac{16}{3} - \frac{1}{4} \log \frac{5}{3}, \end{aligned}$$

dove in (a) si è usato il cambio di variabile $\sqrt{x+4} = t \iff x = t^2 - 4$, e in (b) la decomposizione $\frac{1}{t^2-4} = \frac{1}{4} \left(\frac{1}{t-2} - \frac{1}{t+2} \right)$.

Esercizio A3. [punti 6] Siano T la semicorona circolare

$$T := \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 1 \leq x^2 + y^2 \leq 9, x \geq 0\}$$

e ω la forma differenziale

$$\omega(x, y) = \left(\cos x - \frac{3y}{(x-2)^2 + y^2} \right) dx + \left(\cos y^2 + \frac{3(x-2)}{(x-2)^2 + y^2} \right) dy.$$

(a) Dire se ω è chiusa e/o esatta in $\mathbb{R}^2 \setminus \{(2, 0)\}$.

(b) Calcolare $\int_{\partial^+ T} \omega$.

Svolgimento:

(a) Posto $\omega(x, y) = f(x, y) dx + g(x, y) dy$, si ha $\frac{\partial g}{\partial x} - \frac{\partial f}{\partial y} = 3 \frac{y^2 - (x-2)^2}{(x^2 + y^2)^2} - 3 \frac{y^2 - (x-2)^2}{(x^2 + y^2)^2} = 0$, per cui ω è chiusa in $D := \mathbb{R}^2 \setminus \{(2, 0)\}$, che non è semplicemente connesso.

(b) Osserviamo che $\omega = \omega_1 + \omega_2$, dove $\omega_1(x, y) := \cos x dx + \cos y^2 dy$ è chiusa, e quindi esatta, in $\mathbb{R}^2$, e $\omega_2(x, y) := \frac{-3y dx + 3(x-2) dy}{(x-2)^2 + y^2}$ è chiusa in D . Allora usiamo l'invarianza omotopica

Figura 2: Dominio T

dell'integrale di una forma chiusa per calcolare $\int_{\partial+T} \omega_2$. Posto $\gamma(t) := (2 + \cos t, \sin t)$, $t \in [0, 2\pi]$, si ha

$$\int_{\partial+T} \omega = \int_{\partial+T} \omega_1 + \int_{\partial+T} \omega_2 = \int_{\gamma} \omega_2 = 3 \int_0^{2\pi} (\sin^2 \vartheta + \cos^2 \vartheta) d\vartheta = 6\pi,$$

per cui ω non è esatta in D .

Esercizio A4. [punti 6] Data la serie

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{1 + (2x)^n}, \quad x \neq -\frac{1}{2},$$

- (a) determinare l'insieme di convergenza puntuale,
- (b) determinare l'insieme di convergenza assoluta.

Svolgimento: Sia $a_n := \frac{1}{1+(2x)^n}$, $n \in \mathbb{N}$. Per $|x| < \frac{1}{2}$ si ha $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 1$ e la serie non converge. Per $x = \frac{1}{2}$ si ha $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \frac{1}{2}$ e la serie non converge. Sia $|x| > \frac{1}{2}$. Poiché $\sqrt[n]{|a_n|} = \frac{1}{\sqrt[n]{|1+(2x)^n|}} = \frac{1}{2|x|}(1+o(1))$, la serie converge assolutamente per $x \in (-\infty, -\frac{1}{2}) \cup (\frac{1}{2}, +\infty)$. Quindi la serie converge assolutamente in $(-\infty, -\frac{1}{2}) \cup (\frac{1}{2}, +\infty)$. Non converge altrove.

Esercizio A5. [punti 6] Risolvere il problema di Cauchy

$$\begin{cases} y' = Ay \\ y(0) = y_0 \end{cases} \quad A = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad y_0 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

Svolgimento: Cerchiamo gli autovalori di A :

$$\begin{aligned} \det(A - \lambda I) &= \begin{vmatrix} 3 - \lambda & -1 & 1 \\ 1 & 1 - \lambda & 1 \\ 0 & 0 & 2 - \lambda \end{vmatrix} = (2 - \lambda)((3 - \lambda)(1 - \lambda) + 1) = (2 - \lambda)(\lambda^2 - 4\lambda + 4) \\ &= (2 - \lambda)^3 = 0, \end{aligned}$$

da cui si ottiene la soluzione $\lambda_1 = 2$ (tripla).

Autovettori per $\lambda_1 = 2$:

$$0 = (A - 2I)\vec{v} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \iff x_1 - x_2 + x_3 = 0.$$

Poiché ci sono solo due autovettori indipendenti (perché c'è una sola relazione lineare fra le coordinate), occorre cercare un autovettore generalizzato:

$$0 = (A - 2I)^2 \vec{v} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \iff \forall \vec{v},$$

e quindi scegliamo $\vec{v}_1 = \vec{e}_1 \in \ker(A - I)^2 \setminus \ker(A - I)$, e $\vec{v}_2 = (A - 2I)\vec{v}_1 = \vec{e}_1 + \vec{e}_2 \in \ker(A - 2I)$. Infine, un secondo autovettore indipendente dal precedente è $\vec{v}_3 = \vec{e}_2 + \vec{e}_3$.

Da $y_0 = c_1\vec{v}_1 + c_2\vec{v}_2 + c_3\vec{v}_3$ si ricava

$$\begin{cases} 0 = y_1(0) = c_1 + c_2 \\ 1 = y_2(0) = c_2 + c_3 \\ 2 = y_3(0) = c_3 \end{cases} \iff \begin{cases} c_1 = 1 \\ c_2 = -1 \\ c_3 = 2. \end{cases}$$

La soluzione del problema di Cauchy è quindi:

$$\begin{aligned} y(t) &= e^{At}y_0 = c_1e^{At}\vec{v}_1 + c_2e^{At}\vec{v}_2 + c_3e^{At}\vec{v}_3 = c_1e^{2t}(I + (A - 2I)t)\vec{v}_1 + c_2e^{2t}\vec{v}_2 + c_3e^{2t}\vec{v}_3 \\ &= c_1e^{2t}\vec{v}_1 + (c_1t + c_2)e^{2t}\vec{v}_2 + c_3e^{2t}\vec{v}_3 = e^{2t} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + (t - 1)e^{2t} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + 2e^{2t} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \end{aligned}$$

cioè

$$\begin{aligned} y_1(t) &= te^{2t} \\ y_2(t) &= (1 + t)e^{2t} \\ y_3(t) &= 2e^{2t}. \end{aligned}$$