

# Corso di Fondamenti di Analisi Matematica

a.a. 2013-14

G. Morsella

Esercizi del 13/5/14

1. Sia  $X$  uno spazio metrico compatto. Verificare che  $C(X)$  separa i punti di  $X$ .
- \*2. Siano  $X$  uno spazio compatto di Hausdorff, e  $\delta_x \in \Omega(X)$  dato da  $\delta_x(f) := f(x)$ ,  $x \in X$ . Si mostri:
  - (a) dato per scontato che  $C(X)$  separa i punti di  $X$ ,  $x \mapsto \delta_x$  è iniettiva;
  - (b)  $x \mapsto \delta_x$  è suriettiva (sugg.: se per assurdo  $\omega \in \Omega(C(X))$  è tale che per ogni  $x \in X$  esiste  $f_x \in C(X)$  con  $\omega(f_x) \neq f_x(x)$ , posto  $g_x := f_x - \omega(f_x)$  si può trovare un ricoprimento aperto  $(A_{x_j})_{j=1, \dots, n}$  di  $X$  tale che  $g_{x_j}(y) \neq 0$  per ogni  $y \in A_{x_j}$ ,  $j = 1, \dots, n$ , e posto allora  $g := |g_{x_1}|^2 + \dots + |g_{x_n}|^2 \in \ker \omega$  si ha  $g^{-1} \in C(X)$  e  $1 = gg^{-1} \in \ker \omega$ );
  - (c)  $X$  è omeomorfo a  $\Omega(C(X))$ .
3. Siano  $\mathcal{A}$  una  $C^*$ -algebra,  $\mathcal{S} \subset \mathcal{A}$  un sottoinsieme, e

$$C^*(\mathcal{S}) := \bigcap \{ \mathcal{B} \subset \mathcal{A} \text{ } C^*\text{-sottoalgebra contenente } \mathcal{S} \}.$$

la  $C^*$ -sottoalgebra di  $\mathcal{A}$  generata da  $\mathcal{S}$ . Si verifichi che, usando la notazione  $a^\sharp = a$  o  $a^*$ ,

$$C^*(\mathcal{S}) = \overline{\langle a_1^\sharp \dots a_n^\sharp : a_i \in \mathcal{S}, i = 1, \dots, n, n \in \mathbb{N} \rangle}.$$

4. Siano  $H = \ell^2(\mathbb{Z})$  e  $U \in B(H)$  l'operatore definito da  $Ue_n = e_{n+1}$ ,  $n \in \mathbb{Z}$ , con  $(e_n)_{n \in \mathbb{Z}}$  la base ortonormale canonica. Si mostri:
  - (a) esiste un operatore unitario  $V : L^2([0, 2\pi]) \rightarrow \ell^2(\mathbb{Z})$  tale che  $U = VM_gV^*$ , con  $M_g \in B(L^2([0, 2\pi]))$  l'operatore di moltiplicazione per la funzione  $g(\theta) = e^{i\theta}$ ,  $\theta \in [0, 2\pi]$ ;
  - (b)  $U$  è unitario e  $\sigma(U) = \mathbb{T}$ ;
  - (c) se  $\mathcal{B} := \overline{\langle \mathbb{1}, U, U^2, \dots \rangle}$  è la sottoalgebra di Banach con unità di  $B(H)$  generata da  $U$ , si ha  $0 \in \sigma_{\mathcal{B}}(U)$  (sugg: se  $p \in \mathcal{B}$  è un polinomio,  $\langle U^*e_n, pe_n \rangle = 0$ , da cui  $U^* \notin \mathcal{B}$ ).
5. Siano  $\mathcal{A}$  una  $C^*$ -algebra con unità, e  $a_1, \dots, a_n \in \mathcal{A}$  elementi normali a due a due commutanti. Posto  $\mathcal{B} := C^*(\{\mathbb{1}, a_1, \dots, a_n\})$ , si mostri:
  - (a)  $\Omega(\mathcal{B})$  è omeomorfo a un sottoinsieme chiuso  $X \subset \sigma(a_1) \times \dots \times \sigma(a_n) \subset \mathbb{C}^n$  (lo spettro congiunto di  $a_1, \dots, a_n$ );
  - (b) esiste un unico \*-isomorfismo  $\rho : C(X) \rightarrow \mathcal{B}$  tale che  $\rho(\iota_k) = a_k$ , dove  $\iota_k \in C(X)$  è la funzione  $\iota_k(\lambda) := \lambda_k$ ,  $k = 1, \dots, n$  (calcolo funzionale continuo congiunto di  $a_1, \dots, a_n$ ).
6. Sia  $A \in M_n(\mathbb{C})$  tale che esista  $\rho : C(\sigma(A)) \rightarrow M_n(\mathbb{C})$  \*-omomorfismo iniettivo unitale tale che  $\rho(\iota) = A$ ,  $\iota(\lambda) = \lambda$ . Mostrare:
  - (a)  $P_\lambda := \rho(\chi_{\{\lambda\}})$ ,  $\lambda \in \sigma(A)$ , è un proiettore, e si ha  $P_\lambda P_\mu = 0$  se  $\lambda \neq \mu$ ;
  - (b) vale

$$\rho(f) = \sum_{\lambda \in \sigma(A)} f(\lambda) P_\lambda, \quad f \in C(\sigma(A)),$$

da cui in particolare  $\mathbb{1} = \sum_{\lambda \in \sigma(A)} P_\lambda$ ,  $A = \sum_{\lambda \in \sigma(A)} \lambda P_\lambda$ ;

- (c)  $P_\lambda$  è il proiettore sull'autospazio di  $A$  associato all'autovalore  $\lambda \in \sigma(A)$ ;
  - (d)  $A$  è diagonalizzabile tramite matrici unitarie.
7. Siano  $\mathcal{A}$  una  $C^*$ -algebra con unità e  $a \in \mathcal{A}$  normale. Verificare che per ogni  $g \in C(\sigma(a))$  e ogni  $f \in C(g(\sigma(a)))$ , si ha  $f(g(a)) = (f \circ g)(a)$ .