

UNIVERSITÀ DI ROMA “TOR VERGATA”

Analisi Matematica II per Ingegneria — Prof. C. Sinestrari

Risposte (sintetiche) ai quesiti degli esercizi del 7.X.2019

1. (a) Ω è aperto, $\partial\Omega = \{0, 1, 2\}$, $\overset{\circ}{\Omega} = \Omega$, $\overline{\Omega} = [0, 1] \cup [2, +\infty)$.
(b) Ω né aperto né chiuso, $\partial\Omega = \{0, 1\}$, $\overset{\circ}{\Omega} = (0, 1)$, $\overline{\Omega} = [0, 1]$.
(c) Ω è chiuso, $\partial\Omega = \{0, 1, 2, 3\}$, $\overset{\circ}{\Omega} = (0, 1) \cup (3, \infty)$, $\overline{\Omega} = \Omega$.
(d) Ω né aperto né chiuso, $\partial\Omega = \overline{\Omega} = \Omega \cup \{0\}$, $\overset{\circ}{\Omega} = \emptyset$.
(e) Ω né aperto né chiuso, $\overset{\circ}{\Omega} = (0, 1) \times (0, 1)$, $\overline{\Omega} = [0, 1] \times [0, 1]$,
 $\partial\Omega = \{(x, y) : 0 \leq x \leq 1, y = 0 \text{ o } y = 1\} \cup \{(x, y) : 0 \leq y \leq 1, x = 0 \text{ o } x = 1\}$, cioè
 $\partial\Omega$ è l'unione dei quattro lati del quadrato.
(f) Ω è chiuso, $\partial\Omega = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 = 1\} \cup \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x \in (1, 3], y = 0\}$,
 $\overset{\circ}{\Omega} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 < 1\}$, $\overline{\Omega} = \Omega$.
(g) Ω né aperto né chiuso, $\partial\Omega = \overline{\Omega} = [0, 1] \times [0, 1]$, $\overset{\circ}{\Omega} = \emptyset$.
(h) Ω né aperto né chiuso, $\partial\Omega = \overline{\Omega} = \Omega \cup \{(x, y) : x = 0, y \in [-1, 1]\}$, $\overset{\circ}{\Omega} = \emptyset$.
2. Se $x_0 \notin \Omega$ è di frontiera per Ω , per definizione ogni suo intorno sferico contiene punti di Ω ; tali punti che sono necessariamente diversi da x_0 stesso perché x_0 non appartiene a Ω . Quindi è soddisfatta la proprietà che definisce i punti di accumulazione. Viceversa, se $x_0 \notin \Omega$ è di accumulazione per Ω , ogni suo intorno sferico contiene punti di Ω (per definizione di punti di accumulazione) e non di Ω (x_0 stesso) quindi è soddisfatta la proprietà di punto di frontiera.
3. Le proprietà seguono facilmente dalle definizioni. Consideriamo ad esempio l'intersezione di due insiemi aperti E_1 ed E_2 , e prendiamo un qualunque $x \in E_1 \cap E_2$. Poiché $x \in E_1$ ed E_1 è aperto, esiste un raggio $r_1 > 0$ tale che l'intorno $I_{r_1}(x)$ è contenuto in E_1 . Analogamente, esiste $r_2 > 0$ tale che $I_{r_2}(x) \subset E_2$. Se chiamiamo r il minimo tra r_1 e r_2 , abbiamo allora che $I_r(x) \subset E_1 \cap E_2$. Poiché ciò vale per un qualunque $x \in E_1 \cap E_2$, concludiamo che $E_1 \cap E_2$ è aperto.

Consideriamo adesso l'intersezione di due insiemi chiusi E_1 ed E_2 . Vogliamo mostrare che $E_1 \cap E_2$ è chiuso, cioè che il suo complementare è aperto. A questo scopo, prendiamo un qualunque x nel complementare di $E_1 \cap E_2$, cioè tale che $x \notin E_1$ e/o $x \notin E_2$. Supponiamo ad esempio che $x \notin E_1$ (nell'altro caso si procede in modo analogo). Essendo E_1 chiuso, il complementare è aperto, quindi esiste $r > 0$ tale che $I_r(x) \cap E_1 = \emptyset$. A maggior ragione abbiamo quindi che $I_r(x)$ è contenuto nel complementare di $E_1 \cap E_2$. Essendo x arbitrario, deduciamo che il complementare di $E_1 \cap E_2$ è aperto, e quindi che $E_1 \cap E_2$ è chiuso.

I risultati sull'unione si dimostrano con considerazioni simili.

4. Per il teorema di permanenza del segno per le funzioni continue, se $\mathbf{x}$ è tale che $f(\mathbf{x}) - c < 0$, allora lo stesso vale per i punti in un intorno di $\mathbf{x}$. Questo significa che l'insieme A_1 è aperto. Un ragionamento simile sulla disuguaglianza opposta mostra che A_2 aperto. Osserviamo infine che C_1 e C_2 sono il complementare di A_2 e A_1 rispettivamente, e quindi sono insiemi chiusi.
5. La dimostrazione è analoga al caso unidimensionale. La funzione f è continua sull'insieme chiuso e limitato D , quindi assume massimo e minimo su D . Se la funzione è costante su D , allora banalmente ogni punto $x_0 \in \overset{\circ}{D}$ soddisfa la tesi. Se la funzione non è costante su D , allora almeno uno tra il massimo e il minimo sarà diverso dal valore costante assunto su ∂D , e quindi sarà raggiunto in un punto $x_0 \in \overset{\circ}{D}$. In tale punto la f ha gradiente nullo per il teorema di Fermat, essendo un punto di massimo/minimo assunto nell'interno di D .
6. La funzione f è continua sull'insieme chiuso e limitato D , quindi assume massimo e minimo su D . Dalle ipotesi sul segno di f segue che il minimo è zero, ed è assunto su tutti i punti di frontiera, mentre il massimo è positivo ed è assunto in uno o più punti interni a D , che quindi devono essere critici per f . Poiché per ipotesi non ci sono punti critici interni di f interni a D oltre a x_0 , l'unica possibilità è che il massimo di f su D cada in x_0 . Essendo x_0 interno a D , esiste un intorno $B_d(x_0)$ contenuto in D , pertanto vale

$$f(x) \leq \max_D f = f(x_0), \quad \forall x \in B_d(x_0),$$

cioè x_0 è un punto di massimo relativo per f .

7. La funzione ha quattro punti critici $P_1 = (0, 0)$, $P_2 = (0, 2)$, $P_3 = (-\sqrt{3}, 3)$, $P_4 = (\sqrt{3}, 3)$. La matrice hessiana ha determinante negativo in P_3, P_4 , che quindi non sono né di massimo né di minimo, mentre ha determinante nullo in P_1, P_2 . Per quanto riguarda P_1 , osserviamo che $f(x, 0) = -3x^4$ ha un massimo stretto per $x = 0$, mentre $f(0, y) = 3y^2 - y^3$ ha un minimo stretto per $y = 0$; il punto quindi non è né di massimo né di minimo. Per studiare P_2 , osserviamo che f cambia segno attraverso le parabole $y = -x^2$, $y = x^2$ e la retta $y = 3$; in ciascuna delle regioni delimitate da queste curve f ha segno costante. Tra questi insiemi, consideriamo quello che contiene P_2 , cioè poniamo

$$D = \{(x, y) : x^2 \leq y \leq 3\}.$$

Si tratta di un insieme chiuso, perché definito da disuguaglianze non strette, e limitato, perché ogni $(x, y) \in D$ soddisfa $|x| \leq \sqrt{3}$ e $|y| \leq 3$. Per come abbiamo definito D , troviamo che $f \geq 0$ su D e $f \equiv 0$ su ∂D . Osserviamo che P_2 è interno a D ed è l'unico punto critico di f appartenente a D . Per il risultato dell'esercizio precedente, concludiamo che P_2 è di massimo relativo per f .

8. Per $(x, y) \neq (0, 0)$ la funzione è di classe C^∞ e le sue derivate parziali prime si calcolano nel modo usuale, trovando:

$$f_x = \frac{y(y^2 - x^2)}{(x^2 + y^2)^2} \quad f_y = \frac{x(x^2 - y^2)}{(x^2 + y^2)^2}.$$

Nel punto $(0,0)$ invece, studiando il limite del rapporto incrementale, si trova

$$f_x(0,0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x,0) - f(0,0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{x \cdot 0}{x^2+0} - 0}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{0}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} 0 = 0.$$

Un calcolo analogo mostra che anche $f_y(0,0)$ esiste e vale zero.

Studiando il limite di $f(x,y)$ su una retta per l'origine $y = ax$, si trova

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x, ax) = \frac{a}{1+a^2}.$$

Poiché il limite è diverso da zero per tutte le rette con $a \neq 0$, concludiamo che la funzione non è continua.

La non continuità implica la non differenziabilità. Pertanto f_x e f_y non possono essere continue in $(0,0)$, altrimenti ci sarebbe una contraddizione col teorema del differenziale totale. Ciò si verifica anche direttamente, studiando il limite sulle rette, ad es.

$$\lim_{x \rightarrow 0} f_x(x, ax) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{a(a^2 - 1)}{x(1+a^2)^2} = \pm\infty.$$

9. Presa una qualunque direzione $v = (a, b) \in \mathbb{R}^2$, si trova

$$\frac{\partial f}{\partial v} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(at, bt) - f(0,0)}{t} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{a^3 bt}{a^6 t^4 + b^2} = 0.$$

D'altra parte, studiando il limite lungo la curva $y = ax^3$, troviamo

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x, x^3) = \frac{1}{2} \neq f(0,0),$$

quindi f non è continua.

10. La funzione di una variabile $\alpha \rightarrow \sqrt{\alpha}$ è continua per $\alpha \in [0, +\infty)$ e derivabile per $\alpha \in (0, +\infty)$. Poiché $x^2 + y^2 \geq 0$ per ogni (x, y) ed è nullo solo per $(x, y) = (0, 0)$, deduciamo che $f(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}$ è continua in tutto $\mathbb{R}^2$ e derivabile in tutto $\mathbb{R}^2$ tranne eventualmente $(0, 0)$. Uno studio diretto del rapporto incrementale mostra che le derivate parziali di f in $(0, 0)$ non esistono.

Osserviamo che $f(x, y)$ coincide con $\|(x, y)\|$, la norma del vettore (x, y) . Allora, presi due punti qualunque $v_1 = (x_1, y_1)$ e $v_2 = (x_2, y_2)$ troviamo, usando la disuguaglianza triangolare soddisfatta dalla norma dei vettori:

$$\begin{aligned} f(tv_1 + (1-t)v_2) &= \|tv_1 + (1-t)v_2\| \leq \|tv_1\| + \|(1-t)v_2\| \\ &= t\|v_1\| + (1-t)\|v_2\| = tf(v_1) + (1-t)f(v_2), \end{aligned}$$

che è la disuguaglianza richiesta per la convessità.

11. Una funzione convessa di classe C^1 su C soddisfa, per ogni $x, y \in C$, la disuguaglianza

$$f(y) \geq f(x) + \langle \nabla f(x), y - x \rangle.$$

Pertanto, se x è un punto critico, vale $f(y) \geq f(x)$ per ogni $y \in C$, cioè x è un punto di minimo assoluto.

12. Sia C un intorno sferico di x_0 tale che $\nabla^2 f(x)$ sia semidefinito positivo per tutti gli $x \in C$. Allora f è convessa su C . Per il risultato dell'esercizio precedente, un punto critico è anche di minimo (assoluto su C , quindi locale su $\mathbb{R}^n$).

La f proposta è tale che $(0, 0)$ è un punto critico. L'hessiano è la matrice diagonale con autovalori $12x^2$ e $2 - 12y^2$. Poiché $12x^2 \geq 0$ per ogni $x \in \mathbb{R}$, e $2 - 12y^2 \geq 0$ per ogni y con $|y| \leq 1/\sqrt{6}$, abbiamo che $\nabla^2 f$ è semidefinito positivo in un intorno di $(0, 0)$. Il criterio appena dimostrato ci dice che $(0, 0)$ è un punto di minimo locale.

13. Ricordiamo che il determinante e la traccia sono rispettivamente il prodotto e la somma degli autovalori dell'hessiano. Se $n > 2$, è possibile trovare n numeri che abbiano somma e prodotto positivo, ma che non siano tutti positivi. Un semplice esempio, con $n = 3$, sono i numeri $-1, -1, 3$. Basta quindi costruire una funzione $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ che abbia un punto critico con hessiano avente questi numeri come autovalori: ad esempio la funzione $f(x, y, z) = \frac{1}{2}(-x^2 - y^2 + 3z^2)$ nel punto $(0, 0, 0)$.

14. (a) Usando la definizione si vede facilmente che, se ϕ è crescente, un punto di massimo locale per f è di massimo locale anche per g , e lo stesso vale per i minimi locali. Se invece ϕ è decrescente, un punto di massimo per f diventa di minimo per g , e viceversa. Se la monotonia di ϕ non è stretta, l'implicazione inversa potrebbe non valere.

- (b) Le note regole di derivazione per funzioni di una variabile implicano

$$\frac{\partial g}{\partial x}(x, y) = \phi'(f(x, y)) \frac{\partial f}{\partial x}(x, y), \quad \frac{\partial g}{\partial y}(x, y) = \phi'(f(x, y)) \frac{\partial f}{\partial y}(x, y).$$

Quindi, nei punti in cui $\nabla f(x, y) = 0$, si ha anche $\nabla g(x, y) = 0$. Il viceversa può non valere: se in un punto si ha $\nabla f(x, y) \neq 0$ ma $\phi'(f(x, y)) = 0$ allora $\nabla g(x, y) = 0$, quindi il punto è critico per g ma non per f . Se ϕ' non si annulla mai, ciò non si può verificare, e quindi f e g hanno gli stessi punti critici.