

Esercizio 1. Determinare per quali $x \in \mathbb{R}$ la serie

$$\sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{k-1}{k} \right)^{k^2} \frac{k3^k + 2^k e^k}{k^2 x^k (1-x)^k}$$

è convergente.

Sia $z = \frac{1}{x(1-x)}$ e consideriamo la serie di potenze in z .

Raggio di convergenza:

$$|a_k|^{1/k} = \left(\left(\frac{k-1}{k} \right)^{k^2} \frac{k3^k + 2^k e^k}{k^2} \right)^{1/k} = \left(1 - \frac{1}{k} \right)^k \cdot \frac{2e \left(\left(\frac{k3^k}{2^k e^k} \right) + 1 \right)^{1/k}}{k^{2/k}} \rightarrow \frac{1}{e} \cdot 2e \cdot 1 = 2$$

$\xrightarrow{2e > 30}$
 $\xrightarrow{\frac{1}{e}}$
 $\xrightarrow{1}$

da cui $R = 1/2$.

Estremi: per $z = \pm 1/2$ converge assolutamente perché

$$|a_k (\pm 1/2)^k| = \left(1 - \frac{1}{k} \right)^{k^2} \cdot \frac{2^k e^k (1 + o(1))}{k^2} \cdot \frac{1}{2^k}$$

$$= \exp(k^2 \log(1 - \frac{1}{k}) + k) \cdot \frac{1 + o(1)}{k^2} \sim \frac{e^{-1/2}}{k^2} \quad \text{serie convergente}$$

$\hookrightarrow k^2 \left(-\frac{1}{k} - \frac{1}{2k^2} + o\left(\frac{1}{k^2}\right) \right) + k \rightarrow -\frac{1}{2}$


Quindi la serie di potenze converge per $|z| \leq \frac{1}{2}$.

Convergenza rispetto a x :

$$\frac{1}{|x(1-x)|} \leq \frac{1}{2} \Leftrightarrow |x(1-x)| \geq 2$$

$x \neq 0, 1$

$$\Leftrightarrow x \in (-\infty, -1] \cup [2, +\infty)$$



Esercizio 2. Sia $f(x, y) = e^{xy}$.

(a) Determinare i punti stazionari di f stabilendo per ciascuno di essi se si tratta di un punto di massimo relativo, di minimo relativo o di sella.

(b) Determinare il valore massimo e il valore minimo di f in

$$D = \{(x, y) : 0 \leq y \leq x + \sqrt{2}, x^2 + 4y^2 \leq 8\}.$$

(c) Determinare un rettangolo $R \subset \mathbb{R}^2$ tale che il valore massimo di f in R è 1 mentre il valore è minimo $1/e$.

$$(a) \quad \nabla f(x, y) = (ye^{xy}, xe^{xy})$$

$$\begin{cases} ye^{xy} = 0 \\ xe^{xy} = 0 \end{cases} \Rightarrow (0, 0) \text{ unico punto stazionario}$$

$$H_f(x, y) = \begin{bmatrix} y^2 e^{xy} & e^{xy} + xy e^{xy} \\ e^{xy} + xy e^{xy} & x^2 e^{xy} \end{bmatrix} \Rightarrow H_f(0, 0) = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\det H = -1 < 0$$


(0,0) è un PUNTO DI SELLA

$$(b) \quad D = \left\{ 0 \leq y \leq x + \sqrt{2}, \frac{x^2}{(2\sqrt{2})^2} + \frac{y^2}{(\sqrt{2})^2} \leq 1 \right\}$$

D è compatta e f è C^∞ in $\mathbb{R}^2$.

Dato che f non ha punti stazionari interni a D , i punti di max/min sono sul bordo:


$$\partial D = \Gamma_1 \cup \Gamma_2 \cup \Gamma_3.$$



$$\Gamma_1 = \{(x, 0) : x \in [-\sqrt{2}, 2\sqrt{2}]\}, \quad \boxed{f(x, 0) = 1 \text{ costante}}$$

$$\Gamma_2 = \{(x, x + \sqrt{2}) : x \in (-\sqrt{2}, 0]\},$$

$$f(x, x + \sqrt{2}) = e^{x(x + \sqrt{2})}$$



$$\text{con } \boxed{f(-\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}) = \frac{1}{\sqrt{e}}} \text{ e } \boxed{f(0, \sqrt{2}) = 1}$$

$$\Gamma_3 = \{(x, y) : x^2 + 4y^2 = 8, x > 0, y > 0\}$$

Moltiplicatore di Lagrange con vincolo
 $g(x, y) = x^2 + 4y^2 - 8 = 0$.

$$\nabla g = (2x, 8y) = (0, 0) \Leftrightarrow (x, y) = (0, 0) \notin \Gamma_3$$

tutti i punti di Γ_3 sono regolari.

$$\begin{cases} y e^{xy} = \lambda 2x \cdot x \\ x e^{xy} = \lambda 8y \cdot y \\ x^2 + 4y^2 = 8 \end{cases} \xrightarrow{+} \begin{cases} \lambda 2x^2 = \lambda 8y^2 \\ 2\lambda(x^2 - 4y^2) = 0 \\ x^2 = 4y^2 \rightarrow x = \pm 2y \end{cases}$$

$$\begin{cases} x = \pm 2y \\ (\pm 2y)^2 + 4y^2 = 8 \rightarrow y^2 = 1 \rightarrow y = \pm 1 \end{cases} \quad \begin{matrix} x = \pm 2 \\ y = \pm 1 \end{matrix} \quad (2, 1) \in \Gamma_3$$

Punto stazionario vincolato: $(2, 1)$ con $f(2, 1) = e^2$


Confrontando i valori si ha che

$$\max_D f(x, y) = e^2 \text{ e } \min_D f(x, y) = \frac{1}{\sqrt{e}}$$

(c) Disegniamo le curve di livello 1 e $1/e$

$$e^{xy} = 1 \Leftrightarrow x = 0 \vee y = 0$$

$$e^{xy} = \frac{1}{e} \Leftrightarrow y = -\frac{1}{x}$$



Il rettangolo $R = [0, 1] \times [0, -1]$ soddisfa le richieste:

$$\forall (x, y) \in R \quad f(1, -1) = e^{-1} \leq e^{xy} \leq e^0 = f(0, 0) = 1.$$

$-1 \leq xy \leq 0$

Esercizio 3. Calcolare

(a) $\iiint_D |x-1| dx dy dz$

(b) $\iiint_D \frac{x(1-y)+z}{4+x^2+y^2+z^2} dx dy dz$

dove $D = \{(x, y, z) : x \geq 0, z \geq 0, x^2 + y^2 + z^2 \leq 4\}$.

(a) $\iiint_D |x-1| dx dy dz$

$$= \int_{x=0}^2 |x-1| \left(\iint_{\substack{y^2+z^2 \leq 4-x^2 \\ z \geq 0}} dy dz \right) dx = \int_0^2 |x-1| \cdot \left(\frac{\pi}{2} (4-x^2) \right) dx$$

semicerchio di raggio $\sqrt{4-x^2}$ Area

$$= \frac{\pi}{2} \left(\int_0^1 (1-x)(4-x^2) dx - \int_1^2 (1-x)(4-x^2) dx \right)$$

$4-4x-x^2+x^3 \xrightarrow{\int} 4x-2x^2-\frac{x^3}{3}+\frac{x^4}{4}$

$$= \frac{\pi}{2} \left(2 \left(4 - \cancel{2} - \frac{1}{3} + \frac{1}{4} \right) - 0 - \left(8 - \cancel{8} - \frac{8}{3} + \cancel{4} \right) \right) = \frac{15\pi}{12} = \boxed{\frac{5\pi}{4}}$$

(b) $\iiint_D \frac{x - xy + z}{4+x^2+y^2+z^2} dx dy dz = \iiint_D \frac{x+z}{4+x^2+y^2+z^2} dx dy dz$

*$\uparrow$ y-dimensione
 $\downarrow$ simmetrico rispetto a $y=0$*

$$\stackrel{CS}{=} \int_{\rho=0}^2 \int_{\varphi=0}^{\pi/2} \int_{\theta=-\pi/2}^{\pi/2} \frac{\rho \cos \theta \sin \varphi + \rho \cos \varphi}{4+\rho^2} \cdot \rho^2 \sin \varphi d\varphi d\theta d\rho$$

$$= \int_{\rho=0}^2 \frac{\rho^3}{4+\rho^2} d\rho \cdot \left(\int_{\varphi=0}^{\pi/2} \sin^2 \varphi d\varphi \int_{\theta=-\pi/2}^{\pi/2} \cos \theta d\theta + \pi \int_{\varphi=0}^{\pi/2} \sin \varphi \cos \varphi d\varphi \right)$$

$\rho = \frac{4\rho}{4+\rho^2}$

$$= \left[\frac{\rho^2}{2} - 2 \log(4+\rho^2) \right]_0^2 \cdot \left(\frac{\pi}{4} \cdot [\sin \theta]_{-\pi/2}^{\pi/2} + \pi \left[\frac{\sin^2 \varphi}{2} \right]_0^{\pi/2} \right)$$

$$= (2 - 2 \log 2) \cdot \left(\frac{\pi}{4} \cdot 2 + \frac{\pi}{2} \right) = \boxed{2\pi(1 - \log 2)}$$

Esercizio 4. Calcolare $\iint_S \langle \text{rot}(\mathbf{F}), d\mathbf{S} \rangle$ sia direttamente che usando il teorema del rotore, dove

$$\mathbf{F}(x, y, z) = (4y + xz, e^y, xy + z^2)$$

e S è la superficie

$$S = \{(x, y, z) : x^2 + 2y^2 + 2z = 4, z \geq 1\}.$$

S è orientata in modo che il versore normale in $(0, 0, 2)$ sia $\mathbf{n} = (0, 0, -1)$.

Calcolo diretto:

$$\text{rot}(\vec{F}) = \begin{bmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ 4y+xz & e^y & xy+z^2 \end{bmatrix} = (x, x-y, -4).$$

Parametrizzazione (cartesiana) di S :

$$x^2 + 2y^2 = 4 - 2z \leq 4 - 2 = 2$$

$$\frac{x^2}{2} + y^2 \leq 1$$

$\vec{\sigma}(x, y) = (x, y, 2 - \frac{x^2}{2} - y^2)$ con $A = \{(x, y) : x^2 + 2y^2 \leq 2\}$
con $\vec{\sigma}_x \times \vec{\sigma}_y = (-f_x, -f_y, 1) = (x, 2y, 1)$

che induce l'orientazione su S tale che in $(0, 0, 2)$, $\vec{m} = (0, 0, 1)$ opposta a quella data.

$$\iint_S \langle \text{rot}(\vec{F}), d\vec{S} \rangle = - \iint_A \langle (x, x-y, -4), (x, 2y, 1) \rangle dx dy$$

$$= - \iint_{\{x^2 + 2y^2 \leq 2\}} (x^2 + 2xy - 2y^2 - 4) dx dy$$

$\{x^2 + 2y^2 \leq 2\} \rightarrow$ simmetrico rispetto a $x=0$

$$\begin{cases} x = \sqrt{2} \rho \cos \theta \\ y = \rho \sin \theta \end{cases} \Rightarrow - \int_{\theta=0}^{2\pi} \int_{\rho=0}^1 (2\rho^2 \cos^2 \theta - 2\rho^2 \sin^2 \theta - 4) \sqrt{2} \rho d\rho d\theta$$

$$= -2\sqrt{2} \cdot \pi \left[\frac{\rho^4}{4} \right]_0^1 + 2\sqrt{2} \pi \left[\frac{\rho^4}{4} \right]_0^1 + 4\sqrt{2} \cdot 2\pi \cdot \left[\frac{\rho^2}{2} \right]_0^1 = 4\sqrt{2} \pi$$

Con il teorema del rotore:

$$\iint_S \langle \text{rot}(\vec{F}), d\vec{S} \rangle = \int_{\gamma^-} \langle \vec{F}, d\vec{s} \rangle = - \int_{\gamma} \langle \vec{F}, d\vec{s} \rangle$$

dove l'ellisse $\gamma = \partial S$ è orientata in senso orario:

$$\vec{r}(t) = (\sqrt{2} \cos t, \sin t, 1) \quad \text{con } t \in [0, 2\pi],$$

$$= - \int_0^{2\pi} \langle (\underbrace{4y}_{\sin t} + \underbrace{xz}_{\sqrt{2} \cos t}, e^{\underbrace{x}_{\sin t}}, \underbrace{xy + z^2}_{\sin t}), \underbrace{(-\sqrt{2} \sin t, \cos t, 0)}_{\vec{r}'(t)} \rangle dt$$

$$= \int_0^{2\pi} (4\sqrt{2} \sin^2 t + 2 \sin t \cos t - e^{\sin t} \cos t) dt$$

$$= 4\sqrt{2} \cdot \pi + \left[\sin^2(t) \right]_0^{2\pi} - \left[e^{\sin t} \right]_0^{2\pi} = 4\sqrt{2} \pi + 0 + 0 = \boxed{4\sqrt{2} \pi}$$