

ANALISI MATEMATICA - LEZIONE 18

ESEMPI

- Calcolare T_5 di $\operatorname{tg}(x)$ in $x_0=0$.

Invece di fare il calcolo diretto determiniamo T_5 utilizzando gli sviluppi noti di $\sin(x)$ e $\cos(x)$:

$$\begin{aligned}\operatorname{tg}(x) &= \frac{\sin(x)}{\cos(x)} = \frac{x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + O(x^5)}{1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + O(x^4)} \\&= \left(x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + O(x^5)\right) (1 - t)^{-1} \quad t = \frac{x^2}{2!} - \frac{x^4}{4!} + O(x^4) \rightarrow 0 \\&= (\dots) (1 + t + t^2 + O(t^2)) \\&= (\dots) \left(1 + \left(\frac{x^2}{2!} - \frac{x^4}{4!} + O(x^4)\right) + \left(\frac{x^2}{2!} - \frac{x^4}{4!} + O(x^4)\right)^2 + O((x^2)^2)\right) \\&= (\dots) \left(1 + \frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{24} + \frac{x^4}{4} + O(x^4)\right) \\&= \left(x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} + O(x^5)\right) \cdot \left(1 + \frac{x^2}{2} + \frac{5x^4}{24} + O(x^4)\right) \\&= x + x^3 \left(-\frac{1}{6} + \frac{1}{2}\right) + x^5 \left(\frac{1}{120} - \frac{1}{6 \cdot 2} + \frac{5}{24}\right) + O(x^5) \\&\quad \frac{-1+3}{6} = \frac{1}{3} \quad \frac{1-10+25}{120} = \frac{16}{120} = \frac{2}{15} \\&= x + \frac{x^3}{3} + \frac{2x^5}{15} + O(x^5).\end{aligned}$$

Per l'unicità di T_5 segue che

$$T_5(x) = x + \frac{x^3}{3} + \frac{2x^5}{15}.$$

$$\bullet \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{tg}(x) + \operatorname{arctg}(x) - 2x}{x \log(1+x^2) - x^3} = ?$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cancel{x} + \cancel{\frac{x^3}{3}} + \frac{2x^5}{15} + \cancel{x} - \cancel{\frac{x^3}{3}} + \frac{x^5}{5} - \cancel{2x} + o(x^5)}{x \left(\cancel{x^2} - \frac{x^4}{2} + o(x^4) \right) - \cancel{x^3}}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{3}x^5 + o(x^5)}{-\frac{1}{2}x^5 + o(x^5)} = -\frac{2}{3}.$$

$$\bullet \text{ Calcolare } T_3 \text{ di } \frac{\sqrt{1-x^2}}{\sin(2x) + e^{-x}} \text{ in } x_0 = 0.$$

$$(\sin(2x) + e^{-x})^{-1}$$

$$= \left(2x - \frac{(2x)^3}{3!} + o(x^3) + 1 + (-x) + \frac{(-x)^2}{2!} + \frac{(-x)^3}{3!} + o(x^3) \right)^{-1}$$

$$= \left(1 + x + \frac{x^2}{2} - \frac{3x^3}{2} + o(x^3) \right)^{-1}$$

$$\underbrace{\hspace{10em}}_{=t \rightarrow 0} (1+t)^{-1} = 1 - t + t^2 - t^3 + o(t^3)$$

$$= 1 - \left(x + \frac{x^2}{2} - \frac{3x^3}{2} + o(x^3) \right) + \left(x^2 + x^3 + o(x^3) \right) - \left(x^3 + o(x^3) \right)$$

$$= 1 - x + x^2 \left(\underbrace{-\frac{1}{2} + 1}_{\frac{1}{2}} \right) + x^3 \left(\frac{3}{2} + \cancel{1} - \cancel{1} \right) + o(x^3)$$

Con

$$\sqrt{1-x^2} \cdot (\sin(2x) + e^{-x})^{-1}$$

$$= \left(1 - \frac{x^2}{2} + o(x^3) \right) \left(1 - x + \frac{x^2}{2} + \frac{3x^3}{2} + o(x^3) \right)$$


$$= 1 - x + \frac{x^2}{2} + \frac{3x^3}{2} - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{2} + o(x^3)$$

$$= 1 - x + 2x^3 + o(x^3).$$

$$\text{Quindi: } T_3(x) = 1 - x + 2x^3.$$

- Tracciare il grafico di $f(x) = (x-3)e^{\arctg(x)}$

f è continua nel dominio $D = \mathbb{R}$.

Seguo di f 

$$\lim_{x \rightarrow \pm \infty} (x-3)e^{\arctg(x)} = \pm \infty$$

Asintoto per $x \rightarrow +\infty$, $\arctg x + \arctg \frac{1}{x} = \begin{cases} \frac{\pi}{2} & \text{se } x > 0 \\ -\frac{\pi}{2} & \text{se } x < 0 \end{cases}$

$$f(x) = (x-3)e^{\arctg(x)} = (x-3)e^{\frac{\pi}{2} - \arctg(\frac{1}{x})}$$

$$= e^{\frac{\pi}{2}}(x-3)e^{-\frac{1}{x} + o(\frac{1}{x})} = e^{\frac{\pi}{2}}(x-3)\left(1 - \frac{1}{x} + o\left(\frac{1}{x}\right)\right)$$


$$= e^{\frac{\pi}{2}}\left(x-3-1+\frac{3}{x}+o(1)\right) = e^{\frac{\pi}{2}}(x-4)+o(1).$$

Quindi l'asintoto per $x \rightarrow +\infty$ è $y = e^{\frac{\pi}{2}}(x-4)$.

In modo simile si trova che l'asintoto per $x \rightarrow -\infty$ è $y = e^{-\frac{\pi}{2}}(x-4)$.

Derivata prima: per $x \in \mathbb{R}$

$$\begin{aligned} f'(x) &= e^{\arctg(x)} + (x-3)e^{\arctg(x)} \cdot \frac{1}{1+x^2} \\ &= e^{\arctg(x)} \cdot \frac{x^2+x-2}{1+x^2} \leftarrow (x-1)(x+2) \end{aligned}$$





Derivata seconda: per $x \in \mathbb{R}$

$$f''(x) = \frac{e^{\arctg(x)}(x^2+x-2)}{1+x^2} + e^{\arctg(x)} \frac{(2x+1)(1+x^2) - (x^2+x-2)2x}{(1+x^2)^2}$$

$2x+1 + \cancel{2x^3} + x^2 - \cancel{2x^3} - 2x^2 + 4x$

$$= \frac{e^{\arctg(x)}}{(1+x^2)^2} \cdot (x^2+x-2 - x^2 + 6x+1)$$

$7x-1$



- Determinare il numero di soluzioni di

$$x = \log(|x-m|)$$
 al variare di $m \in \mathbb{R}$.

Consideriamo la funzione


$$f(x) = x - \log(|x-m|)$$

f è continua in $(-\infty, m) \cup (m, +\infty)$. Inoltre

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \pm\infty, \quad \lim_{x \rightarrow m^\pm} f(x) = +\infty$$

Derivate prima: per $x \neq m$:

$$f'(x) = 1 - \frac{1}{|x-m|} \cdot \left(\frac{|x-m|^\pm 1}{x-m} \right) = 1 - \frac{1}{x-m} = \frac{x-(m+1)}{x-m}$$



1) f è strett. crescente in $(-\infty, m)$ e $f((-\infty, m)) = \mathbb{R}$

2) f è strett. decrescente in $(m, m+1]$ e

$$f((m, m+1]) = [f(m+1), +\infty) = [m+1, +\infty)$$


3) f è strett. crescente in $[m+1, +\infty)$ e

$$f([m+1, +\infty)) = [f(m+1), +\infty) = [m+1, +\infty)$$

Quindi $x = \log(|x-m|)$ ossia $f(x) = 0$ ha

$$\begin{cases} 3 \text{ soluzioni se } m < -1 \\ 2 \text{ soluzioni se } m = -1 \\ 1 \text{ soluzione se } m > -1 \end{cases}$$

- Per costruire una scatola senza coperchio si ritagliamo 4 quadrati uguali dagli angoli di un quadrato di lato 1.



Qual è la scatola di volume massimo?


Il lato x dei quadrati da tagliare può variare nell'intervallo $[0, \frac{1}{2}]$ in modo che $1-2x \geq 0$.

Il volume della scatola è

$$V(x) = (1-2x)^2 \cdot x.$$

Dato che

$$\begin{aligned} V'(x) &= 2(1-2x) \cdot (-2)x + (1-2x)^2 \\ &= (1-2x)(-4x + 1 - 2x) \\ &= (1-2x)(1-6x) \end{aligned}$$



Quindi la scatola di volume massimo ha dimensioni $\frac{2}{3} \times \frac{2}{3} \times \frac{1}{6}$ e $V_{\max} = V(\frac{1}{6}) = \frac{2}{27}$.

Si noti che $V(0) = V(\frac{1}{2}) = 0$.