


ANALISI MATEMATICA 2 - FOGLIO 7

1.a Calcolare $\int_{\gamma} \langle \vec{F}, d\vec{s} \rangle$ dove $\vec{F} = ((x^2 + y^2)e^x, ye^x)$

e γ è il quadrilatero di vertici $(0,0)$, $(2,0)$, $(3,1)$, $(1,1)$ percorso in senso orario.



Il percorso γ è il bordo di

$$D = \{(x,y) : y \leq x \leq y+2, y \in [0,1]\}$$

e dunque per la formula di Gauss-Green

$$\int_{\gamma} \langle \vec{F}, d\vec{s} \rangle = - \int_{\partial D} \langle \vec{F}, d\vec{s} \rangle \stackrel{GG}{=} - \iint_D \left(\frac{\partial F_2}{\partial x} - \frac{\partial F_1}{\partial y} \right) dx dy$$

$$= - \iint_D (ye^x - 2ye^x) dx dy = \int_{y=0}^1 y \left(\int_{x=y}^{y+2} e^x dx \right) dy$$

$$= \int_0^1 y (e^{y+2} - e^y) dy = (e^2 - 1) \int_0^1 ye^y dy$$


$$= (e^2 - 1) [e^y(y-1)]_0^1 = e^2 - 1.$$

1.b Calcolare $\int_{\gamma} \langle \vec{F}, d\vec{s} \rangle$ dove

$$\vec{F} = \left(\frac{x+3y}{(1+x)^2}, 3y^2 \log(1+x+y+xy) \right)$$

(1+x)(1+y)

e γ è il bordo di $D = [0, 2] \times [0, 1]$
percorso in senso antiorario.



Notiamo che il dominio di $\vec{F}$ contiene D e
possiamo applicare la formula di Gauss-Green

$$\begin{aligned} \int_{\gamma} \langle \vec{F}, d\vec{s} \rangle &= \int_{\partial D} \langle \vec{F}, d\vec{s} \rangle \stackrel{GG}{=} \iint_D \left(\frac{\partial F_2}{\partial x} - \frac{\partial F_1}{\partial y} \right) dx dy \\ &= \int_{x=0}^2 \int_{y=0}^1 \left(\frac{3y^2}{1+x} - \frac{3}{(1+x)^2} \right) dx dy \\ &= \int_{x=0}^2 \left(\frac{3}{1+x} \left[\frac{y^3}{3} \right]_0^1 - \frac{3}{(1+x)^2} [y]_0^1 \right) dx \\ &= \left[\log(1+x) + \frac{3}{1+x} \right]_0^2 = \log 3 + 1 - 3 = \log 3 - 2. \end{aligned}$$

1.c Calcolare $\int_{\gamma} \langle \vec{F}, d\vec{s} \rangle$ dove


$$\vec{F} = \left(-7yx^2, (\sqrt{y}+x)y^2 \right)$$

e γ è il bordo di

$$D = \{ (x, y) : x^2 + y^2 \leq 2y \}$$

$x^2 + (y-1)^2 \leq 1$

percorso in senso antiorario.



$$\int_{\gamma} \langle \vec{F}, d\vec{s} \rangle = \int_{\partial D} \langle \vec{F}, d\vec{s} \rangle \stackrel{GG}{=} \iint_D \left(\frac{\partial F_2}{\partial x} - \frac{\partial F_1}{\partial y} \right) dx dy$$

$$\begin{aligned}
& x = \rho \cos \theta \\
& y = 1 + \rho \sin \theta \\
& = \iint_D (y^2 + 7x^2) dx dy \stackrel{CP}{=} \int_{\theta=0}^{2\pi} \int_{\rho=0}^1 ((1 + \rho \sin \theta)^2 + 7(\rho \cos \theta)^2) \rho d\rho d\theta \\
& = \int_0^{2\pi} \left(\int_0^1 (\rho + 2\rho^2 \sin \theta + \overbrace{\rho^3(1+6\cos^2 \theta)}^{\theta\text{-disponi}}) d\rho \right) d\theta \\
& = \int_0^{2\pi} \left[\frac{\rho^2}{2} + \frac{\rho^4}{4} (1 + 6\cos^2 \theta) \right]_0^1 d\theta = \int_0^{2\pi} \left(\frac{3}{4} + \frac{3}{2} \cos^2 \theta \right) d\theta \\
& = \frac{3}{4} \cdot 2\pi + \frac{3}{2} \cdot \pi = 3\pi.
\end{aligned}$$


1.d Calcolare $\int_{\vec{r}} \langle \vec{F}, d\vec{s} \rangle$ dove

$$\vec{F} = (\sin x + 2y, (x+1)^2 + \cos y)$$

dove γ è il bordo di

$$D = \{(x, y) : (y-3)^2 \leq x \leq 9-y^2\}$$


percorso in senso antiorario.



$$\begin{aligned}
\int_{\vec{r}} \langle \vec{F}, d\vec{s} \rangle &= \int_{\partial D} \langle \vec{F}, d\vec{s} \rangle \stackrel{G}{=} \iint_D \left(\frac{\partial F_2}{\partial x} - \frac{\partial F_1}{\partial y} \right) dx dy \\
&= \iint_D (2(x+1) - 2) dx dy = \int_{y=0}^3 \left(\int_{(y-3)^2}^{9-y^2} 2x dx \right) dy \\
&= \int_0^3 ((9-y^2)^2 - (y-3)^4) dy
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& \stackrel{x=3-y}{=} \int_0^3 ((9 - (3-t)^2)^2 - t^4) dt = \left[12t^3 - 3t^4 \right]_0^3 = 81(4-3) = 81. \\
& \quad \quad \quad (9 - 9 + 6t - t^2)^2 = 36t^2 - 12t^3 + t^4
\end{aligned}$$

1.e Calcolare $\int_{\gamma} \langle \vec{F}, d\vec{s} \rangle$ dove
 $\vec{F} = (e^{-x^2}y, 4x^3 + \log(1+y))$
 dove γ è il bordo di $D = \{(x,y) : 16x^2 + y^2 \leq 16, x \geq 0, y \geq 0\}$
 percorso in senso antiorario.




$$\begin{aligned} \int_{\gamma} \langle \vec{F}, d\vec{s} \rangle &= \int_{\partial D} \langle \vec{F}, d\vec{s} \rangle \stackrel{GG}{=} \iint_D \left(\frac{\partial F_2}{\partial x} - \frac{\partial F_1}{\partial y} \right) dx dy \\ &= \iint_D (12x^2 + 1) dx dy \stackrel{\substack{x=u \\ y=4v}}{=} \iint_{\substack{u^2+v^2 \leq 1 \\ u,v \geq 0}} (12u^2 + 1) \cdot 4 du dv \\ &\stackrel{CP}{=} 4 \cdot 12 \int_{\rho=0}^1 \int_{\theta=0}^{\pi/2} \rho^2 \cos^2 \theta \rho d\rho d\theta + 4 \cdot \frac{\pi}{4} \\ &= 4 \cdot 12 \cdot \frac{\pi}{4} \cdot \left[\frac{\rho^4}{4} \right]_0^1 + \pi = 3\pi + \pi = 4\pi. \end{aligned}$$

1.f Calcolare $\int_{\gamma} \langle \vec{F}, d\vec{s} \rangle$ dove

$$\vec{F} = \left(\frac{x+y^2}{1+x^2}, y^2 + y \arctan(x) \right)$$

e γ è l'unione dei segmenti da $(-1,0)$ a $(0,1)$ e da $(0,1)$ a $(1,0)$.

In alternativa al calcolo diretto possiamo usare la formula di GG chiudendo γ con il segmento da Q a P.



$$\int_{\gamma} \langle \vec{F}, d\vec{s} \rangle \stackrel{\text{Goursat}}{=} - \iint_D \left(\frac{\partial F_2}{\partial x} - \frac{\partial F_1}{\partial y} \right) dx dy - \int_{[Q,P]} \langle \vec{F}, d\vec{s} \rangle$$

$$= - \iint_D \left(\frac{y}{1+x^2} - \frac{2y}{1+x^2} \right) dx dy + \int_{-1}^1 F_1(t, 0) dt$$

$$= \iint_D \frac{y}{1+x^2} dx dy + \int_{-1}^1 \frac{t}{1+t^2} dt$$

simmetrico
per x=0 →

$$= 2 \int_{x=0}^1 \frac{1}{1+x^2} \left(\int_{y=0}^{1-x} y dy \right) dx + 0 = 2 \int_0^1 \frac{1}{1+x^2} \left[\frac{y^2}{2} \right]_0^{1-x} dx$$

$$= \int_0^1 \frac{1+x^2-2x}{1+x^2} dx = 1 - \left[\log(1+x^2) \right]_0^1 = 1 - \log 2.$$


1.8 Calcolare $\int_{\gamma} \langle \vec{F}, d\vec{s} \rangle$ dove $\vec{F} = \left(\frac{x-y}{x^2+y^2}, \frac{x+y}{x^2+y^2} \right)$

e $\vec{\gamma}(t) = (\sqrt{2} \cos t, 1 + \sqrt{2} \sin t)$, $t \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{5\pi}{4} \right]$.

γ è l'arco di una circonferenza centrata in $(0, 1)$ e raggio $\sqrt{2}$.

$$P = \vec{\gamma}\left(-\frac{\pi}{2}\right) = (0, 1 - \sqrt{2})$$

$$Q = \vec{\gamma}\left(\frac{5\pi}{4}\right) = (-1, 0)$$



Consideriamo $\vec{F} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2$ con

$\vec{F}_1 = \left(\frac{x}{x^2+y^2}, \frac{y}{x^2+y^2} \right)$ conservativo in $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$
e con potenziale $U_1(x, y) = \log(\sqrt{x^2+y^2})$

$\vec{F}_2 = \left(\frac{-y}{x^2+y^2}, \frac{x}{x^2+y^2} \right)$ irrotazionale in $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$.

Allora

$$\int_{\gamma} \langle \vec{F}_1, d\vec{s} \rangle = U_1(Q) - U_1(P) = \log(1) - \log(\sqrt{2}-1).$$

Per $\vec{F}_2$ chiudiamo γ in modo che il percorso non si avvolga intorno a $(0,0)$ e che sia composto da segmenti radiali e archi di circonferenze centrate in $(0,0)$ (così il calcolo è più agevole).

Ad esempio consideriamo D tale che

$$\partial^+ D = \gamma \cup [Q, R] \cup \gamma_2^-$$

con $R = (1-\sqrt{2}, 0)$ e

$$\gamma_2^-(t) = (\sqrt{2}-1) \cdot (\cos t, \sin t) \quad \text{per } t \in [-\frac{\pi}{2}, \pi].$$

Così dato che $\vec{F}_2$ è irrotazionale in D per GG,

$$\begin{aligned} \int_{\gamma} \langle \vec{F}_2, d\vec{s} \rangle &\stackrel{GG}{=} \iint_D 0 \, dx \, dy - \int_{[Q,R] \cup \gamma_2^-} \langle \vec{F}_2, d\vec{s} \rangle \\ &= - \int_{[Q,R]} \langle \vec{F}_2, d\vec{s} \rangle + \int_{\gamma_2^-} \langle \vec{F}_2, d\vec{s} \rangle \\ &= \int_{-\pi/2}^{\pi} \frac{(\sqrt{2}-1)^2}{(\sqrt{2}-1)^2} dt = \pi - \left(-\frac{\pi}{2}\right) = \frac{3\pi}{2}. \end{aligned}$$

Si conclude che


$$\begin{aligned} \int_{\gamma} \langle \vec{F}, d\vec{s} \rangle &= \int_{\gamma} \langle \vec{F}_2, d\vec{s} \rangle + \int_{\gamma} \langle \vec{F}_1, d\vec{s} \rangle \\ &= -\log(\sqrt{2}-1) + \frac{3\pi}{2}. \end{aligned}$$

1.R Calcolare $\int_{\gamma} \langle \vec{F}, d\vec{s} \rangle$ dove

$$\vec{F} = \left(3y + \frac{8x}{(x^2+y^2)^2}, \frac{8y}{(x^2+y^2)^2} \right)$$

e $\gamma(t) = (1+t) \cdot (\cos(2\pi t), \sin(2\pi t))$, $t \in [0, 1]$.

Si noti che $\|\gamma(t)\| = 1+t > 0$ per $t \in [0, 1]$ e quindi la curva γ non passa per $(0,0)$ dove $\vec{F}$ non è definito.



Poniamo $\vec{F} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2$ dove $\vec{F}_1 = (3y, 0)$ e $\vec{F}_2 = \left(\frac{8x}{(x^2+y^2)^2}, \frac{8y}{(x^2+y^2)^2} \right)$. $\vec{F}_2$ è conservativo con potenziale $U_2(x, y) = \frac{-4}{x^2+y^2}$ per $(x, y) \neq (0, 0)$.

Quindi

$$\int_{\gamma} \langle \vec{F}_2, d\vec{s} \rangle = U_2(\gamma(1)) - U_2(\gamma(0)) = \frac{-4}{2^2+0^2} + \frac{4}{1^2+0^2} = 3.$$

Per $\vec{F}_1$ in alternativa al calcolo diretto applichiamo GG chiudendo il percorso con il segmento da $(2,0)$ a $(0,1)$.

$$\int_{\gamma} \langle \vec{F}_2, d\vec{s} \rangle = \iint_D \left(\frac{\partial(0)}{\partial x} - \frac{\partial(3y)}{\partial y} \right) dx dy - \int_{[2,1]} \langle (3y, 0), d\vec{s} \rangle$$

$$= -3|D| - 0 = -3 \cdot \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} r^2(\theta) d\theta$$

$$r(\theta) = 1 + \frac{\theta}{2\pi} \downarrow = -\frac{3}{2} \left[\frac{1}{3} \left(1 + \frac{\theta}{2\pi} \right)^3 \cdot 2\pi \right]_0^{2\pi} = -\pi(8-1) = -7\pi.$$

Così

$$\int_{\gamma} \langle \vec{F}, d\vec{s} \rangle = \int_{\gamma} \langle \vec{F}_1, d\vec{s} \rangle + \int_{\gamma} \langle \vec{F}_2, d\vec{s} \rangle = -7\pi + 3.$$

1.i

Calcolare $\int_{\gamma} \langle \vec{F}, d\vec{s} \rangle$ dove

$$\vec{F} = (6y^2 + y^2 e^x - 4y, 2y e^x)$$

e γ è l'arco di circonferenza da $(-1, 1)$ a $(0, 0)$ passante per $(0, 2)$.


Intanto osserviamo che

$$\vec{F} = \nabla U + (6y^2 - 4y, 0) \text{ con } U(x, y) = y^2 e^x.$$

Consideriamo anche la
spezzata $\vec{\gamma}_2 = [P, Q] \cup [Q, O]$
con

$$[P, Q] : [-1, 0] \ni t \rightarrow (t, 1)$$

$$[Q, O] : [1, 0] \ni t \rightarrow (0, t)$$



Applicando GG a D si ha

$$\begin{aligned} \int_{\gamma} \langle \vec{F}, d\vec{s} \rangle &\stackrel{GG}{=} - \iint_D \left(\frac{\partial F_2}{\partial x} - \frac{\partial F_1}{\partial y} \right) dx dy + \int_{\gamma_2} \langle \vec{F}, d\vec{s} \rangle \\ &= (6\pi + 4) + (2 - e^{-1}) = 6\pi + 6 - e^{-1} \end{aligned}$$

perché

$$\iint_D \left(\frac{\partial F_2}{\partial x} - \frac{\partial F_1}{\partial y} \right) dx dy = \iint_D (-12y + 4) dx dy$$

$\nearrow \frac{\partial}{\partial y}(6y^2 - 4y)$

$$\begin{aligned}
 \begin{cases} x = r \cos \theta \\ y = 1 + r \sin \theta \end{cases} &\Rightarrow \int_{\theta=-\frac{\pi}{2}}^{\pi} \int_{r=0}^1 (-12 - 12r \sin \theta + 4) r \, dr \, d\theta \\
 &= -8 \cdot \frac{3\pi}{2} \cdot \left[\frac{r^2}{2} \right]_0^1 + 12 \left[\cos \theta \right]_{-\frac{\pi}{2}}^{\pi} \cdot \left[\frac{r^3}{3} \right]_0^1 \\
 &= -6\pi + 12(-1) \cdot \frac{1}{3} = -6\pi - 4
 \end{aligned}$$

e

$$\begin{aligned}
 \int_{\gamma_2} \langle \vec{F}, d\vec{s} \rangle &= U(0,0) - U(-1,1) + \int_{[P,Q] \cup [Q,0]} \langle (6y^2 - 4y, 0), d\vec{s} \rangle \\
 &= 0 - e^{-1} + \int_{-1}^0 \langle (2, 0), (1, 0) \rangle dt + \int_1^0 \langle (6x^2 - 4x, 0), (0, 1) \rangle dt \\
 &= 2 - e^{-1}
 \end{aligned}$$


2.a Calcolare $\iint_S z \, dS$ con

$$S = \{(x, y, z) : z = xy, x^2 + y^2 \leq 1, 0 \leq y \leq \sqrt{3}x\}.$$

Parametrizzazione di S :

$$\vec{\sigma}(x, y) = (x, y, xy)$$

con $A = \{(x, y) : x^2 + y^2 \leq 1, 0 \leq y \leq \sqrt{3}x\}.$



Quindi

$$\vec{\sigma}_x \times \vec{\sigma}_y = \left(-\frac{\partial(xy)}{\partial y}, -\frac{\partial(xy)}{\partial x}, 1 \right) = (-y, -x, 1).$$

Allora

$$\iint_S z \, dS = \iint_A xy \|\vec{\sigma}_x \times \vec{\sigma}_y\| \, dx \, dy$$

$$= \iint_A xy \sqrt{1+x^2+y^2} \, dx \, dy$$

$$\stackrel{CP}{=} \int_{\theta=0}^{\pi/3} \int_{\rho=0}^1 \rho^2 \cos \theta \sin \theta \cdot \sqrt{1+\rho^2} \, \rho \, d\rho \, d\theta$$

$$= \left[\frac{\sin^2 \theta}{2} \right]_0^{\pi/3} \int_0^1 \rho^3 \sqrt{1+\rho^2} \, d\rho = \frac{(\sqrt{3}/2)^2}{2} \int_1^2 (t-1) \sqrt{t} \frac{dt}{2}$$

$t = 1 + \rho^2$
 $dt = 2\rho \, d\rho$

$$= \frac{3}{8} \left[\frac{2t^{5/2}}{5} - \frac{2t^{3/2}}{3} \right]_1^2 = \frac{3}{8} \left(\sqrt{2} \left(\frac{4}{5} - \frac{2}{3} \right) - \left(\frac{1}{5} - \frac{1}{3} \right) \right)$$

$$= \frac{1}{40} (\sqrt{2} \cdot 2 + 2) = \frac{\sqrt{2}+1}{20}.$$

2.b Calcolare $\iint_S \frac{x^2}{z^2} dS$ con

$$S = \{(x, y, z) : (x^2 + y^2)z^2 = 1, z \geq 0, 1 \leq x^2 + y^2 \leq 3\}.$$

S è il grafico di $z = f(x, y) = \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}}$ con (x, y) in

$$A = \{(x, y) : 1 \leq x^2 + y^2 \leq 3\}.$$

Parametrizzazione cartesiana di S:

$$\vec{\sigma}(x, y) = (x, y, \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}}) \text{ con } (x, y) \in A.$$

Quindi

$$\vec{\sigma}_x \times \vec{\sigma}_y = (-f_x, -f_y, 1) = \left(\frac{x}{(x^2 + y^2)^{3/2}}, \frac{y}{(x^2 + y^2)^{3/2}}, 1 \right)$$

e

$$\|\vec{\sigma}_x \times \vec{\sigma}_y\| = \frac{(x^2 + y^2 + (x^2 + y^2)^3)^{1/2}}{(x^2 + y^2)^{3/2}} = \frac{(1 + (x^2 + y^2)^2)^{1/2}}{x^2 + y^2}.$$

Infine


$$\iint_S \frac{x^2}{z^2} dS = \iint_A x^2 \cancel{(x^2 + y^2)} \cdot \frac{(1 + (x^2 + y^2)^2)^{1/2}}{\cancel{x^2 + y^2}} dx dy$$

$$\stackrel{CP}{=} \int_{\theta=0}^{2\pi} \int_{\rho=1}^{\sqrt{3}} \rho^2 \cos^2 \theta (1 + \rho^4)^{1/2} \rho d\rho d\theta = \pi \int_1^{\sqrt{3}} \rho^3 (1 + \rho^4)^{1/2} d\rho$$

$$\begin{aligned} & \stackrel{\substack{t=1+\rho^4 \\ dt=4\rho^3 d\rho}}{=} \pi \int_2^{10} \sqrt{t} \frac{dt}{4} = \frac{\pi}{4} \left[\frac{2}{3} t^{3/2} \right]_2^{10} = \frac{\pi}{6} (10\sqrt{10} - 2\sqrt{2}) \end{aligned}$$

$$= \frac{\pi\sqrt{2}}{3} (5\sqrt{5} - 1).$$

2.C Calcolare $\iint_S |x-y| dS$ con
 $S = \{(x, y, z) : y \geq 0, x^2 + y^2 + z^2 = 4\}$.



La semisfera S è divisa in due parti dal piano $x=y$:

S^+ se $x \geq y$ e S^- se $x \leq y$.

Con la parametrizzazione in coordinate sferiche

$$\vec{\sigma}(\theta, \varphi) = 2(\cos\theta \sin\varphi, \sin\theta \sin\varphi, \cos\varphi)$$

si ha che $S^+ = \vec{\sigma}(A^+)$ e $S^- = \vec{\sigma}(A^-)$ dove

$$A^+ = [0, \frac{\pi}{4}] \times [0, \pi] \text{ e } A^- = [\frac{\pi}{4}, \pi] \times [0, \pi].$$

Dato che $\|\vec{\sigma}_\theta \times \vec{\sigma}_\varphi\| = 4 \sin\varphi$ si ottiene

$$\begin{aligned} \iint_S |x-y| dS &= \iint_{S^+} (x-y) dS + \iint_{S^-} (y-x) dS \\ &= \iint_{A^+} 2(\cos\theta - \sin\theta) \sin\varphi \cdot 4 \sin\varphi d\theta d\varphi \\ &\quad + \iint_{A^-} 2(\sin\theta - \cos\theta) \sin\varphi \cdot 4 \sin\varphi d\theta d\varphi \end{aligned}$$

$$= 8 \int_0^\pi \sin^2\varphi d\varphi \cdot \left(\int_0^{\pi/4} (\cos\theta - \sin\theta) d\theta - \int_{\pi/4}^\pi (\cos\theta - \sin\theta) d\theta \right)$$

$$= 8 \cdot \frac{\pi}{2} \left(\left[\sin\theta + \cos\theta \right]_0^{\pi/4} - \left[\sin\theta + \cos\theta \right]_{\pi/4}^\pi \right)$$

$$= 4\pi(\sqrt{2} - 1 + 1 + \sqrt{2}) = 8\sqrt{2}\pi.$$

2.d

Calcolare l'area di


$$S = \{(x, y, z) : x^2 + y^2 + z^2 = 4, x^2 + y^2 \leq 2y\}$$

$$\rightarrow x^2 + (y-1)^2 \leq 1$$

S è la parte della sfera $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ contenuta nel cilindro $x^2 + (y-1)^2 \leq 1$.

Dato che S è simmetrica rispetto ai piani $x=0$ e $z=0$ basta calcolare 4 volte l'area di S_1 ossia la parte di S contenuta nel primo ottante.

Svolgiamo il calcolo in due modi.



1) Parametrizzazione cartesiana di S_1 :

$$\vec{\sigma}(x, y) = (x, y, \sqrt{4 - x^2 - y^2}) \text{ con } A = \{x^2 + (y-1)^2 \leq 1, x \geq 0\}.$$

Allora

$$\vec{\sigma}_x \times \vec{\sigma}_y = \left(\frac{x}{\sqrt{4 - x^2 - y^2}}, \frac{y}{\sqrt{4 - x^2 - y^2}}, 1 \right)$$


da cui $\|\vec{\sigma}_x \times \vec{\sigma}_y\| = \frac{2}{\sqrt{4 - x^2 - y^2}}$. Così

$$|S| = 4 \iint_A \|\vec{\sigma}_x \times \vec{\sigma}_y\| dx dy$$

$$\stackrel{CP}{=} 8 \int_{\theta=0}^{\pi/2} \int_{\rho=0}^{2\cos\theta} \frac{1}{\sqrt{4-\rho^2}} \rho d\rho d\theta$$

$$\begin{aligned} x=4-\rho^2 \\ dt=-2\rho d\rho \end{aligned} \rightarrow 8 \int_0^{\pi/2} \left(\int_{4\cos^2\theta}^4 \frac{1}{\sqrt{t}} \cdot \frac{dt}{2} \right) d\theta = 8 \int_0^{\pi/2} \left[\sqrt{t} \right]_{4\cos^2\theta}^4 d\theta$$

$$= 8 \int_0^{\pi/2} (2 - 2\cos\theta) d\theta = 8 \left[2\theta - 2\sin\theta \right]_0^{\pi/2} = 8(\pi - 2).$$



2) Parametrizzazione in coordinate sferiche di S_1 :

$$\vec{\sigma}(\theta, \varphi) = (2 \cos \theta \sin \varphi, 2 \sin \theta \sin \varphi, 2 \cos \varphi)$$

con $A = \{(\theta, \varphi) : \theta \in [0, \frac{\pi}{2}], 0 \leq \varphi \leq \theta\}$ perché la condizione $x^2 + y^2 \leq 2z$ è equivalente a

$$(\cos \theta \sin \varphi)^2 + (2 \sin \theta \sin \varphi)^2 \leq 2 \cdot 2 \sin \theta \sin \varphi$$

e, visto che nel primo ottante $\varphi \in [0, \frac{\pi}{2}]$, si ha

$$4 \sin^2 \varphi \leq 4 \sin \theta \sin \varphi \quad \text{ovvero} \quad 0 \leq \varphi \leq \theta.$$

Ricordando che $\|\vec{\sigma}_\theta \times \vec{\sigma}_\varphi\| = R^2 \sin \varphi = 4 \sin \varphi$ si ha

$$\begin{aligned} |S| &= 4 \iint_A \|\vec{\sigma}_\theta \times \vec{\sigma}_\varphi\| d\theta d\varphi = 4 \int_0^{\pi/2} \left(\int_0^\theta 4 \sin \varphi d\varphi \right) d\theta \\ &= 16 \int_0^{\pi/2} [-\cos \varphi]_0^\theta d\theta = 16 \int_0^{\pi/2} (1 - \cos \theta) d\theta \\ &= 16 \left[\theta - \sin \theta \right]_0^{\pi/2} = 8(\pi - 2). \end{aligned}$$

2.e

Calcolare l'area di


$$S = \{(x, y, z) : z^2 = x^2 + y^2, z \geq 0, y^2 + z^2 \leq 1\}.$$

↑ doppio cono
con asse z

↑ cilindro pieno
con asse x

Il bordo di S è la curva
data dall'intersezione del
cono superiore e del cilindro

$$\begin{cases} z^2 = x^2 + y^2, z \geq 0 \\ y^2 + z^2 = 1 \end{cases}$$



Eliminando la variabile z otteniamo la
la proiezione di ∂S sul piano xy

$$1 - y^2 = z^2 = x^2 + y^2 \iff x^2 + 2y^2 = 1 \iff x^2 + \frac{y^2}{(1/\sqrt{2})^2} = 1.$$

↑ ellisse

Questo permette di scrivere una parametrizzazione
cartesiana di S :

$$\vec{\sigma}(x, y) = (x, y, \sqrt{x^2 + y^2}) \quad \text{con } A = \{(x, y) : x^2 + \frac{y^2}{(1/\sqrt{2})^2} \leq 1\}$$

Quindi

$$\|\vec{\sigma}_x \times \vec{\sigma}_y\| = \left\| \left(-\frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}, -\frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}}, 1 \right) \right\| = \sqrt{\frac{x^2}{x^2 + y^2} + \frac{y^2}{x^2 + y^2} + 1} = \sqrt{2}.$$

Così


$$|S| = \iint_A \|\vec{\sigma}_x \times \vec{\sigma}_y\| dx dy = \sqrt{2} |A| = \sqrt{2} \cdot \pi \cdot 1 \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} = \pi.$$

↑ Area ellisse

2.8

Calcolare il baricentro

$$S = \{(x, y, z): z = x^2 + y^2, z \in [0, 1]\}.$$



Parametrizzazione cartesiana di S:

$$\vec{\sigma}(x, y) = (x, y, x^2 + y^2) \text{ con } A = \{(x, y): x^2 + y^2 \leq 1\}.$$

Quindi:

$$\|\vec{\sigma}_x \times \vec{\sigma}_y\| = \|(-2x, -2y, 1)\| = \sqrt{1 + 4(x^2 + y^2)}.$$

Calcolo dell'area:

$$|S| = \iint_A \|\vec{\sigma}_x \times \vec{\sigma}_y\| dx dy \stackrel{CP}{=} \int_{\rho=0}^1 \int_{\theta=0}^{2\pi} \sqrt{1 + 4\rho^2} \cdot \rho d\rho d\theta$$

$$\begin{cases} t = 1 + 4\rho^2 \\ dt = 8\rho d\rho \end{cases} \rightarrow 2\pi \int_1^5 \sqrt{t} \cdot \frac{dt}{8} = \frac{\pi}{4} \left[\frac{2t^{3/2}}{3} \right]_1^5 = \frac{\pi}{6} (5^{3/2} - 1).$$

Calcolo del baricentro: per simmetria $\bar{x} = \bar{y} = 0$,

$$\bar{z} = \frac{1}{|S|} \iint_S z dS = \frac{1}{|S|} \iint_A (x^2 + y^2) \|\vec{\sigma}_x \times \vec{\sigma}_y\| dx dy$$

$$\stackrel{CP}{=} \frac{1}{|S|} \int_{\rho=0}^1 \int_{\theta=0}^{2\pi} \rho^2 \sqrt{1 + 4\rho^2} \cdot \rho d\rho d\theta$$

$$\begin{cases} t = 1 + 4\rho^2 \\ dt = 8\rho d\rho \end{cases} \rightarrow \frac{2\pi}{|S|} \int_1^5 \frac{t-1}{4} \sqrt{t} \frac{dt}{8} = \frac{\pi}{16|S|} \left[\frac{2t^{5/2}}{5} - \frac{2t^{3/2}}{3} \right]_1^5$$

$$= \frac{\pi}{16 \cdot \frac{\pi}{6} (5^{3/2} - 1)} \cdot \left(2 \cdot 5^{3/2} - \frac{2}{3} \cdot 5^{3/2} - \frac{2}{5} + \frac{2}{3} \right) = \frac{1}{10} \cdot \frac{5^{5/2} + 1}{5^{3/2} - 1}.$$


2.9 Calcolare I/M del rettangolo

$S = \{(x, y, 0) : x \in [0, a], y \in [0, b]\}$ con $a, b > 0$ rispetto all'asse z e ad una sua diagonale.

Parametrizzazione di S :

$$\vec{\sigma}(x, y) = (x, y, 0) \text{ con } A = [0, a] \times [0, b]$$

$$\text{Quindi } \vec{\sigma}_x \times \vec{\sigma}_y = (0, 0, 1).$$



1) Asse z .

$$\begin{aligned} \frac{I}{M} &= \frac{1}{|S|} \iint_S (x^2 + y^2) dS = \frac{1}{ab} \iint_{[0, a] \times [0, b]} (x^2 + y^2) \cdot 1 dx dy \\ &= \frac{1}{ab} \int_0^a \left[x^2 y + \frac{y^3}{3} \right]_0^b dx = \frac{1}{ab} \int_0^a \left(b x^2 + \frac{b^3}{3} \right) dx \\ &= \frac{1}{ab} \left[b \frac{x^3}{3} + \frac{b^3 x}{3} \right]_0^a = \frac{1}{ab} \cdot \frac{ba^3 + b^3 a}{3} = \frac{a^2 + b^2}{3}. \end{aligned}$$

2) Diagonale di S .


$$\begin{aligned} \frac{I}{M} &= \frac{1}{|S|} \iint_S \frac{(bx - ay)^2}{a^2 + b^2} dS = \frac{1}{ab(a^2 + b^2)} \int_0^a \int_0^b (bx - ay)^2 dx dy \\ &= \frac{1}{ab(a^2 + b^2)} \int_0^a \left[b^2 x^2 y - \cancel{2abx} \frac{y^2}{2} + a^2 \frac{y^3}{3} \right]_0^b dx \\ &= \frac{b^3}{ab(a^2 + b^2)} \int_0^a \left(x^2 - ax + \frac{a^2}{3} \right) dx \\ &= \frac{b^3}{ab(a^2 + b^2)} \left[\frac{x^3}{3} - a \frac{x^2}{2} + \frac{a^2}{3} x \right]_0^a = \frac{a^3 b^3}{ab(a^2 + b^2)} \cdot \frac{1}{6} = \frac{a^2 b^2}{6(a^2 + b^2)}. \end{aligned}$$

OSSERVAZIONE

d = distanza di P da $\vec{l}$

$$= \|P-Q\| |\sin \theta|$$

$$= \|(P-Q) \times \vec{v}\|$$



retta $\vec{l}$ passante
per Q e direzione
e vettore $\vec{v}$

Nel caso di $Q=(0,0,0)$, $\vec{v} = \frac{(a,b,0)}{\sqrt{a^2+b^2}}$ e $P=(x,y,0)$.


$$d = \left| \det \begin{bmatrix} \vec{x} & \vec{v} & \vec{k} \\ x & \frac{a}{\sqrt{a^2+b^2}} & 0 \\ y & \frac{b}{\sqrt{a^2+b^2}} & 0 \end{bmatrix} \right| = \frac{|bx - ay|}{\sqrt{a^2+b^2}}.$$

2.R Calcolare I/M di

$$S = \left\{ (x,y,z) : \frac{x^2+y^2}{R^2} = \frac{z^2}{h^2}, z \in [0,h] \right\} \text{ con } h, R > 0$$

rispetto agli assi y e z .

S è la superficie laterale
di un cono



Parametrizzazione cartesiana di S :

$$\vec{\sigma}(x,y) = \left(x, y, \frac{h}{R} \sqrt{x^2+y^2} \right) \text{ con } A = \{ (x,y) : x^2+y^2 \leq R^2 \}.$$

Allora

$$\|\vec{\sigma}_x \times \vec{\sigma}_y\| = \left\| \left(\frac{-hx}{R\sqrt{x^2+y^2}}, \frac{-hy}{R\sqrt{x^2+y^2}}, 1 \right) \right\| = \sqrt{1 + \frac{h^2}{R^2}} = \frac{\sqrt{R^2+h^2}}{R}.$$

Calcolo dell'area di S :

$$|S| = \iint_A \|\vec{\sigma}_x \times \vec{\sigma}_y\| dx dy = \frac{\sqrt{R^2+h^2}}{R} |A| = \pi R \sqrt{R^2+h^2}$$

1) Asse y

$$\frac{I}{M} = \frac{1}{|S|} \iint_S (x^2 + z^2) dS = \frac{1}{\pi R \sqrt{R^2 + h^2}} \iint_A (x^2 + z^2) \cdot \frac{\sqrt{R^2 + h^2}}{R} dx dy$$

$\frac{h^2}{R^2} (x^2 + y^2)$

$$\stackrel{CP}{=} \frac{1}{\pi R^2} \int_{\theta=0}^{2\pi} \left(\int_{\rho=0}^R (\rho^2 \cos^2 \theta + \frac{h^2}{R^2} \rho^2) \rho d\rho \right) d\theta$$

$$= \frac{1}{\pi R^2} \left(\int_0^{2\pi} \cos^2 \theta d\theta + \frac{2\pi h^2}{R^2} \right) \cdot \left[\frac{\rho^4}{4} \right]_0^R$$

$$= \frac{1}{\pi R^2} \left(\pi + \frac{2\pi h^2}{R^2} \right) \frac{R^4}{4} = \frac{R^2}{4} + \frac{h^2}{2}.$$

2) Asse z

$$\frac{I}{M} = \frac{1}{|S|} \iint_S (x^2 + y^2) dS = \frac{1}{\pi R \sqrt{R^2 + h^2}} \iint_A (x^2 + y^2) \cdot \frac{\sqrt{R^2 + h^2}}{R} dx dy$$

$$\stackrel{CP}{=} \frac{1}{\pi R^2} \int_{\theta=0}^{2\pi} \left(\int_{\rho=0}^R \rho^2 \cdot \rho d\rho \right) d\theta = \frac{2\pi}{\pi R^2} \cdot \left[\frac{\rho^4}{4} \right]_0^R = \frac{R^2}{2}.$$


2.i Calcolare I/M di

$S = \{(x, y, z) : x^2 + y^2 + z^2 = R^2, z \geq h\}$ con $h \in (-R, R)$ e $R > 0$ rispetto all'asse z.

Si ha che $h = R \cos \varphi_0$. Così

$$|S| = \int_{\theta=0}^{2\pi} \left(\int_{\varphi=0}^{\varphi_0} R^2 \sin \varphi d\varphi \right) d\theta$$

$$= 2\pi R^2 [-\cos \varphi]_0^{\varphi_0} = 2\pi R(R - h).$$



Quindi

$$\begin{aligned}\frac{I}{M} &= \frac{1}{|S|} \iint_S (x^2 + y^2) dS \\ &= \frac{1}{2\pi R(R-h)} \int_{\theta=0}^{2\pi} \left(\int_{\varphi=0}^{\varphi_0} R^2 \sin^2 \varphi \cdot R^2 \sin \varphi d\varphi \right) d\theta \\ &= \frac{R^3}{R-h} \left[-\cos \varphi + \frac{\cos^3 \varphi}{3} \right]_0^{\varphi_0} = \frac{1}{R-h} \cdot \frac{1}{3} (R-h)^2 (2R+h) \\ &= \frac{1}{3} (R-h)(2R+h)\end{aligned}$$

3.a Verificare che se g è C^2 allora $\text{rot}(\nabla g) = \vec{0}$.

$$\text{rot}(\nabla g) = \det \begin{bmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ g_x & g_y & g_z \end{bmatrix}$$

Teorema di Schwarz

$$= (g_{zy} - g_{yz}, g_{xz} - g_{zx}, g_{yx} - g_{xy}) \stackrel{\downarrow}{=} (0, 0, 0).$$

Si noti che $\text{rot}(\nabla g) = \vec{0}$ è come dire che ogni campo conservativo ∇g è irrotazionale.

3.b Verificare che se $\vec{F}$ è C^2 allora

$$\text{div}(\text{rot}(\vec{F})) = 0.$$

Si ha che

$$\text{rot}(\vec{F}) = \det \begin{bmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ F_1 & F_2 & F_3 \end{bmatrix} = \left(\frac{\partial F_3}{\partial y} - \frac{\partial F_2}{\partial z}, \frac{\partial F_1}{\partial z} - \frac{\partial F_3}{\partial x}, \frac{\partial F_2}{\partial x} - \frac{\partial F_1}{\partial y} \right)$$

e quindi

Teorema di Schwarz

$$\text{div}(\text{rot}(\vec{F})) = \frac{\partial^2 F_3}{\partial x \partial y} - \frac{\partial^2 F_2}{\partial x \partial z} + \frac{\partial^2 F_1}{\partial y \partial z} - \frac{\partial^2 F_3}{\partial y \partial x} + \frac{\partial^2 F_2}{\partial z \partial x} - \frac{\partial^2 F_1}{\partial z \partial y} \stackrel{\downarrow}{=} 0.$$

3.c Verificare che se g e $\vec{F}$ sono C^2 allora

$$\text{div}(g\vec{F}) = g \text{div}(\vec{F}) + \langle \nabla g, \vec{F} \rangle.$$

Abbiamo che

$$\begin{aligned} \text{div}(g\vec{F}) &= \frac{\partial}{\partial x}(gF_1) + \frac{\partial}{\partial y}(gF_2) + \frac{\partial}{\partial z}(gF_3) \\ &= g_x F_1 + g \frac{\partial F_1}{\partial x} + g_y F_2 + g \frac{\partial F_2}{\partial y} + g_z F_3 + g \frac{\partial F_3}{\partial z} \\ &= g \text{div}(\vec{F}) + \langle \nabla g, \vec{F} \rangle. \end{aligned}$$

3.d Verificare che se g e $\vec{F}$ sono C^2 allora

$$\text{rot}(g\vec{F}) = g \text{rot}(\vec{F}) + \nabla g \times \vec{F}.$$

Abbiamo che

$$\begin{aligned} \text{rot}(g\vec{F}) &= \det \begin{bmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ gF_1 & gF_2 & gF_3 \end{bmatrix} \\ &= \left(\frac{\partial(gF_3)}{\partial y} - \frac{\partial(gF_2)}{\partial z}, \frac{\partial(gF_1)}{\partial z} - \frac{\partial(gF_3)}{\partial x}, \frac{\partial(gF_2)}{\partial x} - \frac{\partial(gF_1)}{\partial y} \right) \\ &= \left(g_y F_3 + g \frac{\partial F_3}{\partial y} - g_z F_2 - g \frac{\partial F_2}{\partial z}, g_z F_1 + g \frac{\partial F_1}{\partial z} - g_x F_3 - g \frac{\partial F_3}{\partial x}, \right. \\ &\quad \left. g_x F_2 + g \frac{\partial F_2}{\partial x} - g_y F_1 - g \frac{\partial F_1}{\partial y} \right) \\ &= g \cdot \det \begin{bmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ F_1 & F_2 & F_3 \end{bmatrix} + \det \begin{bmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ g_x & g_y & g_z \\ F_1 & F_2 & F_3 \end{bmatrix} \\ &= \text{rot}(g\vec{F}) = g \text{rot}(\vec{F}) + \nabla g \times \vec{F}. \end{aligned}$$

3.e Verificare che se $\vec{F} = (F_1, F_2, F_3)$ è C^2 allora

$$\text{rot}(\text{rot}(\vec{F})) = \nabla(\text{div}(\vec{F})) - (\text{div}(\nabla F_1), \text{div}(\nabla F_2), \text{div}(\nabla F_3)).$$

Verifichiamo l'uguaglianza per la prima componente (simile per le altre).

A sinistra si ha che

$$\text{rot}(\vec{F}) = (F_{3y} - F_{2z}, F_{1z} - F_{3x}, F_{2x} - F_{1y})$$

e quindi la prima componente di $\text{rot}(\text{rot}(\vec{F}))$ è

$$\frac{\partial}{\partial y}(F_{2x} - F_{1y}) - \frac{\partial}{\partial z}(F_{1z} - F_{3x}) = F_{2xy} - F_{1yy} - F_{1zz} + F_{3xz} \quad (*)$$

A destra invece la prima componente di $\nabla(\text{div}(\vec{F})) - (\text{div}(\nabla F_1), \text{div}(\nabla F_2), \text{div}(\nabla F_3))$ è

$$\begin{aligned} & \frac{\partial}{\partial x}(F_{1x} + F_{2y} + F_{3z}) - \text{div}((F_{1x}, F_{1y}, F_{1z})) \\ &= \cancel{F_{1xx}} + F_{2yx} + F_{3zx} - \cancel{F_{1xx}} - F_{1yy} - F_{1zz} \quad (**)$$

Infine, confrontando (*) e (**) si nota che sono uguali per il teorema di Schwarz.