


ANALISI MATEMATICA 2 - LEZIONE 36

ESEMPI

- Calcolare $\iint_S \langle \vec{F}, d\vec{S} \rangle$ dove $\vec{F} = (y^2, x, z^2 + 1)$ e
 $S = \left\{ (x, y, z) : \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{16} + z^2 = 1, 0 \leq z \leq \frac{\sqrt{3}}{2} \right\}$

orientata in modo che $\vec{m} = (1, 0, 0)$ in $(2, 0, 0)$.



S è la parte di ellissoide centrato in $(0,0,0)$ e semiasse 2, 4 e 1 compreso tra i piani $z=0$ e $z=\frac{\sqrt{3}}{2}$.

In alternativa al calcolo diretto applichiamo il teorema della divergenza chiudendo S con

$$S_1 = \left\{ (x, y, 0) : \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{16} + 0^2 \leq 1 \right\} \text{ con } \vec{m} = (0, 0, -1)$$

$$S_2 = \left\{ (x, y, \frac{\sqrt{3}}{2}) : \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{16} + \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2 \leq 1 \right\} \text{ con } \vec{m} = (0, 0, 1)$$

$$\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{16} \leq 1 - \frac{3}{4} = \frac{1}{4} \iff x^2 + \frac{y^2}{4} \leq 1 \text{ ellisse con semiasse 1 e 2}$$

Porto

$$D = \left\{ (x, y, z) : \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{16} + z^2 \leq 1, 0 \leq z \leq \frac{\sqrt{3}}{2} \right\}$$

allora $\partial D = S_1 \cup S_2 \cup S$ con le orientazioni descritte e

$$\begin{aligned}\iint_S \langle \vec{F}, d\vec{S} \rangle &\stackrel{TD}{=} \iiint_D \operatorname{div}(\vec{F}) \, dx \, dy \, dz - \iint_{S_1 \cup S_2} \langle \vec{F}, d\vec{S} \rangle \\ &= \frac{15\pi}{4} - \left(\underbrace{\frac{7\pi}{2}}_{S_2} - \underbrace{8\pi}_{S_1} \right) = \frac{33}{4}\pi.\end{aligned}$$

Infatti:

$$\begin{aligned}\iint_{S_1} \langle \vec{F}, d\vec{S} \rangle &= \iint_{S_1} \langle (y^2, x, \overset{0}{z^2+1}), (0, 0, -1) \rangle \, dS \\ &= -|S_1| = -\pi \cdot 4 \cdot 2 = -8\pi,\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\iint_{S_2} \langle \vec{F}, d\vec{S} \rangle &= \iint_{S_2} \langle (y^2, x, \overset{(\sqrt{3}/2)^2}{z^2+1}), (0, 0, 1) \rangle \, dS \\ &= \left(\frac{3}{4} + 1\right) |S_2| = \frac{7}{4} \cdot \pi \cdot 2 \cdot 1 = \frac{7\pi}{2},\end{aligned}$$

e infine

$$\operatorname{div}(\vec{F}) = \frac{\partial}{\partial x}(y^2) + \frac{\partial}{\partial y}(x) + \frac{\partial}{\partial z}(z^2+1) = 0 + 0 + 2z.$$

$$\iiint_D \operatorname{div}(\vec{F}) \, dx \, dy \, dz = \int_{z=0}^{\sqrt{3}/2} 2z \iint_{S_z} dx \, dy = 2 \int_0^{\sqrt{3}/2} z |S_z| \, dz$$

per sezioni $\nearrow$ $\nwarrow$ S_z

$$\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{16} + z^2 \leq 1 \iff \frac{x^2}{4(1-z^2)} + \frac{y^2}{16(1-z^2)} \leq 1 \quad \text{ellisse con semiasse } 2\sqrt{1-z^2} \text{ e } 4\sqrt{1-z^2}$$


$$= 2 \int_0^{\sqrt{3}/2} z \cdot \pi \cdot 2 \cdot 4(1-z^2) \, dz = 16\pi \left[\frac{z^2}{2} - \frac{z^4}{4} \right]_0^{\sqrt{3}/2}$$

$$= 16\pi \frac{3}{4} \left(\frac{1}{2} - \frac{3/4}{4} \right) = \frac{15\pi}{4}.$$

OSSERVAZIONE SUL CASO $\text{div}(\vec{F})=0$

Siano S_1 e S_2 due superfici regolari a pezzi e orientabili e siano D_1 e D_2 i solidi di cui S_1 e S_2 sono i rispettivi bordi.

Supponiamo che S_1 e S_2 siano orientati verso l'esterno e che $D_1 \supseteq D_2$.



spazio compreso
tra S_1 e S_2

Inoltre sia $\vec{F}$ un campo vettoriale C^1 in $D = D_1 \setminus D_2$ tale che $\text{div}(\vec{F})=0$ in D . Allora

memo

$$\iint_{S_1} \langle \vec{F}, d\vec{S} \rangle = \iint_{S_2} \langle \vec{F}, d\vec{S} \rangle \quad (*)$$

Infatti: se si applica il teorema della divergenza rispetto a D si ha

$$\iiint_D \underbrace{\text{div}(\vec{F})}_0 dx dy dz \stackrel{\text{TD}}{=} \iint_{\partial D} \langle \vec{F}, d\vec{S} \rangle$$

$$= \iint_{S_1} \langle \vec{F}, d\vec{S} \rangle + \iint_{S_2^-} \langle \vec{F}, d\vec{S} \rangle$$

← orientazione opposta
a quella data

$$= \iint_{S_1} \langle \vec{F}, d\vec{S} \rangle - \iint_{S_2} \langle \vec{F}, d\vec{S} \rangle$$

da cui segue (*).

- Calcolare $\iint_S \langle \vec{F}, d\vec{S} \rangle$ dove $\vec{F} = \frac{(x, y, z)}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}}$ ← campo centrale
e S è una superficie chiusa orientata verso l'esterno che non passa per l'origine.

Posto $r(x, y, z) = (x^2 + y^2 + z^2)^{1/2}$ notiamo che

$$\begin{aligned} \operatorname{div}(\vec{F}) &= \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{x}{r^3} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{y}{r^3} \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{z}{r^3} \right) \\ &= \frac{1}{r^3} + x(-3r^{-4} \cdot \frac{x}{r}) + \frac{1}{r^3} + y(-3r^{-4} \cdot \frac{y}{r}) + \frac{1}{r^3} + z(-3r^{-4} \cdot \frac{z}{r}) \\ &= \frac{3}{r^3} - \frac{3}{r^5} (x^2 + y^2 + z^2) = 0 \quad \forall (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \setminus \{(0, 0, 0)\}. \end{aligned}$$

- 1) Se la superficie chiusa S non contiene al suo interno l'origine


$$\iint_S \langle \vec{F}, d\vec{S} \rangle = \iiint_D \operatorname{div}(\vec{F}) dx dy dz = 0$$

dove D è tale che $\partial^+ D = S$.

- 2) Se la superficie chiusa S contiene al suo interno l'origine allora sia S_2 una sfera centrata in $(0, 0, 0)$ di raggio $r > 0$ sufficientemente piccolo in modo che S_2 stia all'interno di S .
Allora per l'osservazione precedente

$$\begin{aligned} \iint_S \langle \vec{F}, d\vec{S} \rangle &= \iint_S \langle \vec{F}, d\vec{S} \rangle = \iint_{S_2} \langle \frac{\vec{m}}{r^2}, \vec{n} \rangle dS \\ &= \frac{1}{r^2} \cdot |S_2| = \frac{4\pi r^2}{r^2} = 4\pi. \end{aligned}$$


indipendente
dal raggio r



OSSERVAZIONE SUL CASO $\text{rot}(\vec{F}) = \vec{0}$

In $\mathbb{R}^3$ siano γ_1 e γ_2 i sostegni di due curve chiuse, semplici e disgiunte tali che ci sia una superficie S con bordo $\partial S = \gamma_1 \cup \gamma_2$.

Supponiamo che S , γ_1 e γ_2 siano orientate come in figura con $\partial^+ S = \gamma_1 \cup \gamma_2^-$.



Inoltre sia $\vec{F}$ un campo vettoriale C^1 in S tale che $\text{rot}(\vec{F}) = \vec{0}$ in S ossia $\vec{F}$ è irrotazionale in S .

Allora

$$\int_{\gamma_1} \langle \vec{F}, d\vec{s} \rangle = \int_{\gamma_2} \langle \vec{F}, d\vec{s} \rangle \quad (*)$$

Infatti se si applica il teorema del rotore rispetto a S si ha

$$\begin{aligned} 0 &= \iint_S \langle \underbrace{\text{rot}(\vec{F})}_{\vec{0}}, d\vec{S} \rangle \stackrel{\text{TR}}{=} \int_{\partial^+ S} \langle \vec{F}, d\vec{s} \rangle \\ &= \int_{\gamma_1} \langle \vec{F}, d\vec{s} \rangle + \int_{\gamma_2^-} \langle \vec{F}, d\vec{s} \rangle \\ &= \int_{\gamma_1} \langle \vec{F}, d\vec{s} \rangle - \int_{\gamma_2} \langle \vec{F}, d\vec{s} \rangle \end{aligned}$$

da cui segue (*).

- Calcolare $\int_{\gamma} \langle \vec{F}, d\vec{s} \rangle$ dove $\vec{F} = \left(-\frac{y}{x^2+y^2}, \frac{x}{x^2+y^2}, 0\right)$ e γ è una curva chiusa, semplice e orientata che non interseca l'asse z .

non semplicemente connesso

Si verifica che per ogni (x, y, z) in $\mathbb{R}^3 \setminus \{\text{asse } z\}$.

$\equiv \begin{cases} x=0 \\ y=0 \end{cases}$

$$\text{rot}(\vec{F}) = \det \begin{bmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ -\frac{y}{x^2+y^2} & \frac{x}{x^2+y^2} & 0 \end{bmatrix} = \vec{0}.$$

Allora si estende un risultato visto in $\mathbb{R}^2$.

- 1) Se γ non si "avvolge" intorno all'asse z allora

$$\int_{\gamma} \langle \vec{F}, d\vec{s} \rangle = 0.$$

γ è contenuta in un aperto semplicemente connesso contenuto in $\mathbb{R}^3 \setminus \{\text{asse } z\}$

- 2) Se γ si "avvolge" intorno all'asse z allora

$$\int_{\gamma} \langle \vec{F}, d\vec{s} \rangle = \begin{cases} +2\pi & \text{se il verso di } \gamma \text{ è antiorario rispetto all'asse } z \\ -2\pi & \text{se il verso di } \gamma \text{ è orario rispetto all'asse } z \end{cases}$$


Infatti per l'osservazione precedente

se γ è antiorario

$$\int_{\gamma} \langle \vec{F}, d\vec{s} \rangle = \int_{\gamma_2} \langle \vec{F}, d\vec{s} \rangle$$

$$= \int_0^{2\pi} \left\langle \left(-\frac{r \sin t}{r^2}, \frac{r \cos t}{r^2}, 0\right), (-r \sin t, r \cos t, 0) \right\rangle dt = \int_0^{2\pi} 1 dt = 2\pi$$

↑
indipendente dal raggio r



circonferenze con centro lungo l'asse z , raggio $r > 0$, contenute in un piano ortogonale all'asse z

dove $\vec{\gamma}_2(t) = (r \cos t, r \sin t, z_0)$ con $t \in [0, 2\pi]$.

- Calcolare $\iint_S \langle \text{rot}(\vec{F}), d\vec{S} \rangle$ dove $\vec{F} = \frac{(-y, x, z)}{x^2 + y^2 + z^2}$
e $S = \{(x, y, z) : x^2 + y^2 = 1, z \in [0, 2]\}$. S è orientata
in modo che $\vec{n} = (1, 0, 0)$ in $(1, 0, 0)$.

In alternativa al calcolo diretto si può applicare
il teorema del rotore:


$$\iint_S \langle \text{rot}(\vec{F}), d\vec{S} \rangle \stackrel{\text{TR}}{=} \int_{\partial^+ S} \langle \vec{F}, d\vec{s} \rangle$$

$$= \int_{\gamma_1} \langle \vec{F}, d\vec{s} \rangle + \int_{\gamma_2} \langle \vec{F}, d\vec{s} \rangle$$

$$= \int_0^{2\pi} \left(-\frac{\sin t}{1+0} (-\sin t) + \frac{\cos t}{1+0} (\cos t) + 0 \right) dt$$

$$+ \int_0^{2\pi} \left(-\frac{\sin t}{1+2^2} (-\sin t) + \frac{\cos t}{1+2^2} (\cos t) + 0 \right) dt$$

$$= \int_0^{2\pi} 1 dt - \frac{1}{5} \int_0^{2\pi} 1 dt = \frac{8\pi}{5}$$



dove $\vec{\gamma}_1(t) = (\cos t, \sin t, 0)$ con $t \in [0, 2\pi]$,

$\vec{\gamma}_2(t) = (\cos t, \sin t, 2)$ con $t \in [2\pi, 0]$.

*orientazione
oraria*